

NOMBRE DEL TRABAJO

SALAZAR Y SALCEDO TURNITIN.docx

RECUENTO DE PALABRAS

13168 Words

RECUENTO DE PÁGINAS

69 Pages

FECHA DE ENTREGA

Nov 5, 2023 9:29 PM GMT-5

RECUENTO DE CARACTERES

79211 Characters

TAMAÑO DEL ARCHIVO

2.9MB

FECHA DEL INFORME

Nov 5, 2023 9:31 PM GMT-5**● 20% de similitud general**

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos

- 20% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 2% Base de datos de publicaciones

● Excluir del Reporte de Similitud

- Base de datos de contenido publicado de Crossref
- Base de datos de trabajos entregados
- Material bibliográfico
- Material citado
- Bloques de texto excluidos manualmente
- Coincidencia baja (menos de 8 palabras)

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

ESCUELA DE POSGRADO

Unidad de Posgrado de Ciencias de la Salud



Una Institución Adventista

**Cuidados de enfermería a paciente con gestación gemelar y preeclampsia del
Servicio de Ginecología de una clínica de Lima, 2022**

Trabajo Académico

Presentado para obtener el Título de Segunda Especialidad Profesional de Enfermería: Gineco
Obstetricia

Por:

Josselyn Andrea Salazar Aquino
Victcely del Carmen Salcedo de Vega

Asesora:

Mg. Sofía Dora Vivanco Hilario

Lima, Abril de 2023

DECLARACIÓN JURADA

Yo, Mg. Sofía Dora Vivanco Hilario, adscrita en la Facultad de Ciencias de la Salud, y docente de la Unidad de Posgrado de ciencias de la Salud de la respectiva Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Unión.

DECLARO:

Que el presente trabajo de investigación titulado; “Cuidados de enfermería a paciente con gestación gemelar y preeclampsia del Servicio de Ginecología de una clínica de Lima, 2022”. Constituye la memoria presentada por las Licenciadas: Josselyn Andrea Salazar Aquino y Victcely del Carmen Salcedo de Vega, para obtener el Título de Segunda Especialidad Profesional de Enfermería: Gineco Obstetricia que ha sido realizada en la Universidad Peruana Unión bajo mi dirección.

Las declaraciones y opiniones que contiene este trabajo académico son de completa responsabilidad de las autoras, sin comprometer a la institución.

Y estando de acuerdo, firmo la presente declaración en Lima, a los días del mes de Abril 2022.

Mg. Sofía Dora Vivanco Hilario

“Cuidados de enfermería a paciente con gestación gemelar y preeclampsia del Servicio de Ginecología de una clínica de Lima, 2022”

Salazar Aquino Josselyn Andrea^a Salcedo de Vega Victcely Del Carmen^a

Mg. Vivanco Hilario Sofía Dora^b

^aAutores del trabajo académico, Unidad de Posgrado de Ciencias de la Salud Universidad Peruana Unión,

^bAsesora de trabajo académico Universidad Peruana Unión, Escuela de Posgrado Lima, Perú

Resumen

La preeclampsia es un problema de salud pública y una de las principales causas de morbimortalidad materno y perinatal, manifestada por trastornos hipertensivos en el embarazo, es elemental el diagnóstico precoz, para disminuir las complicaciones. El objetivo es describir los cuidados de enfermería en paciente con gestación gemelar y preeclampsia del servicio de ginecología de una clínica de Lima. El estudio se realizó con enfoque cualitativo, tipo caso único, aplicando el proceso de atención de enfermería (PAE), utilizándose como instrumento la guía de valoración de los 11 patrones funcionales de Marjory Gordon en paciente de 33 años, con gestación gemelar de 30 semanas y con preeclampsia. En los resultados se identificaron ocho patrones funcionales alterados, priorizándose el patrón sexualidad/reproducción. Riesgo de alteración de la diada materno-fetal como se evidencia con los cuidados prenatales inadecuados asociado a complicaciones del embarazo. Las intervenciones aplicadas fueron efectivas, apreciando la disminución de riesgos de la preeclampsia; sin embargo, frente al problema de complicación del periodo prenatal: Riesgo de hipertensión maligna relacionado con el embarazo, se lograron estabilizar las manifestaciones clínicas. En conclusión se logró identificar las características clínicas de la paciente con gestación gemelar con preeclampsia y se identificaron y describieron los factores de riesgo, lo que permitió resaltar la importancia de la atención de enfermería, a través de la elaboración de un plan de cuidados individualizado para reducir complicaciones en la diada materno-fetal, enmarcado en el proceso enfermero que identificó problemas y riesgos de complicación, y, permitió brindar cuidados oportunos y de calidad.

Palabras clave: Cuidado de enfermería, gestación gemelar, preeclampsia.

16 Abstract

50 Preeclampsia is a public health problem and one of the main causes of maternal and perinatal morbidity and mortality, manifested by hypertensive disorders in pregnancy, early diagnosis is essential to reduce complications. 8 With the objective of describing the nursing care in a patient with twin pregnancy and preeclampsia from 1 the gynecology service of a clinic in Lima. The study was carried out with a qualitative approach, single case type, applying the nursing care process (PAE), the assessment guide of the 11 functional patterns of Marjory Gordon in a 33-year-old patient with a 30-year-old twin gestation was used as an instrument. weeks and with preeclampsia. In the results, eight altered functional patterns were identified, prioritizing the sexuality/reproduction pattern. 12 Risk of alteration of the maternal-fetal dyad as evidenced by inadequate prenatal care associated with pregnancy complications. The applied interventions were effective, appreciating the decrease in the risks of preeclampsia; however, faced with the problem of complication of the prenatal period: Risk of malignant hypertension related to pregnancy, the clinical manifestations were stabilized. In conclusion, it was possible to identify the clinical characteristics of the patient with a twin pregnancy with preeclampsia, 46 as well as the identification and description of the risk factors, which allowed highlighting the importance of nursing care, through the development of a care plan. individualized nursing care to reduce complications in the maternal-fetal dyad, framed in the nursing process that identified problems and risks of complications, and at the same time, allowed timely and quality care to be provided.

Keywords: Nursing care, twin gestation, preeclampsia.

Introducción

Actualmente, los trastornos hipertensivos en el embarazo presentan un alto riesgo de morbimortalidad para la madre y el feto, por lo que es necesario diagnosticar precozmente con el fin de lograr un mejor control y limitación de las complicaciones, (Salas et al., 2020).

¹ En el Perú la preeclampsia representa del 3 % al 22 % de las muertes maternas y perinatales, lo que la convierte en la segunda causa principal de muerte materna a nivel nacional con un 32 %, y es la primera causa en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima con un 43%. Así también entre el 2012 al 2018 dicha institución de salud reportó como primera causa de morbilidad materna a los trastornos hipertensivos del embarazo, entre ellos preeclampsia con criterios de severidad, síndrome de HELLP y eclampsia, con el 56,6%. (Guevara Ríos, 2019)

La Clínica Delgado, en el periodo 2014 - 2019 reportó 14682 pacientes atendidos ambulatoriamente con diagnóstico de hipertensión esencial (primaria). (Clinica Delgado, 2019).

En el marco de los antecedentes de dicha patología, Bravo et al., (2021), realizó el estudio titulado “Plan de cuidados de enfermería en la preeclampsia. A propósito de un caso”, llegando a la conclusión que ² la preeclampsia sigue siendo una de las principales causas de morbimortalidad materna, que puede detectarse con un buen control prenatal, control de la presión arterial y del embarazo como herramientas de prevención.

De La Puente Vaca (2021), en su publicación titulada “Importancia de los cuidados de enfermería en la preeclampsia”, concluyendo que es recomendable una atención que englobe los aspectos psicológicos, sociales y ¹⁴ físicos, por parte de los profesionales de Enfermería, fomentando el diálogo y la escucha activa para la captación de las percepciones y necesidades de cada mujer en su proceso de enfermedad.

La preeclampsia es una patología hipertensiva inducido por el embarazo con compromiso multisistémica que suele sobrevenir a partir de las 20 semanas de embarazo. (T. Dulay, 2020).

La fisiopatología aún es desconocida, sin embargo, afirman que durante el embarazo las arterias espirales, responsables de la perfusión placentaria sufren alteraciones, dando lugar a baja resistencia vascular y alta tensión, alterando el tejido endotelial, seguido de disfunción vascular y consecuentemente daño multiorgánico, originándose así la hipertensión arterial, por consiguiente, proteinuria, edema, cefalea, riesgo de convulsiones, alteraciones visuales, epigastralgia y restricción del crecimiento intrauterino. (Pereira et al., 2020).

En la actualidad, la interrupción/culminación del embarazo por la vía más adecuada viene a ser el tratamiento idóneo y concluyente de la preeclampsia. Sin embargo, en tanto no se cumplan con los criterios clínicos de severidad que indiquen la interrupción del embarazo, la preeclampsia se manejará con una conducta expectante. (Guevara Ríos, 2019).

La atención de enfermería en el cuidado de la paciente con preeclampsia se basa en la ejecución del método científico que permite al profesional de enfermería abordar los problemas potenciales y reales de forma integral, lógica y estructurada, comprendiéndose las 5 fases: valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación. (Salas et al., 2020)

El desempeño de las actividades de enfermería se basa en la metodología científica del proceso de atención de enfermería porque nos permite ejecutar las intervenciones para el logro de los objetivos propuestos, a fin de conservar la estabilidad hemodinámica de la paciente en su situación crítica de salud. La priorización de las actividades determinó el manejo correctivo de los episodios de la hipertensión y la prevención de los riesgos de complicación materno fetal de manera oportuna, con calidad y eficacia. (Blanco et al., 2021)

Es importante resaltar la vinculación de la investigación con el presente estudio de caso porque permite desarrollar un plan de cuidado individualizado para la atención de la paciente con gestación gemelar de 30 semanas con diagnóstico de preeclampsia, hospitalizada en el servicio de ginecología. La aplicación de los cuidados priorizados fue efectiva, logrando estabilizar la función hemodinámica materno fetal, y evitando complicaciones que podrían poner en riesgo su vida. En conjunto, se pretende fortalecer la intervención de enfermería a través de los cuidados efectivos, con estándares de calidad para la satisfacción de las necesidades identificadas y rescatando el aspecto humano, espiritual y transpersonal.

Objetivos

Objetivo General.

Describir los cuidados de enfermería en paciente con gestación gemelar y preeclampsia.

Objetivos Específicos.

Identificar las características clínicas de la paciente con gestación gemelar y preeclampsia.

Identificar y describir los factores de riesgo de la paciente con gestación gemelar y preeclampsia.

Resaltar la importancia de la atención de enfermería en gestación gemelar y preeclampsia y disminuir las complicaciones.

Elaborar un plan de cuidados de enfermería en gestación gemelar y preeclampsia, utilizando la taxonomía NANDA, NOC, NIC y el manual de problemas de colaboración de Lynda Juall Carpenito.

Marco teórico

Preeclampsia

La preeclampsia es la hipertensión de reciente comienzo o el empeoramiento de una hipertensión preexistente con proteinuria después de las 20 semanas de gestación. (T.Dulay, 2020). Es un trastorno hipertensivo que puede ocurrir durante el embarazo y el posparto y que tiene repercusiones tanto en la madre como el feto. (OPS, 2019). Se convierte en una condición grave del embarazo y representa un peligro importante ya que muchos de sus signos no suelen ser evidentes. (Preeclampsia Foundation, 2021).

Causas y factores de riesgo:

Existe una amplia gama de condiciones que reflejan la complejidad del proceso patológico, clasificándolos en función de:

Factores familiares: Mujeres con antecedentes maternos y/o paternos de hipertensión arterial o diabetes. Edad, Raza. (Villarreal et al., 2020)

Índice de masa corporal y estatura: El IMC elevado es un factor de riesgo importante para la preeclampsia. (Guevara Ríos, 2019).

Condiciones médicas preexistente: La diabetes antes de la gestación, u otras, Número de gestaciones: Las mujeres que nunca han gestado tienen un riesgo más elevado de desarrollar preeclampsia. Intervalo intergenésico: Mujeres con intervalo intergenésico prolongado puede ser causante del desarrollo de preeclampsia. (Rojas et al., 2019)

Antecedente de preeclampsia, uso de tecnología de reproducción asistida, infecciones durante el embarazo, factores paternos y hábitos maternos también forman parte de la clasificación de factores de riesgo. (Mayo Clinic, 2022)

Fisiopatología de la preeclampsia

La preeclampsia es una enfermedad que ocurre solo durante o después del embarazo y es causada por la activación del endotelio vascular, probablemente causada por isquemia placentaria, causada por un defecto en la invasión trofoblástica de las arterias espirales uterinas. Se mencionan causas genéticas, inmunológicas y bioquímicas que explican este defecto en la implantación del trofoblasto con la isquemia placentaria asociada. Debido a la activación del endotelio, se liberan diversos mediadores químicos, que por su acción afectan el funcionamiento de todos los órganos y sistemas, provocando síndromes asociados a la preeclampsia. (Velumani Et. at., 2022).

Intervienen diversos factores, el más importante es la instauración de una insuficiencia placentaria, la cual es responsable de la inducción de un estado antiangiogénico en la gestante y del desarrollo de una disfunción endotelial en diversos órganos que desencadena las manifestaciones clínicas de la enfermedad. (Guevara Ríos, 2019).

Clasificación de la Preeclampsia

Preeclampsia sin criterios de severidad: Este es aquel que tiene solo hipertensión mayor o igual a 140/90 mmHg pero menor a 160/110 mmHg, sin disfunción hematológica, renal, hepática, pulmonar o neurológica, y sin evidencia de daño fetal. (Velumani et al., 2022)

La preeclampsia con criterios de severidad: La preeclampsia evoluciona hacia complicaciones graves como edema agudo de pulmón, insuficiencia renal, encefalopatía hipertensiva con hemorragia cerebral, desprendimiento de retina, desprendimiento prematuro de placenta, hematoma subcapsular hepático o rotura hepática, síndrome HELLP, y muerte en la gestante, feto o recién nacido. (Guevara Ríos, 2019).

Manifestaciones Clínicas de la preeclampsia

Preeclampsia Foundation (2021) expone las siguientes manifestaciones clínicas:

Hipertensión Arterial siendo una de las principales manifestaciones clínicas, la proteinuria se produce cuando las proteínas salen de la sangre y se vierten en la orina, el edema que viene a ser la acumulación de líquidos en exceso, el aumento súbito de peso entre los 900 gramos o más en una semana, se menciona también náuseas y/o vómitos, dolor abdominal (área estomacal) y/o del hombro.

Así mismo, otra bibliografía menciona al dolor de espalda, dolor de cabeza, alteraciones visuales, hiperreflexia, aumento del ritmo cardíaco, confusión, aumento de la ansiedad, dificultad para respirar o dolor en el pecho, cuando cualquiera de estos síntomas anormales aparece por primera vez, puede indicar presión arterial o en casos extremos acumulación de líquido en los pulmones (edema pulmonar). (Velumani et al., 2022)

Manejo de la preeclampsia

El manejo de la preeclampsia inicia con la evaluación del estado de salud de la gestante y el feto, realizándose una evaluación clínica de las funciones: neurológica, respiratoria, cardiovascular, hematológica, bioquímica, renal, y de igual manera se debe evaluar el bienestar fetal con el monitoreo fetal electrónico, el perfil biofísico y estudio Doppler de las arterias umbilical y uterina. Las mujeres embarazadas con preeclampsia en la mayoría de los casos requieren hospitalización para el tratamiento terapéutico adecuado de la hipertensión, prevención de convulsiones, optimización del volumen intravascular, mantenimiento de la oxigenación arterial adecuada, detección temprana y/o tratamiento de complicaciones. (Departamento de Obstetricia de la UC de Chile, 2020).

Manejo de la preeclampsia sin criterios de severidad:

Se recomienda el reposo relativo, dieta normocalórica, normoproteica y normosódica. No utilizar fármacos antihipertensivos. El tratamiento definitivo para la preeclampsia es la interrupción del embarazo. Si la mujer embarazada tiene 37 semanas o más, el embarazo debe interrumpirse por parto vaginal o por cesárea. Si la mujer tiene menos de 37 semanas de edad y no hay compromiso materno o fetal, es posible el manejo a lo largo del tiempo, continuar con las medidas generales y monitorear de cerca a la madre y al feto. Si, a pesar del tratamiento, la hipertensión arterial no se controla o si la enfermedad progresa a preeclampsia severa, o si hay preeclampsia o signos de sufrimiento fetal, hematológico o renal, disfunción hepática, pulmonar o neurológica, el embarazo se interrumpirá de inmediato, independientemente de la edad gestacional.

(Guzman et al., 2018).

Manejo de la preeclampsia con criterios de severidad:

La preeclampsia con criterios severos progresará a complicaciones graves como edema agudo de pulmón, insuficiencia renal, encefalopatía hipertensiva con hemorragia cerebral, desprendimiento de retina, desprendimiento de placenta, hematoma subcapsular o ruptura del hígado, síndrome HELLP, que puede conducir a la muerte a la mujer embarazada, feto o bebé. Por lo tanto, la gestión debe ser oportuna, multidisciplinaria y eficaz. En una gestante que presenta sangrado vaginal y signos de desprendimiento prematuro de placenta, siempre sospechar en una preeclampsia como cuadro de fondo.

(Velumani et at., 2022)

En la preeclampsia hay una contracción del contenido intravascular, a diferencia de la hipervolemia usual de la gestante; hay tendencia a oliguria por falta de fluidos, a pesar del edema. (Tacuri et al., 2022).

Deberá asegurarse una expansión adecuada del intravascular con solución salina al 0.9%, en caso de persistir la oliguria, iniciar, seguido de un diurético como la furosemida con el fin de lograr la normalización de la presión arterial con mayor rapidez y reducir la necesidad de terapia antihipertensiva. (Rojas et al., 2019).

2 Se debe realizar un balance hídrico estricto y monitoreo de las funciones vitales
3 cada 15 minutos. Iniciar por vía venosa una infusión de sulfato de magnesio para la
prevención de convulsiones, esta solución debe con dosis inicial de ataque; y se sugiere
27 mantener la infusión por 24 horas después del parto. 5 La administración de sulfato de
magnesio se debe de suspender si se detecta arreflexia tendinosa, depresión del estado de
conciencia y se debe administrar en este caso gluconato de calcio. El tratamiento
antihipertensivo solo debe ser utilizado si la presión arterial sistólica es ≥ 160 mmHg o si
la presión arterial diastólica es ≥ 110 mmHg, en cuyo caso se recomienda usar los
siguientes fármacos: Labetalol, Hidralacina, Metildopa, Nifedipino. (Calderón et al.,
2023).

48 **Rol de enfermería**

La atención principal de enfermería incluye la evaluación continua y la identificación temprana de signos de empeoramiento de la enfermedad. Cumpliendo con la pauta médica: debe asegurarse una expansión adecuada de la vía endovascular con solución salina al 0,9%, 50-60 gotas/min para el primer litro; y, si persiste la oliguria, el médico tratante prescribirá 500 ml de solución coloidal a goteo rápido, seguidos de 10 mg de furosemida

por vía intravenosa. La diuresis debe controlarse con una sonda vesical conectada a bolsa colectora de orina; La presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno se deben de controlar cada 15 minutos. (Gaona, 2021).

Iniciar una infusión intravenosa de sulfato de magnesio. La solución para perfusión se prepara combinando 5 ampollas de sulfato de magnesio al 20 % (ampollas de 10 ml) con 50 ml de solución salina al 0,9 %. Esta solución aporta 1 g de sulfato de magnesio por 10 ml y se recomienda administrar 4 gramos (40 ml) durante 15-20 días como dosis de carga inicial; infusión continua de 1g cada hora (10 ml por hora) e infusión de mantenimiento durante 24 horas después del parto. Al usar sulfato de magnesio, se controlarán el reflejo de la rodilla, la frecuencia respiratoria, que debe ser de al menos 14 respiraciones por minuto, y la producción de orina, no menos de 25-30 ml/hora. (Gaona, 2021).

También se recomienda monitorear la saturación de O₂ con oximetría de pulso. Se debe suspender la administración de sulfato de magnesio si se detecta hiporreflexia tendinosa, si hay alteración de la conciencia o si hay tendencia a una ventilación superficial o lenta, En este caso, el médico tratante pautará gluconato de calcio, de 1 a 2 gramos por vía intravenosa. El tratamiento antihipertensivo solo debe ser utilizado si la presión arterial sistólica es ≥ 160 mmHg o si la presión arterial diastólica es ≥ 110 mmHg. (Gaona, 2021).

Riesgo de alteración de la diada materno fetal

Vulnerable a la interrupción de la relación simbiótica entre la madre y el feto debido a comorbilidades o condiciones relacionadas con el embarazo, que pueden afectar la salud.

❏(Heather Herdman et al.,2021)

Factores de riesgo del riesgo de alteración de la diada materno fetal

Algunos de los factores de riesgo son las complicaciones del embarazo como el embarazo múltiple, amenaza de aborto, oligohidramnios, hemorragia en la segunda y tercera mitad del embarazo. Otros factores de riesgo que se pueden mencionar son la drogodependencia, el incumplimiento de indicaciones médicas, una atención prenatal inadecuada, el maltrato físico, diabetes, entre otros. (Chesya et al., 2019).

Otra fuente menciona como otro factor de riesgo importante, al Compromiso del transporte fetal de oxígeno: (oligohidramnios, preeclampsia/eclampsia). (Sacks et al., 2020)

18 Hipertensión Gestacional

La hipertensión gestacional es la presión arterial alta durante el embarazo. Ocurre en aproximadamente 3 de cada 50 embarazos. Esta condición es diferente de la hipertensión crónica, la preeclampsia y la eclampsia. Es un problema de presión arterial durante el embarazo que comienza en la segunda mitad del embarazo y generalmente desaparece después del nacimiento. (Pérez et al., 2019)

1 Fisiopatología de la hipertensión gestacional

Se produce por la elevación rápida y severa de la presión arterial que produce dos Eventos: la disfunción endotelial sistémica que provoca disminución de síntesis de agentes vasodilatadores (óxido nítrico y prostaciclina) y el aumento de síntesis en citoquinas y moléculas de adhesión celular. En la microcirculación aumenta aún más la presión arterial y daña el endotelio vascular, provocando necrosis fibrinoide y proliferación endotelial; también causa isquemia tisular periférica en órganos diana. En el segundo afecta el sistema renina angiotensina aldosterona por la concentración de sal y la osmolaridad plasmática, lo cual aumenta la excreción de sodio por el riñón, ocasionando déficit de volumen intravascular

(hipovolemia) que afecta el flujo sanguíneo y origina disfunción orgánica terminal.

(Pérez et al., 2019)

Riesgo de La Hipertensión gestacional

Los riesgos de la hipertensión gestacional incluyen: presión arterial alta antes o durante un embarazo anterior, enfermedad renal, diabetes, menores de 20 o mayores de 40, embarazo múltiple. (Mayo Clinic, 2022)

Síntomas de la hipertensión gestacional

Los síntomas más frecuentes que se han reportado son: Presión arterial alta durante la segunda mitad del embarazo, cefalea, edema, aumento de peso, visión borrosa o doble, náuseas o vómitos, dolor abdominal, Polaquiurea, como también los síntomas con menos prevalencia son mareo, hemorragia conjuntival, tinnitus y epistaxis. (Stanford medicine children's health, 2022)

Complicaciones de la hipertensión gestacional

Se debe tener en cuenta la valoración constante a la paciente gestante con problemas trastornos hipertensivos para evitar complicaciones como: Compromiso de los vasos sanguíneos, falla hepática, falla renal, Convulsiones, Desprendimiento de la placenta, Crecimiento fetal insuficiente, Mortinato, Muerte de la madre. (Velumani Et. at., 2022)

Tratamiento de la Hipertensión gestacional

El objetivo es lograr disminuir la presión sanguínea sin comprometer la perfusión de los órganos diana, monitoreo hemodinámico de la gestante y rápido acceso venoso para la administración de medicamentos antihipertensivos (alfametildopa, hidralazina y labetalol); considerando una presión arterial sistólica 160 y una presión arterial diastólica ≥ 110 mm Hg con el objetivo de estabilizar la salud materno-fetal (Stanford medicine children's health, 2022)

Prevención de la Hipertensión gestacional

Diagnóstico y tratamiento temprano, Controles prenatales periódicos.

20 Cuidados de enfermería para gestante con hipertensión

Los cuidados de enfermería son los procesos que se aplican para disminuir las complicaciones propias de la hipertensión gestacional materna y fetal, con el fin de conservar la gestación. Entre los cuidados para la hipertensión gestacional, podemos mencionar: Reposo relativo, Control periódico de la TA y del bienestar fetal, dieta normocalórica, normoproteica y normosódica, tratamiento farmacológico con labetalol, hidralazina y alfa-metildopa, finalizar la gestación, en los casos de más de 37 semanas. Si la edad gestacional es menor de 34 semanas se madurarán los pulmones con corticoides, no suspender el tratamiento justo tras el parto sino disminuirlo de forma paulatina. (García López, 2020)

49 Fundamentación teórica del cuidado de enfermería en paciente con preeclampsia

Se cree que la propuesta teórica de Hildegard E. Peplau tiene el objetivo de resaltar las tareas psicológicas que se desarrollan en la relación enfermera-paciente, lo cual depende de la capacidad de la enfermera para percibir e identificar las dificultades en su relación con la paciente y, su capacidad de ayudarlas a la resolución de problemas. Peplau realiza el análisis de las cuatro etapas de la relación enfermera-paciente y estas han sido aplicadas a la atención de nuestra paciente con preeclampsia: Orientación, identificación, aprovechamiento y resolución. (Machado et al., 2021).

Por otro lado, Jean Watson sostiene que, es necesario rescatar los aspectos humanos, espirituales y transpersonales de la práctica clínica de enfermería, elaborando su teoría “Del cuidado humano”, basándola en siete supuestos básicos. Primero, el cuidado debe ser eficaz e interpersonal. Segundo, el cuidado comprende factores que resultan de satisfacer las necesidades humanas. Tercero, el cuidado eficaz promueve la salud y el crecimiento personal. Cuarto, las

respuestas derivadas del cuidado aceptan a la persona no sólo como es, sino como la persona puede llegar a ser. Quinto, un entorno de cuidado ofrece el desarrollo del potencial, y permite elegir a la persona la mejor acción en un momento determinado. Sexto, el cuidado es más “salud-genético” que la curación, y séptimo, la práctica del cuidado es fundamental para la enfermería. (Gaona Castillo, 2021).

1 Metodología

Diseño del estudio

El enfoque metodológico del presente estudio es de un análisis cualitativo, el tipo de estudio es un caso clínico único, aplicando el proceso de atención de enfermería (PAE) para dar respuesta a los objetivos marcados en la investigación acerca de los factores de riesgo de la paciente con gestación gemelar, preeclampsia y problema de colaboración Hipertensión gestacional.

Sujeto de estudio

Paciente de 33 años, con gestación gemelar de 30 semanas por fecha de última regla, con diagnóstico médico de preeclampsia, que presenta fiebre, cefalea, dolor pélvico, hinchazón en piernas, secreción vaginal con mal olor y presencia de sangre sin coágulos, vulnerable a presentar complicaciones materno – fetal.

Ámbito y periodo del estudio

El periodo de estudio se realizó en el servicio de ginecología, atendida del 9 al 16 de setiembre del 2022.

1 Procedimiento de recojo de información

Fuente de información

Como instrumento de recolección de datos, se utilizó lo siguiente:

Recepción de información verbal de la paciente de iniciales F.E.H.M. de 33 años.

Observación directa a la paciente.

Entrevista personal al familiar directo (esposo).

Datos relevantes de la historia clínica de la paciente: Datos del registro de la evolución médica, datos de registro de las notas de enfermería, resultados de los medios de diagnóstico.

Ejecución del examen físico y confrontación de datos con las tablas de valoración.

Valoración de enfermería según los 11 patrones funcionales de Marjory Gordon.

Revisión bibliográfica de evidencia científica realizadas por otros autores de las siguientes fuentes: Science, Direct, Scielo, Elsevier, Google académico, NANDA Internacional 2021-2023, videos a través de las palabras claves como: Atención de enfermería, gestación gemelar, preeclampsia.

1 Procedimiento de información

Para proceder a la recolección de datos, se requirió la autorización previa de la paciente y del personal responsable del servicio de ginecología de la clínica, garantizando el proceso de protección y confidencialidad de los datos aportados para la realización del estudio.

Recolección de información

Se realizó en 4 fases:

Primera Fase: realizando la revisión de la historia clínica de la paciente, para extraer datos clínicos como: antecedentes personales, antecedentes familiares, motivo de la consulta, resultados de los exámenes auxiliares, diagnóstico médico principal, evolución médica, diagnósticos enfermeros y la evolución de los cuidados de enfermería.

Segunda fase: se realiza la valoración de enfermería a través de la entrevista personal, siguiendo la guía de valoración de los 11 patrones funcionales de Marjory Gordon, utilizándose

la identificación y el reconocimiento del diagnóstico principal de enfermería para la elaboración de un plan de cuidados de enfermería individualizado para el caso en estudio.

Tercera fase: Se realizó 2 seguimientos a la paciente en su primer día de ingreso a hospitalización en el servicio de Ginecología, para valorar la evolución de la gestante.

Cuarta y última fase: se realizó una revisión exhaustiva de la evidencia científica, fijándose límites según criterios de fecha, limitándose la búsqueda de información del 2019 hasta la actualidad. Se usaron base de datos: Science, Direct, Scielo, Elsevier, Google académico, NANDA Internacional 2021-2023, videos a través de las palabras claves como: Atención de enfermería, gestación gemelar, preeclampsia.

Procesamiento de los datos

El procesamiento y análisis de los datos se ha llevado a cabo en tres momentos:

Primer momento: en base a la guía de valoración de los 11 patrones funcionales de Marjory Gordon, se procedió a la realización de una red de razonamiento basada en el “Modelo AREA” gestado por Pesut y Herdman, para la selección del diagnóstico enfermero principal según la taxonomía NANDA-I 2021-2023.

Segundo momento: Tras la elección del DxEP, se procedió al establecimiento de los criterios de resultados (NOC) e intervenciones (NIC) y la selección y priorización de las actividades de enfermería.

Tercer momento: Tras la ejecución de las actividades de enfermería programadas, se procedió a la evaluación del PAE, con el objetivo de comprobar la efectividad de las intervenciones realizadas en el plan de cuidados de enfermería para una paciente con gestación gemelar, preeclampsia y problema de colaboración de hipertensión gestacional.

1 Resultados

Descripción del caso

Paciente adulta joven de iniciales HMFE, sexo femenino, de 33 años de edad, procedente del distrito de Miraflores, con grado de instrucción superior universitario, de ocupación administradora de empresas, ingresó por el área de emergencia, acompañada de su esposo por presentar temperatura de 38.7 °C, cefalea, tinnitus, dolor abdomino pélvico, edema de miembros inferiores, secreción vaginal sin coágulos con mal olor y sangre. A la evaluación médica, le diagnosticaron Gestación gemelar de 30 semanas por fecha de última regla y Probable Preeclampsia. Hospitalizada en el servicio de ginecología, se encuentra en reposo absoluto, en posición antálgica, con monitoreo permanente de funciones vitales e inicio de terapia médica.

Antecedentes familiares:

Madre: Cáncer de Cérvix e hipertensa.

Padre: Diabético e Hipertenso.

Antecedentes personales:

Alergias a medicamentos: AINES

Alergia a alimentos: Intolerante a la lactosa, alergia a los mariscos.

Metales: Niega

Rinitis alérgica: Niega

Asma bronquial: Niega

Hábitos tóxicos:

Tabaco: Niega

Alcohol: Niega

Café: Niega

Otros tóxicos: Niega

Antecedentes patológicos:

Hipertensión arterial, diagnosticada en su primera gestación, con tratamiento habitual de metildopa 250 mg cada 8 horas.

Hipotiroidismo diagnosticado hace 3 años, con tratamiento habitual levotiroxina 75 mcg cada 24 horas.

Antecedentes ginecológicos:

Menarquia a los 12 años.

FUR: 22.03.22

Gestaciones: 2

Uso de métodos anticonceptivos: Niega

Antecedentes de SOP/EPI: Si

Medicación habitual por su gestación actual: Gestavit DHA, ácido fólico.

Antecedentes epidemiológicos:

Antecedentes de ETS: Niega

Contacto TBC: Niega

Vacunas en el último año: Covid 19

Ocupación: Administradora

Actividad física: Niega

Antecedentes quirúrgicos:

Legrado uterino (2020)

Cirugía Colelap (2018)

Cirugía de aumento de mamas (2012)

PO Liposucción (2012)

Situación actual: a la evaluación, paciente lúcida, orienta en tiempo espacio y persona, glasgow 15 puntos, responde a todos los estímulos, se encuentra alerta y vigilante, refiere cefalea intensa en una escala de EVA 10/8, ventilando espontáneamente a un FIO₂: 0.21 %, con piel pálida, piel y mucosas hidratadas, sudoración normal, Abdomen blando distendido, Útero Grávido, refiere dolor en región abdomino – pélvica en EVA 10/8 puntos, deambula con limitación por cierta debilidad en miembros inferiores, se evidencian edemas en miembros inferiores +++, Eliminación vesical e intestinal espontáneas, secreción vaginal con mal olor y evidencia de leve sangrado.

Diagnóstico médico: Segundigesta nulípara de 30 ss x FUR, Gestación gemelar bicorial, biamniótico, Alto riesgo de parto prematuro, riesgo de presentar corioamnionitis, Preeclampsia.

Terapéutica médica:

Dieta Blanda, hiposódica

Reposo absoluto

Balance hídrico estricto

Control de sangrado

Monitoreo de constantes vitales cada 2 horas

Monitoreo fetal cada 4 horas

Hidratación parenteral de cloruro de sodio 0.9 %

Metildopa 250 mg vía oral cada 8 horas.

Nifedipino 30 mg/día vía oral PRN a Presión arterial mayor a 160/100 mmHg,

Gentamicina 320 mg intravenoso cada 24 horas.

Clindamicina 600 mg intravenoso cada 8 horas.

Ceftriaxona 2 gramos intravenoso cada 24 horas.

Simeticona 180 mg vía oral después de las comidas.

Omeprazol 40 mg intravenoso cada 24 horas.

Paracetamol 1 gramo intravenoso PRN a temperatura mayor o igual a 38 °C.

Exámenes de Laboratorio:

Leucocitos: 12.440 Cel/uL (Valores normales: 4,500 – 11,000 Cel/UL)

Hematocrito: 33.2 % (Valores normales: 36 – 43%)

Plaquetas: 160,000.0 Cel/uL (Valores normales: 150.000 – 475.000 Cel/uL)

Hemoglobina: 9.8 g/dl (Valores normales: 12 -16 g/dl)

Creatinina: 1.5 mg/dl (Valores normales: 0.5 – 0.9 mg/dl)

Urea: 52 mg/dl (Valores normales: 17 - 49 mg/dl)

Proteína: 8.3 g/dl (Valores normales: 6.0 – 8.3 g/dl)

Glicemia: 85 mg/dl (Valores normales: 70 – 100 mg/dl)

SARS-CoV-2 ANTIGENO: Negativo,

Hepatitis B Antígeno Australiano (HBsAg): No reactivo,

HIV Ac (Anticuerpos HIV 1-2): No reactivo.

Grupo y Factor: A negativo

Valoración del caso

Tras introducir a mi paciente según su informe clínico procedo a valorarla según los **Once**

Patrones Funcionales de Salud (PFS) de Marjory Gordon (Gordon, 1999):

Patrón Percepción - Manejo de la salud

Paciente segundigesta nulípara con actual gestación gemelar de 30 semanas, con antecedente de un aborto en el año 2020, con resultado de ecografía obstétrica de acretismo

placentario, resultados de laboratorio alterados: Leucocitos: 12.440 Cel/uL, Hematocrito: 33.2 %, Plaquetas: 160,000.0 Cel/uL, Hemoglobina: 11.8 g/dl, Creatinina: 1.3 mg/dl, Urea: 52 mg/dl, Glucemia: 83 mg/dl, SARS-CoV-2 ANTIGENO: Negativo, Hepatitis B Antígeno Australiano (HBsAg): No reactivo, HIV Ac (Anticuerpos HIV 1-2): No reactivo, Grupo y Factor: A negativo

Patrón Nutricional – Metabólico

Paciente febril (Temperatura 38.7), con piel caliente, dolor a nivel de abdomen

²⁰ Peso: 75 kg, Talla: 168 cm, IMC: 26.6 (sobrepeso) autónoma en su alimentación, consume 5 comidas al día, ha ido ganando peso en los dos últimos meses en los últimos meses. Consume líquidos con frecuencia, 2 ½ litros al día.

Suplementos adicionales que consume por su gestación: Gestavid DHA 1 tableta ⁴² vía oral cada 24 horas y ácido fólico 10 mg vía oral cada 24 horas.

Alergias a mariscos, Intolerante a la lactosa.

Buena deglución de alimentos. No presenta náuseas ni vómitos, ni los ha presentado en los últimos días.

Piel pálida, mucosas hidratadas.

Patrón Eliminación

No se evidencian datos.

Patrón Actividad – Ejercicio

¹² Presión Arterial: 190/110 mmHg, Frecuencia Cardíaca: 105 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria: 22 respiraciones por minuto, SpO2: 99 %. Pulso rítmico, sin soplo cardíaco.

Eupneica en reposo. Intolerante a la actividad física por su condición.

Permanece en cama en posición antálgica, se moviliza sólo para la eliminación fisiológica.

Paciente con deambulacion limitada por la gestacion y debilidad en miembros inferiores por los edemas y dolor.

Edemas en ambos miembros inferiores ++ que abarca desde muslos hasta los pies.

Portadora de vía periférica N° 20 en dorso de mano de miembro superior izquierdo.

Patrón Descanso – Sueño

No se evidencian datos.

Patrón Cognitivo – Perceptivo

Paciente lúcida, orientada en tiempo, espacio y persona.

A la valoración de la escala de GLASGOW 15 puntos, paciente responde a todos los estímulos, se encuentra vigilante y alerta.

No presenta problemas de lenguaje, memoria o audición.

No presenta deterioro cognitivo.

Refiere cefalea y dolor pélvico, a la valoración de la escala de EVA 10/8.

Patrón Autopercepción – Autoconcepto

Paciente presenta signos de ansiedad, angustia, temor, nerviosismo, cefalea.

Conoce de su enfermedad actual: Hipertensión, es consciente del riesgo de salud que presenta, por lo que solicita con frecuencia información de su estado de salud y el de sus bebés.

Se siente querida y apoyada por su esposo.

Patrón Rol - Relaciones

Casada, vive actualmente con su esposo.

Recibe apoyo de ambas familias.

Patrón Sexualidad – Reproducción

Embarazada de gemelos de 30 semanas. Tuvo una gestación anterior hace 2 años, que culminó con un legrado uterino. Embarazo planificado con seguimiento médico.

Mamas congestivas. Genitales con edema vulvar, sangrado vaginal sin coágulos hace 8 horas sin mal olor, no pérdida de líquido amniótico. Grupo y factor sanguíneo: A positivo.

Patrón Adaptación – Tolerancia al estrés

La paciente y su esposo, muy angustiados refieren tener mucho miedo de perder a sus bebés. Se muestran muy cooperativos con el tratamiento indicado por el ginecólogo y el plan de cuidados que requiera.

Patrón Valores – Creencias

Practicante de religión católica.

Plan de cuidados

Diagnóstico

Identificación de diagnósticos de enfermería

Se formularon los diagnósticos de Enfermería haciendo uso de la taxonomía NANDA (Heather Herdman et al.,2021)

Patrón Percepción - Manejo de la salud
(00126). Conocimiento deficiente r/c ansiedad m/p solicitud de información de su estado de salud

Definición: Ausencia de información cognitiva relacionada con un tema específico, o su adquisición.

Dominio 5: Percepción/cognición.

Clase 4: Cognición.

Patrón Nutricional – Metabólico

(00007). Hipertermia r/c estado de salud deteriorado m/p temperatura 38. 7°C.

Definición: Temperatura corporal central por encima del rango diurno normal debido a fallas en la termorregulación.

Dominio 11: Seguridad/protección.

Clase 6: Termorregulación.

Patrón Actividad – Ejercicio

(00204) Perfusión ineficaz de tejido periférico r/c hipertensión m/p presiones arteriales elevadas (PA: 160/98 mmHg)

Definición: Disminución de la circulación sanguínea hacia la periferia, que puede comprometer la salud.

Dominio 4: Actividad/descanso

Clase 4: Respuestas cardiovasculares/pulmonares.

(00303). ² Riesgo de caídas e/p disminución de la fuerza de las extremidades inferiores por edema y dolor.

Definición: Adulto susceptible de experimentar un evento que resulte en descansar inadvertidamente en el suelo, piso u otro nivel inferior, lo que puede comprometer la salud.

Dominio 11: Seguridad/protección.

Clase 2: Lesión física.

Patrón Cognitivo – Perceptivo

(00132). Dolor Agudo r/c agentes de daño biológico m/p cefalea y dolor abdomeno – pélvico.

Definición: Experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con daño tisular real o potencial, o descrita en términos de dicho daño (Asociación Internacional para el Estudio del

Dolor); aparición repentina o lenta de cualquier intensidad desde leve a grave con un final anticipado o predecible, y con una duración inferior a 3 meses.

Dominio 12: Comodidad física

Clase 1: comodidad

Patrón Autopercepción – Autoconcepto

⁵⁴(00148). Temor r/c situación desconocida m/p nerviosismo y miedo

Definición: Respuesta emocional básica e intensa que se suscita ante la detección de una amenaza inminente, que implica una reacción de alarma inmediata.

Dominio 9: Afrontamiento/tolerancia al estrés.

Clase 2: Respuesta de afrontamiento.

Patrón Sexualidad – Reproducción

¹⁰(00209). Riesgo de alteración de la diada materno – fetal e/p complicaciones en el embarazo.

Definición: Vulnerable a la interrupción de la relación simbiótica entre la madre y el feto debido a comorbilidades o condiciones relacionadas con el embarazo, que pueden afectar la salud. Taxonomía NANDA-I, (Heather Herdman et al.,2021)

Dominio 8: Sexualidad.

Clase 3: Reproducción.

(00206). Riesgo de hemorragia e/p complicaciones del embarazo (Sangrado vaginal)

Definición: Susceptible a una disminución del volumen sanguíneo, que puede comprometer la salud.

Dominio 11: seguridad/protección.

Clase 2: Lesión física.

Patrón Adaptación – Tolerancia al estrés

(00146). Ansiedad r/c factores estresantes m/p cambios en el estado de salud.

Definición: Una respuesta emocional a una amenaza difusa en la que el individuo anticipa un peligro inminente inespecífico, una catástrofe o una desgracia.


Dominio 9: Afrontamiento/tolerancia al estrés.

Clase 2: Respuesta de afrontamiento.

Diagnósticos de enfermería priorizados

Tras exponer los diferentes diagnósticos enfermeros que tiene mi paciente voy a realizar la priorización del Diagnóstico de Enfermería principal (DxEp) mediante una red de razonamiento clínico basado en el Modelo AREA (Pesut & Herman, 1999). El modelo establece redes de razonamiento clínico, basado en las relaciones que se establecen entre un número elevado de diagnósticos dando como resultado el diagnóstico más preciso y adecuado a cada caso clínico.

FIGURA N°1: Red del DxE Principal. Fuente: elaboración propia basada en el modelo AREA (Análisis del resultado del estado actual) para la obtención del diagnóstico enfermero principal.



Fuente: Elaboración de los autores en base al Modelo AREA (Pesut & Herman, 1999)

Diagnóstico de enfermería principal (DxEp)

Luego de realizar la interrelación de los diagnósticos planteados para el caso, podemos observar en la figura N°1 la elección del diagnóstico de enfermería principal:

(00209). Riesgo de alteración de la diada materno – fetal evidenciado por complicaciones en el embarazo por gestación múltiple.

Definición: Vulnerable a la interrupción de la relación simbiótica entre la madre y el feto debido a comorbilidades o condiciones relacionadas con el embarazo, que pueden afectar la salud. Taxonomía NANDA-I, (Heather Herdman et al.,2021)

Dominio 8: Sexualidad.

Clase 3: Reproducción.

Justificación del DxE Principal

En la actualidad, la probabilidad de un embarazo múltiple ha aumentado de manera considerable, debido al retraso de la maternidad y al uso de las técnicas de reproducción asistida. (Rodrigo, Aparicio Caballero, & Salvador, 2022).

Un embarazo múltiple es considerado un embarazo de riesgo, tanto para la madre como para el feto, y esto debido a los diversos cambios anatomo -fisiológicos que sufre el organismo durante toda la gestación. (Stanford Medicine, 2022).

Los embarazos múltiples son complicados debido al gran volumen que ocupa la gestación de más de un bebé. El útero soporta un exceso de peso y puede distenderse ejerciendo más presión sobre el resto de órganos, la placenta crece más de lo esperado, y existe un aumento de los niveles hormonales en sangre de la madre, concluyendo que el embarazo múltiple supone una mayor exigencia para el cuerpo de la mujer y contribuye al aumento de complicaciones como: aumento de peso, preeclampsia, entre otros (Mayo Clinic, 2022).

Las complicaciones fetales se asocian a la prematuridad y al bajo peso al nacer, ya que a mayor número de fetos menor es la duración de la gestación y menor es su peso al nacer, siendo algunas de las complicaciones: síndrome del gemelo evanescente, síndrome de transfusión feto-fetal, defectos congénitos y retraso en el crecimiento. (Rodrigo, Aparicio Caballero, & Salvador, 2022).

La díada materno-fetal es un vínculo que se asocia con aspectos emocionales y cognitivos que permiten recrear al feto como otro ser humano. Este vínculo se expresa, a través de prácticas de salud dirigidas a buscar la protección y el bienestar del feto, y a consecuencia de ciertas problemas y complicaciones durante el embarazo, como embarazo múltiple, hipertensión gestacional, entre otros, se corre un riesgo de alteración de este vínculo. (Alvarez Martinez, 2021).

Por tal razón se eligió como diagnóstico enfermero principal (DxEp) Riesgo de la alteración de la díada materno fetal.

Identificación de los Problemas de Colaboración (PC) y sus Riesgos de Complicación (RC)

Para determinar de los problemas de complicación y los riesgos de complicación, en relación al embarazo gemelar con preeclampsia, se utilizó el manual de Manual de Diagnósticos Enfermeros (Carpenito, 2017).

Problema de Colaboración en el Período prenatal: Hipertensión gestacional

Los riesgos de complicación son:


RC de hipertensión maligna.

RC de convulsiones.

RC proteinuria.

RC de compromiso fetal.

Figura N°2. Red de razonamiento basado en el Modelo AREA para la priorización del riesgo de complicación principal.



Fuente: Elaboración propia basada en el Modelo AREA (Pesut & Herman, 1999)

Identificación del RC principal

Se ha identificado como Riesgo de Complicación Principal (RC) a Hipertensión maligna por ser quien más relaciones tuvo frente a los demás, se vincula con el RC convulsiones, RC proteinuria y RC compromiso fetal.

RC Hipertensión maligna

La hipertensión maligna es la presión arterial muy alta que aparece de manera repentina y rápida, y es capaz de desencadenar complicaciones graves en la paciente.

Justificación del RC principal

La hipertensión maligna es un tipo de emergencia hipertensiva, y es tan peligrosa que puede causar complicaciones como una insuficiencia orgánica. (Medical News Today, 2021). McCarthy (2022), define a la hipertensión maligna como el aumento de la presión arterial a tal punto que produce daño orgánico, afectando al sistema nervioso, al sistema cardiovascular y a los riñones. Así mismo, refiere que el tratamiento rápido puede prevenir problemas graves como daño orgánico de los vasos sanguíneos, los ojos, el corazón, el bazo, los riñones y el cerebro.

El rol de enfermería frente a la hipertensión grave o maligna consiste en: brindar reposo absoluto a la paciente, evaluar la presión arterial frecuentemente, monitorización cardíaca, proporcionar tranquilidad a la paciente, administrar de oxígeno. De ser necesario, realizar un electrocardiograma, monitoreo de funciones vitales, según indicación médica, venoclisis y extracción de pruebas analíticas, ² vigilar los posibles efectos secundarios del tratamiento farmacológico como hipotensión, náuseas, vómitos y cefalea. Observar el monitor cardíaco en busca de posibles alteraciones del ritmo o signos de isquemia miocárdica. Valorar constantemente el estado de conciencia y observar si la paciente presenta signos de hemorragia cerebral. (Ybarra Clemente & Marin Gasco, 2021).

En conclusión, la manifestación clínica de la paciente, responden a la sintomatología de la hipertensión maligna y al riesgo de sufrir una falla orgánica multisistémica si no es controlada; la intervención oportuna debe prevenir, tratar y controlar los signos que advierten el cuadro hipertensivo.

Planificación del Diagnóstico enfermero principal (DxEp)

Después de realizar la valoración y obtener un diagnóstico enfermero, se procede a realizar un plan de seguimiento a la paciente mediante la clasificación de resultados de enfermería NOC (Sue Moorhead et al., 2018) y clasificación de Intervenciones de enfermería NIC (Butcher Howard et al., 2018).

(00209). Riesgo de alteración de la diada materno – fetal evidenciado por complicaciones en el embarazo por gestación múltiple.

Definición: Vulnerable a la interrupción de la relación simbiótica entre la madre y el feto debido a comorbilidades ¹ o condiciones relacionadas con el embarazo, que pueden afectar la salud. Taxonomía NANDA-I, (Heather Herdman et al., 2021)

Dominio 8: Sexualidad.

Clase 3: Reproducción.

Resultados NOC del DxEp

Según la taxonomía NOC, corresponde al DxEp lo siguiente:

(0111). Estado fetal: Prenatal

Definición: Grado en que los signos fetales están dentro de los límites normales desde la concepción hasta el comienzo del parto.

Dominio: Salud funcional (1)

Clase: desarrollo y crecimiento (B)

(1902). Control del riesgo

Definición: Acciones personales para comprender, evitar, eliminar o reducir las amenazas para la salud que son modificables.

Dominio: Conocimiento y conducta de salud (IV)

Clase: Control del riesgo y seguridad (T)

(1214). Nivel de agitación

Definición: Gravedad de las manifestaciones de los trastornos fisiológicos y conductuales del estrés o desencadenantes bioquímicos.

Dominio: Salud psicosocial (III)

Clase: Bienestar psicológico (M)

(1302) Afrontamiento de problemas

Definición: Acciones personales para controlar los factores estresantes que ponen a prueba los recursos del individuo.


Dominio: Salud psicosocial (III)

Clase: Adaptación psicosocial (N)

Priorización del NOC del DxEp

Realizaremos el análisis de la red de razonamiento crítico para definir el NOC principal (Figura 3).

Figura 3. Red de razonamiento basado en el Modelo AREA para la priorización del NOC del DxEp



Fuente: Elaboración propia basada en el Modelo AREA (Pesut & Herman, 1999).

Justificación del NOC principal del DxEp

NOC priorizado del DxEp

Afrontamiento de problemas: se entiende como el modo en que la persona maneja las pérdidas en las funciones corporales o las discapacidades derivadas de enfermedades. (Navarro y Bueno 2015).

Según ⁴ Nola Pender, enfermera y autora del Modelo de Promoción de la Salud (MPS), expresó que el comportamiento está motivado por el deseo de alcanzar la felicidad y el potencial humano. Está interesada en crear un modelo de enfermería que proporcione respuestas sobre cómo las personas toman decisiones sobre su propia atención médica. Su objetivo es ilustrar la naturaleza multifacética ⁴ de las personas en sus interacciones con el medio ambiente cuando intentan alcanzar un estado de salud deseado; enfatiza la conexión entre las características personales y las experiencias, conocimientos, creencias y aspectos situacionales relacionados con el comportamiento de salud o el comportamiento que una persona desea lograr.

En conclusión, se puede decir que el afrontamiento de problemas es el modo en que la persona maneja y/o acepta los problemas para conseguir la solución.

(1302) Afrontamiento de problemas

Definición: Acciones personales para controlar los factores estresantes que ponen a prueba los recursos del individuo.

Dominio: Salud psicosocial (III)

Clase: Adaptación psicosocial (N)

Tabla 1

Puntuación del NOC principal para el DxEp (Escala Likert: 1: Nunca demostrado, 2: Raramente demostrado, 3: A veces demostrado, 4: Frecuentemente demostrado, 5: Siempre demostrado)

NOC	Puntuación Inicial	Puntuación Diana	Tiempo
(1302)Afrontamiento de problemas	2	4	12

Fuente: Elaboración en base a la clasificación de resultados de enfermería NOC. A partir de Palomares-Aumatell (2017)

En relación a la puntuación trazada ¹⁹ para la medición del NOC principal para el DxEp, la valoración al inicio de las intervenciones de enfermería fue de 2 puntos (Raramente demostrado), y luego de la administración de los cuidados de enfermería, se espera alcanzar una puntuación Diana de 4 puntos (Frecuentemente demostrado).

Tabla 2

Puntuaciones de los indicadores del NOC principal según escala de Likert (1: Nunca demostrado, 2: Raramente demostrado, 3: A veces demostrado, 4: Frecuentemente demostrado, 5: Siempre demostrado)

Indicadores	Puntuación Inicial	Puntuación Diana	Tiempo
(130223) Obtiene ayuda de un profesional sanitario	2	4	12
	2	4	12

(130205) Verbaliza
aceptación de la
situación

(130220) Busca información acreditada sobre el diagnóstico	2	4	12
--	---	---	----

(130222) Busca Información acreditada sobre el tratamiento	2	4	12
--	---	---	----

Fuente: Elaboración en base a la clasificación de resultados de enfermería NOC. A partir de Palomares-Aumatell (2017).

Respecto a los indicadores trazados para la medición del NOC principal para el DxEp, la valoración al inicio de las intervenciones de enfermería fue de 2 puntos (Raramente demostrado), y luego de la administración de los cuidados de enfermería, se espera alcanzar una puntuación Diana de 4 puntos (Frecuentemente demostrado).

Intervenciones NIC para el NOC del DxEp

Se identificaron intervenciones de enfermería, utilizando la taxonomía de clasificación de intervenciones de enfermería NIC (Butcher Howard et al., 2018).

(5602) Enseñanza: Proceso Enfermedad.

Definición: Ayudar al paciente a comprender la información relacionada con un proceso de enfermedad específico.

Dominio: 3. Conductual.

Clase: S. Intervenciones para facilitar el aprendizaje.

Actividades:

(560201) Revisar el conocimiento del paciente sobre su afección.

(560202) Proporcionar información acerca de las medidas de diagnóstico disponibles, según resulte adecuado.

(560203) Comentar las opciones de terapia/tratamiento.

(560204) Instruir al paciente sobre cuáles son los signos y síntomas que debe notificar al profesional sanitario, según corresponda.

(6610) Identificación de riesgos

Definición: Análisis de los factores de riesgo potenciales, determinación de riesgos para la salud y asignación de la prioridad a las estrategias de disminución de riesgos para un individuo o grupo de personas.

Dominio 4: Seguridad.

Clase W. Control de riesgos.

Actividades:

(661001) Revisar los antecedentes médicos y los documentos previos para determinar las evidencias de los diagnósticos médicos y de cuidados actuales o anteriores.

(661002) Determinar la disponibilidad y calidad de recursos (psicológicos, económicos, nivel educativo, familia y otros recursos sociales, y comunidad).

(661003) Identificar los recursos del centro para ayudar a disminuir los factores de riesgo.

(661004) ¹ Determinar el cumplimiento de los tratamientos médicos y de Enfermería.

(5270) Apoyo emocional

Definición: Proporcionar seguridad, aceptación y ánimo en momentos de tensión

Dominio 4: Conductual.

Clase R: Ayuda para el afrontamiento.

Actividades:

(527001) Abrazar o tocar al paciente para proporcionarle apoyo.

(527002) Ayudar al paciente a reconocer sentimientos tales como la ansiedad, ira o tristeza.

(527003) Permanecer con el paciente y proporcionar sentimientos de seguridad durante los períodos de más ansiedad.

(527004) Proporcionar ayuda en la toma de decisiones.

Con respecto a las intervenciones planificadas sobre: enseñanza del proceso enfermedad, identificación de riesgos y apoyo emocional, brindadas a la paciente en un turno de 12 horas, se obtiene que la planificación es positiva, observando una notoria mejoría de la paciente logrando así la estabilización de su sintomatología.

Clasificación del Riesgo de Complicación Principal (RC): Hipertensión Maligna

Después de realizar la valoración y obtener un diagnóstico enfermero, se procede a realizar un plan de seguimiento a la paciente mediante la clasificación de resultados de enfermería NOC (Sue Moorhead et al.,2018) y clasificación de Intervenciones de enfermería NIC (Butcher Howard et al., 2018).

Resultado NOC del RC principal (RCp)

La taxonomía NOC responde a los resultados que deseamos conseguir en la paciente, se utiliza códigos de 4 dígitos e indicadores de 6 dígitos.

El RCp Hipertensión maligna, responde a los siguientes NOC:

(1822) Conocimiento: salud materna en la preconcepción


(0401) Estado circulatorio.

(0405) Perfusión tisular cardiaca

(2112) Severidad de la hipertensión

(0504) Función renal

Figura 4. Red de razonamiento basado en el Modelo AREA para la priorización del NOC del RC principal



Fuente: Elaboración propia basada en el Modelo AREA (Pesut & Herman, 1999).

NOC priorizado del RC principal Hipertensión Maligna

(2112) Severidad de la hipertensión

Definición: “Gravedad de los signos y síntomas por la presión arterial crónica”. (Moorhead et al., 2018)

Dominio: salud percibida (V)

Clase: sintomatología (V)

Tabla 3

Puntuación del NOC principal del RC principal (Escala Likert: 1: Grave, 2: Sustancial, 3: Moderado, 4: Leve, 5: Ninguno)

NOC	Puntuación Inicial	Puntuación Diana
(2112) Severidad de la hipertensión	2	4

Fuente: Elaboración en base a la clasificación de resultados de enfermería NOC. A partir de Palomares-Aumatell (2017).

En relación a la puntuación del NOC principal del RCp, según la escala de Likert, se pudo constatar un puntaje inicial de 2 puntos (sustancial) a la valoración de la paciente, teniendo como meta luego de las intervenciones del profesional de enfermería en un turno de 12 horas, obtener como resultado un puntaje Diana de 4 puntos (Leve), dando un enfoque positivo, en la evolución de la paciente.

Tabla 4

Puntuaciones de los indicadores del NOC principal del RC principal según escala de Likert (Escala Likert: 1: Grave, 2: Sustancial, 3: Moderado, 4: Leve, 5: Ninguno)

Indicadores	Puntuación Inicial	Puntuación Diana	Tiempo
(211207) Cefalea	2	4	12
(211212) Tinnitus	2	4	12
(211216) Aumento de P/A sistólica.	2	4	12
(211217) Aumento de la P/A diastólica	2	4	12

Fuente: Elaboración en base a la clasificación de resultados de enfermería NOC. A partir de Palomar-Aumatell (2017).

Intervenciones para el riesgo de complicación principal (RCp)

Se consideraron las intervenciones de enfermería en relación al RCp: Hipertensión maligna, para ello utilizamos la taxonomía de clasificación de intervenciones de enfermería NIC (Butcher Howard et al., 2018),

(6200) Cuidados en la emergencia

Definición: “Realizar la evaluación y aplicar medidas terapéuticas en situaciones urgentes”

(Butcher et. al., 2018).

Campo 4: seguridad: cuidados que apoyan contra daños

Clase U: control en caso de crisis

Actividades:

(620001) Activar el sistema de emergencia médica.

(620002) Monitorizar signos vitales de hipertensión.

(620003) Proporcionar seguridad y apoyo emocional al paciente.

(620004) Ayudar con el tratamiento proporcionando información sobre la situación potencial.

(6771) Monitorización fetal electrónica: antes del parto

Definición: “Evaluación electrónica de la respuesta cardiaca fetal al movimiento, estímulos externos o contracciones uterinas durante la prueba anterior al parto” (Butcher et. al., 2018).

Campo 5: Familia.

Clase W: cuidados de un nuevo bebé

Actividades:

(677101) Revisar el historial obstétrico, si estuviera disponible, para determinar los factores de riesgo obstétrico o médico referente al estado fetal que requieran la realización de pruebas previas al parto para comprobar el estado fetal.

(677102) Verificar la frecuencia cardiaca fetal y materno antes de iniciar la monitorización fetal electrónica.

(677103) Interpretar la tira de monitorización electrónica para la frecuencia cardiaca fetal variabilidad a largo plazo y presencia de aceleraciones, desaceleraciones o contracciones espontáneas.

(677104) Observar la tira de monitorización si hay presencia o ausencia de desaceleraciones tardías.

(677105) Comunicar los resultados de la prueba al médico responsable o a la matrona.

(4062) Cuidados circulatorios, insuficiencia arterial

Definición: “Mejora de la circulación arterial” (Butcher et. al., 2018)

Campo 2: fisiológico complejo: cuidados que apoyan la regulación homeostática

Clase N: control de la perfusión tisular

Actividades:

(406201) Realizar la valoración exhaustiva de la circulación periférica edema, relleno capilar, color y temperatura.

(406202) Evaluar edemas y pulsos periféricos

(406203) Monitorizar el balance hídrico.

Se eligió esta última intervención, ya que el riesgo de complicación principal es la “hipertensión maligna”, mediante la intervención del manejo de la convulsión; siendo el fármaco utilizado el sulfato de magnesio por vía parenteral, ejecutado en los cuidados de emergencia; de esta manera evitar el compromiso de sufrimiento fetal.

Ejecución

Para aplicar las intervenciones y actividades de enfermería, se elige un turno diurno de 12 horas; para esto, se utilizó el libro de Clasificación de Intervención de Enfermería NIC (Butcher et. al., 2018).

Tabla 5

Cronograma de intervenciones/Actividades de enfermería en Riesgo de alteración de la diada materno fetal

Fecha	Actividades interdependientes y dependientes	Turnos						
		8:30	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:30
9/9/2022	(00209) Riesgo de alteración de la diada materno – fetal	X						
	Actividades:							
	Enseñanza: Proceso Enfermedad.	X	X					
	Revisar el conocimiento del paciente sobre su afección.	X	X					
	Proporcionar información acerca de las medidas de diagnóstico disponibles, según resulte adecuado.		X	X				
	Comentar las opciones de terapia/tratamiento.			X	X			
	Instruir al paciente sobre cuáles son los signos y síntomas que debe notificar al profesional sanitario, según corresponda.				X	X		
	Identificación de riesgos.	X						
	Revisar los antecedentes médicos y los documentos previos para determinar las evidencias de los diagnósticos médicos y de cuidados actuales o anteriores.	X						
	Determinar la disponibilidad y calidad de recursos (psicológicos, económicos, nivel educativo, familia y otros recursos sociales, y comunidad).	X						
	Identificar los recursos del centro para ayudar a disminuir los factores de riesgo.	X	X					
	Determinar el cumplimiento de los tratamientos médicos y de Enfermería.		X	X				
	Apoyo emocional	X	X	X	X	X	X	X
	Abrazar o tocar al paciente para proporcionarle apoyo.	X						
	Ayudar al paciente a reconocer sentimientos tales como la ansiedad, ira o tristeza.	X	X					
	Permanecer con el paciente y proporcionar sentimientos de seguridad durante los períodos de más ansiedad.	X			X			
	Proporcionar ayuda en la toma de decisiones.			X				
9/9/2022	(RCp) Hipertension maligna							
	Actividades:							
	Cuidados en la emergencia	X						
	Activar el sistema de emergencia médica.	X						
	Monitorizar signos vitales de hipertensión.	X		X		X		X
	Proporcionar seguridad y apoyo emocional al paciente.	X	X	X	X	X	X	X
	Ayudar con el tratamiento proporcionando información sobre la situación	X						
	Monitorización fetal electrónica: antes del parto	X	X	X	X	X	X	X
	Revisar el historial obstétrico, si estuviera disponible, para determinar los factores de riesgo obstétrico o médico referente al estado fetal que requieran la realización de pruebas previas al parto para comprobar el estado fetal.	X						
	Verificar la frecuencia cardíaca fetal y materno antes de iniciar la monitorización fetal electrónica.	X	X	X	X	X	X	X
	Interpretar la tira de monitorización electrónica para la frecuencia cardíaca fetal variabilidad a largo plazo y presencia de aceleraciones, desaceleraciones o contracciones espontaneas.	X	X	X	X	X	X	X
	Observar la tira de monitorización si hay presencia o ausencia de desaceleraciones tardías.	X	X	X	X	X	X	X
	Comunicar los resultados de la prueba al médico responsable o a la matrona.	X	X	X	X	X	X	X
	Cuidados circulatorios, insuficiencia arterial	X		X		X		
	Realizar la valoración exhaustiva de la circulación periférica edema, relleno capilar, color y temperatura.	X		X		X		
	Evaluar edemas y pulsos periféricos	X		X		X		
	Monitorizar el balance hídrico.	X			X			X

Fuente: Elaboración propia en base a las actividades propuestas en la Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC)

Luego de la administración de las intervenciones principales de Enfermería, en respuesta al NOC del DxEp y el NOC del RCp, se han obtenido puntuaciones de cambio de +1 y +2.

1 Evaluación

Se realizó en base a la valoración del estado de la gestante al ingreso, comparada con los resultados, luego de la administración de las intervenciones de enfermería.

Se estableció un periodo de seguimiento en el servicio de hospitalización de Ginecología en el turno día; se observó cierto progreso, sin embargo, se necesitaba continuar con los cuidados. Se evaluaron las actividades de enfermería en base a la comparación del estado de salud de la paciente y la efectividad de los resultados planificados.

Evaluación del Resultado del Dx. E. principal

1 (00209). Riesgo de alteración de la diada materno – fetal evidenciado por complicaciones en el embarazo por gestación múltiple.

Definición: Susceptible a una interrupción de la relación simbiótica madre-fetal como resultado de condiciones comórbidas o relacionadas con el embarazo, que pueden comprometer la salud.

Dominio 8: Sexualidad.

Clase 3: Reproducción.

Tabla 6

Puntuaciones de los indicadores del diagnóstico principal según escala de Likert (1: Nunca demostrado, 2: Raramente demostrado, 3: A veces demostrado, 4: Frecuentemente demostrado, 5: Siempre demostrado)

Indicadores	Puntuación Inicial	Puntuación Diana	Puntuación alcanzada	Tiempo
(130223) Obtiene ayuda de un profesional sanitario	2	4	3	12
(130205) Verbaliza aceptación de la situación	2	4	3	12
(130220) Busca información acreditada sobre el diagnóstico	2	4	3	12
(130222) Busca Información acreditada sobre el tratamiento	2	4	3	12

Fuente: Elaboración propia en base a la clasificación de resultados NOC, a partir de Palomar-Aumatell (2017).

1 Analizando los resultados obtenidos se observa lo siguiente: en relación con los indicadores en la tabla 6, representados: el (130223) Obtiene ayuda de un profesional sanitario, 23 (130205) Verbaliza aceptación de la situación, (130220) Busca información acreditada sobre el diagnóstico, (130222) Busca Información acreditada sobre el tratamiento, 1 la paciente inició con una puntuación de 2 (Raramente demostrado) y llegó a alcanzar una puntuación de 3 (A veces demostrado) en un periodo de 12 horas, en el transcurso de este tiempo logro ser atendida por un equipo multidisciplinario, en donde pudo verbalizar sobre su situación que le afecta, logrando encontrar un diagnóstico sobre su proceso enfermedad y obtener un tratamiento adecuado para estabilizar sus patones de salud alterados y lograr la recuperación de la madre y la conservación de la gestación por medio de los cuidados aplicados.

(1302) Afrontamiento de problemas

Definición: Acciones personales para controlar los factores estresantes que ponen a prueba los recursos del individuo.

Dominio: Salud psicosocial (III)

Clase: Adaptación psicosocial (N)

Tabla 7

Puntuación del NOC principal para el DxEp (Escala Likert: 1: Nunca demostrado, 2: Raramente demostrado, 3: A veces demostrado, 4: Frecuentemente demostrado, 5: Siempre demostrado)

NOC	Puntuación Inicial	Puntuación Diana	Puntuación alcanzada	Tiempo
(1302) Afrontamiento de problemas	2	5	4	12

Fuente: Elaboración en base a la clasificación de resultados de enfermería NOC. A partir de Palomares-Aumatell (2017).

Se han realizado las intervenciones logrando la puntuación diana propuesta, siendo la puntuación inicial de 2 puntos, tras un período de 12 horas de permanencia en el servicio de hospitalización de ginecología. Se logró alcanzar una puntuación de 4 puntos según la escala de Likert, llegando a cumplir con el afrontamiento de problemas.

Evaluación del resultado del riesgo de complicación principal

Tabla N°8

Puntuación del NOC principal del RC principal (Escala Likert: 1: Grave, 2: Sustancial, 3: Moderado, 4: Leve, 5: Ninguno)

NOC	Puntuación Inicial	Puntuación Diana	Puntuación Alcanzada
(2112) Severidad de la hipertensión	2	5	4

Fuente: Elaboración en base a la clasificación de resultados de enfermería NOC. A partir de Palomares-Aumatell (2017).

Se han ejecutado las intervenciones de enfermería programadas obteniendo la puntuación diana propuesta, siendo la puntuación inicial de 2 puntos, tras un período de 12 horas de permanencia en la hospitalización. Se logró alcanzar una puntuación de 3 puntos según la escala de Likert, consiguiendo el manejo moderado de la severidad de la hipertensión en la gestante.

Tabla 9

Puntuación de los indicadores del NOC principal del RC principal según escala de Likert (1: Grave, 2: Sustancial, 3: Moderado, 4: Leve, 5: Ninguno)

Indicadores	Puntuación Inicial	Puntuación Diana	Puntuación alcanzada	Tiempo
(211207) Cefalea	2	5	4	12
(211212) Tinnitus	2	5	4	12
(211216) Aumento de P/A sistólica.	2	5	4	12
(211217) Aumento de la P/A diastólica	2	5	4	12

Fuente: *Elaboración en base a la clasificación de resultados de enfermería NOC. A partir de Palomar-Aumatell (2017).*

Observando los resultados obtenidos se observa lo siguiente: en relación con los indicadores en la tabla 9, representados: el (21207) cefalea, (211212) tinnitus, (211216) aumento de la P/A sistólica, (211217) aumento de la P/A diastólica, la paciente inició con una puntuación de 2 (sustancial) y llegó a alcanzar una puntuación de 4 (leve) en la escala de Likert en un periodo de 12 horas, logrando una buena puntuación en la estabilización de la sintomatología presentada por medio de los cuidados aplicados por el equipo multidisciplinario de salud.

1 Discusión

La paciente del presente estudio ingresó al servicio de hospitalización de ginecología, por presentar temperatura de 38.7 °C, cefalea, tinnitus, dolor abdomino pélvico, edema de miembros inferiores y P/A 190/110mm Hg, con diagnóstico médico: preeclampsia y gestación gemelar de 30 semanas por FUR y RC de hipertensión maligna como consecuencia del trastorno en el tercer trimestre de embarazo; por la que, se encuentra en el servicio de hospitalización de ginecología tras ser referida del área de emergencias para su atención oportuna y así evitar daños.

Después de la revisión bibliográfica se han obtenido numerosos estudios que muestran que los cuidados de enfermería son esenciales, integrales de calidad, y son clave para evitar las

enfermedades cerebrovasculares, cardiovasculares y renales. Afirmando lo anterior, existe evidencia científica, de que el profesional de enfermería tiene un rol clave en el control prenatal; para la detección oportuna, prevención, diagnóstico y tratamiento que logren atenuar los factores que pueden condicionar la morbilidad y mortalidad materna y perinatal. (Guarnizo et. al., 2019).

El elaborar y ejecutar el plan de cuidados de enfermería como un instrumento para establecer y documentar la situación real de la paciente, los resultados esperados, las intervenciones y la evaluación, permiten el monitoreo constante para mejorar las debilidades encontradas. El cuidado de enfermería es autónomo y colaborativo a la vez para la prestación de los servicios en la atención centrada a la persona. (OPS, 2022).

Los cambios psicofisiológicos durante el embarazo suelen ir acompañados de diferentes emociones, que ocurren a lo largo del embarazo, como cambios de humor, irritabilidad, miedo, ansiedad. Por esta razón, una mujer embarazada es considerada emocionalmente inestable, por lo que necesita ser tratada con humanidad y sentirse satisfecha con su atención por parte de un equipo de profesionales de la medicina multidisciplinario calificado. Asimismo, consideramos a la familia de la madre como otro componente mayor del cuidado integral que se le brinda, y de la intervención de enfermería que debe dirigirse a la pareja y familia, quienes también se preocupan directamente por los problemas de salud materna. para ayudar a mejorar. (Maset, 2021).

En el caso presentado, la informante fue la paciente, la recolección y valoración de datos se realizaron a través de instrumentos de valoración, apoyándonos de la entrevista y observación, así como otras fuentes de recolección de datos.

Las intervenciones de enfermería se basan en las teorías de Hildegard E. Peplau quien busca resaltar las tareas psicológicas que se desarrollan de la relación enfermera-paciente, dependiendo de la capacidad de la enfermera para reconocer las dificultades que plantean las relaciones con

sus pacientes y de la habilidad que logre para ayudarlas a resolver sus dificultades, de tal manera que puedan desarrollar nuevas facultades para el afrontamiento de problemas. (Martínez Esquivel, 2020).

Esta teoría, en relación a la situación de la paciente, tras el diagnóstico de Riesgo de alteración de la díada materno-fetal en la paciente con gestación gemelar de 30 semanas, nos orientó a mejorar el afrontamiento de los problemas mejorando la relación enfermera-paciente, así mismo, nuestros cuidados se orientaron en la teoría del “Cuidados humanizado” de Jean Watson, disminuyendo el riesgo de deshumanización en el cuidado del paciente, rescatando el aspecto humano, espiritual y transpersonal durante la atención de enfermería de la paciente gestante. (Gaona Castillo, 2021).

1 El riesgo de alteración de la díada materno-fetal se presenta como consecuencia de complicaciones del embarazo como la hipertensión y debido a un déficit de conocimientos por parte de la madre, frente a lo 1 cual el profesional de enfermería participa en el tratamiento oportuno, evitando que se produzca lesiones vasculares maternas, como el compromiso hepático, daño renal, y por consecuencia compromiso fetal. (Departamento de Obstetricia de la UC de Chile, 2020).

El RC hipertensión maligna se manifiesta con alto riesgo de sufrir convulsiones y el riesgo de compromiso fetal (Tango, 2020). La intervención oportuna con 1 las acciones de enfermería juega un rol muy importante al estar dirigidas a la prevención de dicho problema de complicación materno perinatal, con la 51 finalidad la contribuir en la reducción de la morbilidad materna y 1 establecer criterios técnicos para la prevención, el diagnóstico, tratamiento y control de preeclampsia.

1 Para concluir, como profesionales especialistas de la salud tenemos la responsabilidad de realizar una buena valoración, y a través de nuestros cuidados oportunos disminuir los riesgos de complicación en el binomio materno-fetal. 1 Luego de la atención de enfermería brindada a la paciente en un momento crítico, se logró valorar una evolución favorable comparada a la fase 57 inicial de la atención en el servicio de hospitalización de ginecología.

1 Limitaciones

Las limitaciones encontradas en el desarrollo del caso de estudio, en la gestante gemelar con preeclampsia fueron:

Tiempo limitado para el monitoreo y los cuidados a quien solo se atendió durante un turno de 12 horas en el servicio de ginecología.

19 No se pudo continuar con los cuidados en los siguientes días, debido a interferencia en las jornadas laborales de los profesionales de enfermería.

2 Al aplicar la atención de enfermería tuvimos la limitante de encontrar los diagnósticos y las intervenciones adecuadas para la patología de la paciente debido a que en el NOC y NIC no se ubica el diagnóstico de preeclampsia.

1 A la par, 1 por la situación de la pandemia COVID 19 las condiciones para el acceso de información por parte de la familia fueron limitadas, puesto que las visitas se encontraban restringidas en la institución.

Conclusiones

2 La preeclampsia es un trastorno hipertensivo que puede ocurrir durante el embarazo a partir de las 20 semanas de gestación, y se convierte en una condición grave representando un peligro importante para el binomio madre-feto. En el Perú (2020-2021), las muertes maternas

representan el 21.4% (2020) y 15.8% (2021). (MINSA, 2022), este indicador permite medir el impacto de la política de salud en la prestación de los servicios en salud materna.

Se logró aplicar el PAE, elaborando el plan de cuidados de enfermería, según la taxonomía NANDA I., NOC, NIC y el modelo bifocal de Lynda Carpenito para una paciente con gestación gemelar, preeclampsia y riesgo de complicación: hipertensión maligna, con la finalidad de fomentar el ejercicio profesional con enfoque creativo en base a las respuestas humanas frente a situaciones específicas.

La valoración por patrones funcionales, se basó en el marco teórico, en la teoría de enfermería de Hildegard Peplau y Jean Watson que ayudaron a identificar el diagnóstico de enfermería de riesgo de alteración de la diada materno fetal y problema de colaboración en la etapa prenatal Hipertensión gestacional y riesgo de complicación hipertensión maligna.

Se identificaron y describieron los factores de riesgo de la paciente con gestación gemelar y preeclampsia, considerando situaciones, características personal y enfermedad que han dificultado la capacidad de la paciente para continuar con el embarazo y proyectarnos hacia la recuperación por su vulnerabilidad al riesgo de complicación: hipertensión maligna.

Se cumplió con el 90% de las actividades del plan de cuidados de enfermería, donde se protocolizaron las actuaciones en base a las necesidades de la paciente, se monitorizaron para consolidar la evaluación y definir la mejora de las intervenciones en la paciente a través de un trabajo participativo con el equipo multidisciplinario, para la solución del problema de colaboración.

Los cuidados de enfermería, como herramienta básica y primordial fortalecieron la autonomía y empoderamiento de la enfermera en la atención de la paciente con preeclampsia; para el logro de los objetivos en la evolución del proceso enfermedad.

Mediante el plan de cuidados se logró alcanzar los objetivos propuestos priorizando el diagnóstico enfermero principal para brindar un cuidado oportuno y de calidad, mejorando el estado de salud materno- fetal.

Bibliografía

- Blanco Balbeito, Nubia, & Betancourt Roque, Yovana. (2021). La enfermería: ciencia constituida. *Revista Eugenio Espejo*, 15(2), 3-5. <https://doi.org/10.37135/ee.04.11.02>
- Alvarez Fernandez, I., Prieto, B., & Alvarez, F. V. (2018). Preeclampsia. *Revista Del Laboratorio Clínico*, 81-89.
- Alvarez Martinez, E. (Septiembre de 2021). *El apego desde el útero*. Obtenido de Psicociencias Org: https://www.psicociencias.org/pdf_noticias/El_apego_desde_el_uterio_E.Alvarez.pdf
- Amaro Cano, M. D. (Abril de 2004). *SCIELO*. Obtenido de Revista Cubana de Enfermería: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192004000100010
- Ascarelli, M. H., Johnson, V., May, W. L., & Martin, J. N. (2005). *Postpartum preeclampsia management with furosemide: a randomized clinical trial*. Obtenido de Epistemontos Foundation: <https://www.epistemontos.org/es/documents/11bdf530f72fb830b7c5ec7b01a7288dcd647b#:~:text=La%20terapia%20breve%20furosemida%20despu%C3%A9s,la%20necesidad%20de%20terapia%20antihipertensiva>.
- Bravo Andrés, N., Ledesma Redrado, A., Maestro Cebamanos, S., & Delgado Roche, E. (2021). Plan de cuidados de enfermería en la preeclampsia. A propósito de un caso. *Fundación Dialnet*.
- Bulechek, G. M., Butcher, H. K., Dochterman, J. M., & Wagner, C. M. (2014). *Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC) Sexta edición*. Barcelona: Elsevier.
- Carpenito, L. J. (2017). *Manual de Diagnósticos Enfermeros* (15.edición ed.). Philadelphia, Estados Unidos: Wolters Kluwer.
- Carvajal Carvajal, C. (Diciembre de 2017). *SCIELO*. Obtenido de Medicina Legal de Costa Rica: https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152017000200090

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. (2018). *VOLUMEN 27 - SE 44-2018 Semana epidemiológica (del 28 de octubre al 03 de noviembre de 2018)*. Lima: Boletín Epidemiológico del Perú.

Chavez Lopez, S. I., & Ñahuin Huaroc, Y. K. (2018). *Tratamiento aplicado a gestantes con trastorno hipertensivo del embarazo*. Obtenido de Repositorio de Tesis Universidad Nacional de Huancavelica:
<https://apirepositorio.unh.edu.pe/server/api/core/bitstreams/202b1c35-0974-45e0-9aef-099c25187c25/content>

Chimbo Oyaque, C. E., Mariño Tapia, M. E., Chimbo Oyaque, T. A., & Caicedo Torres, C. E. (2018). Factores de riesgo y predictores de preeclampsia: una mirada al futuro. *Revista Latinoamericana de Hipertensión*.

Clinica Delgado. (2019). *Hipertensión arterial primaria (Tratamiento farmacológico en grupos de pacientes y circunstancias especiales)*. Lima. Obtenido de Auna Clínica Delgado:
<https://clinicadelgado.pe/wp-content/uploads/2020/02/HAPpacientesespeciales.pdf>

De Jesus Garcia, A., Jimenez Baez, M. V., Gonzales Ortiz, D. G., De La Cruz Toledo, P., Sandoval Jurado, L., & Kuc Peña, L. M. (2019). *Características clínicas, epidemiológicas y riesgo obstétrico de pacientes con preeclampsia-eclampsia*. Cancún, México: Instituto Mexicano del Seguro Social.

De La Puente Vaca, L. (2021). *Importancia de los cuidados de enfermería en la preeclampsia*. Obtenido de Universidad de Valladolid:
<https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/47845/TFG-H2282.pdf;jsessionid=FCEB058DBF551027A94847F8012B062E?sequence=1>

Departamento de Obstetricia de la UC de Chile. (Octubre de 2020). *Obstetricia Pautas de manejo*. Obtenido de Facultad de Medicina de la UC Chile: <https://medicina.uc.cl/wp-content/uploads/2020/10/pautas-de-manejo-obstetricia-uc.pdf>

Diaz Cobos, D., Laparte, C., Ruiz-Zambrana, A., & Alcazar, J. L. (2015). *Screening de primer trimestre de preeclampsia tardía en gestantes de bajo riesgo en un centro de bajo volumen obstétrico: validación externa de un modelo predictivo*. Obtenido de Scielo:
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272015000300003

Elers Mastrapa, Y., & Gilbert Lamadrid, M. D. (2016). Relación enfermera-paciente: una perspectiva desde las teorías de las relaciones interpersonales. *Revista cubana de enfermería*.

Gaona Castillo, J. A. (2021). Manejos de enfermería en pacientes con preeclampsia: Revisión Sistemática. *Ocronos*.

- Garcia Hermida, M. I., Garcia Ramirez, C. G., & Garcia Rios, C. A. (2020). Comportamiento clínico epidemiológico de gestantes adolescentes con hipertensión arterial. *Archivo Médico Camagüey*, 525-537.
- Garcia Lopez, N. (19 de Mayo de 2020). *Revista electrónica de portales médicos*. Obtenido de Plan de cuidados enfermeros en paciente embarazada con hipertensión: <https://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/plan-de-cuidados-enfermeros-en-paciente-embarazada-con-hipertension/>
- Gil Cipiran, F. (6 de Abril de 2021). *Situación epidemiológica de mortalidad materna en el Perú*. Obtenido de Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y control de Enfermedades: <https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-05-07/anexo-2-cdc-minsa-muerte-materna-2020-2021-08-abril.pdf>
- Gomez Carbajal, L. M. (29 de Octubre de 2014). *SCIELO*. Obtenido de Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_serial&pid=2304-5132&lng=es&nrm=iso
- Gonzales Navarro, P., Martinez Salazar, G. G., Garcia Najera, O., & Sandoval Ayala, O. I. (2015). Preeclampsia, eclampsia y HELLP . *Revista Mexicana de Anestesiología*, 118-127.
- Grupo Inter-Agencial para la estimación de la Mortalidad Materna de las Naciones Unidas. (Diciembre de 2017). *Panorama de la Situación de la Morbilidad y Mortalidad Maternas: América Latina y el Caribe* . Obtenido de Grupo de trabajo regional para la reducción de la mortalidad materna: <https://lac.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MSH-GTR-Report-Esp.pdf>
- Guarnizo Tole, Mildred; Olmedillas Fernandez, Hugo; Vicente Rodriguez, German. (16 de Enero de 2019). *Revista cubana de obstetricia y ginecología*. Obtenido de Prácticas en enfermería para prevenir la mortalidad materna de la mujer en edad fértil: <https://revginecobstetricia.sld.cu/index.php/gin/article/view/381/299>
- Guevara Ríos, E. (2019). *La preeclampsia, problema de salud pública*. Lima, Perú: Revista Peruana de investigación Materno Perinatal.
- Guevara Rios, E., & Meza Santibañez, L. (2014). Manejo de la preeclampsia/eclampsia en el Perú. *Revista Peruana de Ginecología y obstetricia*.
- Juarez Rodriguez, P. A., & Garcia Campos, M. D. (2009). La Importancia del cuidados de Enfermería. *Revista Mexicana de enfermería*.
- Lacunza Paredes, R. O., & Avalos Gomez, J. (2019). ANTI-ANGIOGENESIS EN LA FISIOPATOLOGÍA DE LA PREECLAMPSIA. ¿LA PIEDRA ANGULAR? . *Revista Peruana de Investigación Materno Perinatal*.

- Martinez Esquivel, D. (2020). *Av Enferm*. Obtenido de Abordaje de enfermería basado en el modelo de Peplau sobre el control de impulsos ineficaz: <https://doi.org/10.15446/av.enferm.v38n1.80576>
- Maset, J. (22 de Diciembre de 2021). *Cambios físicos y psicológicos durante el embarazo*. Obtenido de Cinfasalud: <https://cinfasalud.cinfa.com/p/cambios-fisicos-y-psicologicos-durante-el-embarazo/>
- Mayo Clinic. (11 de Junio de 2022). *Mayo Clinic*. Obtenido de Preclampsia: <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/preeclampsia/symptoms-causes/syc-20355745>
- Mayo Clinic. (25 de Enero de 2022). *Mayo Clinic Org*. Obtenido de Embarazo de gemelos: Qué implican los embarazos gemelares o múltiples para las madres: <https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/pregnancy-week-by-week/in-depth/twin-pregnancy/art-20048161>
- McCarthy, A. A. (2022). *Hipertensión maligna (emergencia hipertensiva, crisis hipertensiva, urgencia hipertensiva)*. Obtenido de Western New York Urology Associates: <https://www.wnyurology.com/content.aspx?chunkiid=629512>
- Medical News Today. (29 de Junio de 2021). *Emergencia hipertensiva: Causas, síntomas y tratamiento*. Obtenido de Medical News Today: <https://www.medicalnewstoday.com/articles/es/hipertension-maligna>
- Mejia, R., & Sarto, A. (1996). <https://www.medicinabuenosaires.com/revistas/vol56-96/3/preeclampsia.htm>. *Medicina Buenos Aires*. Obtenido de FISIOPATOLOGIA DE LA PREECLAMPSIA.
- Melgarejo Aranda, H. N. (2021). *Factores de riesgos sociodemográficos y gineco obstétricos que influyen en la preeclampsia en gestantes de un hospital público de Chancay, 2021*. Obtenido de Repositorio de Tesis Universidad Peruana Union: https://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12840/4485/Hilda_Trabajo_Especialidad_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Mena Tudela, D., Gonzales Chorda, V. M., Cervera Gasch, A., Salas Medina, P., & Orts Cortes, M. I. (2016). *Cuidados Básicos de Enfermería*. Unión de Editoriales Universitarias Españolas.
- Moorhead, S., Johnson, M., Maas, M. L., & Swanson, E. (2014). *Clasificación de Resultados de enfermería (NOC) Medición de Resultados en Salud Quinta edición*. Barcelona: Elsevier.
- Morales Garcia, B., Moya Toneut, C., Blanco Balbeito, N., Moya Arechavaleta, N., Moya Arechavaleta, A., & Moya Toneut, R. (29 de Septiembre de 2017). *Infomed*. Obtenido de Revista Cubana de onstetricia y Ginecología: <http://www.revginecobstetricia.sld.cu/index.php/gin/article/view/207/166>

- NANDA INTERNACIONAL. (2021-2023). *Diagnósticos Enfermería. Definiciones y clasificación Duodécima edición*. Nueva York: Thieme. (Heather Herdman et al., 2021)
- OMS. (2013). *Recomendaciones de la OMS para la prevención y tratamiento de la preeclampsia y eclampsia*. Obtenido de Who.org:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/119742/WHO_RHR_14.17_spa.pdf
- OPS. (1 de Agosto de 2019). *Día de Concientización sobre la Preeclampsia*. Obtenido de Organización Panamericana de la Salud: <https://www.paho.org/es/noticias/1-8-2019-dia-concientizacion-sobre-preeclampsia>
- OPS. (12 de Mayo de 2022). *Día Internacional de las Enfermeras y los Enfermeros. 12 de Mayo del 2022*. Obtenido de paho.org: <http://www.paho.org/es/campanas/dia-internacional-enfermeras-enfermeros-12-mayo-2022>
- Pereira Calvo, J., Pereira Rodriguez, Y., & Quiros Figueroa, L. (Enero de 2020). *Revista médica Sinergia*. Obtenido de Actualización en preclampsia:
<https://revistamedicasinergia.com/index.php/rms/article/view/340/708>
- Pesut, D., & Herman, J. (1999). *Clinical Reasoning: The Art and Science of Critical and Creative Thinking 1st Edición*. Cengage Learning.
- Plasencia Nuñez, A. C. (2013). *Universidad Nacional de Trujillo*. Obtenido de Repositorio:
https://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/304/PlasenciaNuñez_A.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Preeclampsia Foundation. (14 de Diciembre de 2021). *preeclampsia.org*. Obtenido de Preeclampsia Foundation: <https://www.preeclampsia.org/signos-y-sintomas>
- Rodrigo, A., Aparicio Caballero, M., & Salvador, Z. (2022). Riesgos del embarazo múltiple para la madre y los bebés. *Reproducción Asistida ORG*. Obtenido de Reproducción Asistida ORG: <https://www.reproduccionasistida.org/riesgos-del-embarazo-multiple/>
- Romero E., M. A., Vargas H., V. M., & Acosta A., G. (2012). *La preeclampsia es un problema de salud pública mundial*. Santiago, Chile: Revista chilena de obstetricia y ginecología.
- Salas Ramirez, B., Montero Brenes, F., & Alfaro Murillo, G. (2020). Trastornos hipertensivos del embarazo. *Revista Médica Sinergia*.
- Segovia Vásquez, M. R., & Álvarez, C. (Diciembre de 2018). *Criterios de severidad de la enfermedad hipertensiva del embarazo*. Obtenido de Revista Nacional (Itauguá) - SCIELO: http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2072-81742018000200105

- Stanford Medicine. (2022). *Stanford Medicine Childrens Health*. Obtenido de Complicaciones de un embarazo múltiple:
<https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=complicationsofmultiplepregnancy-85-P08045>
- T. Dulay, A. (18 de Octubre de 2020). *MSD*. Obtenido de Manual MSD:
<https://www.msdmanuals.com/es-pe/professional/ginecolog%C3%ADa-y-obstetricia/anomal%C3%ADas-del-embarazo/preeclampsia-y-eclampsia>
- Tacuri Alcívar, A. J., Rodríguez Gómez, K. E., Cuadro Ayala, M. L., & Ramírez Moran, E. R. (2022). Factores clínicos y quirúrgicos que influyen en la indicación de cesárea en. *Revista Científica Dominio de las ciencias*, 1600-1616.
- Vasconcelos Amorim, T., De Oliveira Souza, I. E., Vasconcelos Moura, M. A., Acevedo Queiroz, A. B., & Oliveira Salimena, A. M. (2017). Perspectivas de los cuidados de enfermería en el embarazo de alto riesgo: revisión integradora. *Enfermería Global*.
- Velumani, V., Duran Cardenas, C., & Hernandez Gutierrez, L. (2022). *Revista de Facultad de Medicina de Mexico*. Obtenido de Preeclampsia: una mirada a una enfermedad mortal:
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-17422021000500007
- Ybarra Clemente, H., & Marin Gasco, V. (22 de Marzo de 2021). *Cuidados de enfermería en el paciente con hipertensión arterial*. Obtenido de Zona Hospitalaria:
<https://zonahospitalaria.com/cuidados-de-enfermeria-en-el-paciente-con-hipertension-arterial/>
- Villarreal-Ríos, Enrique, Camacho-Álvarez, Iraís Anahury, Vargas-Daza, Emma Rosa, Galicia Rodríguez, Liliana, Martínez-González, Lidia, & Escorcía Reyes, Verónica. (2020). Antecedente heredofamiliar de hipertensión (padre-madre), factor de riesgo para familia hipertensa (hijos). *Revista Clínica de Medicina de Familia*, 13(1), 15-21. Epub 20 de abril de 2020. Recuperado en 14 de julio de 2023, de
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-695X2020000100004&lng=es&tlng=es.
- Rojas Pérez, Lino Arturo, Villagómez Vega, María Daniela, Rojas Cruz, Augusto Ernesto, & Rojas Cruz, Andrés Eduardo. (2019). Preeclampsia - eclampsia diagnóstico y tratamiento. *Revista Eugenio Espejo*, 13(2), 79-91. <https://doi.org/10.37135/ee.004.07.09>

Calderón Restrepo, Nevardo, Pérez Muñoz, Anderson, Gutiérrez Marín, Jorge Hernán, Sanín Blair, José Enrique, García Posada, Raúl A., Cuesta, Diana Paola, & Campo Campo, María Nazareth. (2022). Manejo expectante en preeclampsia severa remota del término (24-33,6 semanas): experiencia en centro de alta complejidad. *CES Medicina*, 36(3), 38-51. Epub January 20, 2023. <https://doi.org/10.21615/cesmedicina.6881>.

Checya-Segura, Jorge, & Moquillaza-Alcántara, Víctor Hugo. (2019). Factores asociados con preeclampsia severa en pacientes atendidas en dos hospitales de Huánuco, Perú. *Ginecología y obstetricia de México*, 87(5), 295-301. Epub 30 de junio de 2021. <https://doi.org/10.24245/gom.v87i5.2753>

Rojas Pérez, Lino Arturo, Villagómez Vega, María Daniela, Rojas Cruz, Augusto Ernesto, & Rojas Cruz, Andrés Eduardo. (2019). Preeclampsia - eclampsia diagnóstico y tratamiento. *Revista Eugenio Espejo*, 13(2), 79-91. <https://doi.org/10.37135/ee.004.07.09>

Apéndice

Apéndice 1: Hoja de Valoración

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA DE LA PACIENTE GINECOOBSTETRICA

DATOS GENERALES			
Nombre del usuario: _____	Fecha de nacimiento: _____	Edad: AÑOS	
Fecha de ingreso al servicio: _____	Hora: _____	Persona de referencia: _____	Tel. _____
Procedencia: Consultorio ()	Emergencia ()	Otro: _____	
Forma de llegada: Ambulatorio ()	Silla de ruedas ()	Camilla ()	
Fuente de Información: Paciente ()	Familiar/amigo ()	Otro: _____	
Motivo de ingreso: _____	Dx. Médico: _____		
Fecha de valoración: _____	Seguro: _____		

VALORACIÓN SEGÚN PATRONES FUNCIONALES DE SALUD

PATRÓN PERCEPCIÓN - CONTROL DE LA SALUD	PATRÓN DE SEXUALIDAD/REPRODUCCIÓN
Antecedentes de enfermedad y quirúrgicas: HTA () DM () Abortos () Gastritis/Úlcera () TBC () Asma () VIH () VDRL () Otros _____ Intervenciones quirúrgicas: No () Sí () (fechas) Legrado uterino _____ Alergias y otras reacciones: Fármacos: Niega Alimentos: niega Signos-síntomas: niega Otros _____ Factores de riesgo: Consumo de tabaco No () Sí () Consumo de alcohol No () Sí () Consumo de drogas No () Sí () Medicamentos (con o sin indicación médica) ¿Qué toma actualmente? Dosis/Frec. Última dosis _____ _____ _____ Estado de higiene Buena () Regular () Mala () ¿Qué sabe usted sobre su enfermedad actual? ¿Qué necesita usted saber sobre su enfermedad?	Formula Obstétrica: G 1 P 0010 EG: N° CPN: FUR: FPP: Mamas: sensibles () No sensibles () Pezones: Formados () planos () invertidos () Útero: Altura Uterina: _____ Dinámica uterina: Frecuencia: _____ Tono: _____ Intensidad: _____ Movimientos Fetales: Sí () No () LCF: _____ Perdidas Vaginales: Líquido amniótico () Sangrado Vaginal: Sí () No () Secreciones Vaginales: Sí () No () Características: _____ Comentarios adicionales: _____ _____
PATRÓN DE RELACIONES - ROL Ocupación: Estado civil: Soltera () Casada () Conviviente () Divorciada () ¿Con quién vive? Sola () Con su familia () Otros _____ Fuentes de apoyo: Familia () Amigos () Otros _____ Comentarios adicionales: _____ _____ Abdomen grávido: Normal () Distendido () Doloroso () Ruidos hidroaéreos: Aumentados () Normales () Disminuidos () ausentes () Comentarios adicionales: _____	PATRÓN NUTRICIONAL - METABÓLICO T: _____ °C Peso: Talla: _____ Glucosa: Hb: g/dl Piel: Coloración: Normal () Pálida (x) Robicunda () Cianótica () Ictérica () Hidratación: Seca () Turgente () Integridad: Intacta () Lesiones () Especificar: palidez moderada Cavidad bucal: Dentadura: Completa () Ausente () Incompleta () Prótesis () Estado de higiene bucal: Mala () Regular () Buena () Hidratación: Sí () No () Cambio de peso durante los últimos días: Sí () No () Obesidad: () Bajo peso: () Otros _____ Especificar: _____ Apetito: Normal () Disminuido () Aumentado () Dificultad para deglutir: Sí () No () Náuseas (x) Pirosis () Vómitos () Cantidad: _____
	PATRÓN AUTOPERCEPCIÓN-AUTOCONCEPTO TOLERANCIA A LA SITUACIÓN Y AL ESTRÉS Estado emocional: _____

PATRÓN DE ACTIVIDAD – EJERCICIO

ACTIVIDAD RESPIRATORIA

FR: 22x Respiración: superficial(x) profunda()
 Disnea: En reposo() Al ejercicio ()
 Se cansa con facilidad: No () Si ()
 Ruidos respiratorios: _____
 Tos ineficaz: No() Si ()
 Reflejo de la tos: Presente() Ausente() Disminuido ()
 Secreciones: No () Si () □
 Características: _____
 O2: No (x) Si () □
 Modo: _____ /min _____

ACTIVIDAD CIRCULATORIA

Pulso periférico:
 Edema: No Si Localización: _____
 +() ++() +++()
 Presencia de líneas invasivas:
 Cateter periférico: no

EJERCICIO: CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO

1= Independiente 3= Totalmente dependiente
 2= Parcialmente dependiente

	1	2	3
Movilización en cama			
Deambula			
Ir al baño/bañarse			
Tomar alimentos			
Vestirse			

Aparatos de ayuda: ninguno() S. ruedas() Otros: _____
 Movilidad de miembros: Conservada() Flacidez()
 Contracturas() Parálisis ()
 Fuerza muscular: Conservada() Disminuida()
 Comentarios adicionales: _____

PATRÓN PERCEPTIVO – COGNITIVO

Orientado: Tiempo() Espacio(x) Persona (x)
 Presencia de anomalías en:
 Audición: no
 Visión: no
 Habla/lenguaje: no
 Otro: _____
 Dolor: No () Si () Localización: abdomen con predominio en hipogastrio
 Cefalea () Dinámica Uterina()
 Escala del Dolor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Otros: dolor 10/10

Tranquila () ansiosa() Negativa() Temerosa ()
 Irritable () Indiferente() Depresiva ()
 Preocupaciones principales/comentarios:
 Paciente desea tener bebés

PATRÓN DE ELIMINACIÓN

Hábitos intestinales

Nº de deposiciones/día: _____ Normal () Estreñimiento ()
 Diarrea () Incontinencia()

Hábitos vesicales

Frecuencia: _____ / día
 Polaquiúria () Disuria () Nicturia ()
 Proteinuria: _____ Albumina en orina: _____
 Otros: _____
 Comentarios adicionales: _____

PATRÓN DE DESCANSO – SUEÑO

Horas de sueño: _____
 Problemas para dormir: Si () No(x)
 Especificar: _____
 ¿Usa algún medicamento para dormir? Si () No(x)
 Especificar: _____

PATRÓN DE VALORES – CREENCIAS

Religión: _____
 Restricciones religiosas: _____
 Solicita visita de capellán: Si () No(x)
 Comentarios adicionales: _____

Nombre del enfermero: _____
 Firma: _____ CEP: _____
 Fecha: _____

TRATAMIENTO MÉDICO ACTUAL:

EXAMENES AUXILIARES:
Gonadotropina coriónica cuantitativa en sangre; positiva 18000UI
HEMOGRAMA:
LEUCOSITOS: 11.000
ABASTONADOS:04
ERITROSITOS:3930 X 10UL
ECOGRAFIA TV

PRUEBAS DE BIENESTAR FETAL:
 NST: TST:
 ECO: Perfil biofísico:

Apéndice 2: Consentimiento Informado



Universidad Peruana Unión

Escuela de Posgrado

UPG de Ciencias de la Salud

Consentimiento informado de Propósito y procedimientos

Se me ha comunicado que el título del trabajo académico es “Cuidados de enfermería a paciente con gestación gemelar y preeclampsia del servicio de ginecología en una clínica de Lima, 2022”, El objetivo de este estudio es Describir los cuidados de enfermería en paciente con gestación gemelar y preeclampsia. Este trabajo académico está siendo realizado por las licenciadas: Josselyn Andrea Salazar Aquino y Victcely del Carmen Salcedo de Vega, bajo la asesoría de la Mg. Sofía Dora Vivanco Hilario. La información obtenida a través de la guía de valoración, entrevista y examen físico será de carácter confidencial y se utilizarán sólo para fines del estudio.

Riesgos del estudio

Se me ha informado que no hay ningún riesgo físico, químico, biológico y psicológico asociado con este trabajo académico. Pero, como se obtendrá alguna información personal, está la posibilidad de que mi identidad pueda ser descubierta por la información otorgada. Sin embargo, se tomarán precauciones como la identificación por números para minimizar esta eventualidad.

Beneficios del estudio

No hay compensación monetaria por la participación en este estudio.

Participación voluntaria

Se me ha comunicado que mi participación en el estudio es completamente voluntaria, y que tengo el derecho de retirar mi consentimiento en cualquier momento, antes que el informe esté finalizado sin ningún tipo de penalización. Lo mismo se aplica por mi negativa inicial a la participación en este proyecto.

Habiendo leído detenidamente el consentimiento y he escuchado las explicaciones orales del investigador, firmo voluntariamente el presente documento.

Nombre y apellido: F.E.H.M.

Fecha: Setiembre 2022.

Apéndice 3: Escalas de valoración

Evaluación de la escala BRADEN (Riesgo de lesiones en la piel)

ESCALA BRADEN		Puntaje
PERCEPCIÓN SENSORIAL	Sin Limitaciones	4
EXPOSICIÓN A LA HUMEDAD	Raramente húmeda	4
ACTIVIDAD FISICA/DEAMBULACIÓN	Deambula frecuentemente	4
MOVILIDAD/CAMBIOS POSTURALES	Ligeramente limitada	3
NUTRICIÓN	Adecuada	3
RIESGO DE LESIONES CUTÁNEAS	Sin riesgo aparente	3
Puntaje final		21

RIESGO	PUNTAJE
ALTO	<12
BAJO	13-15
MEDIO	16-18
SIN RIESGO	>19

Fuente: Escala de Braden Historia clínica electrónica de Clínica Delgado AUNA (2022)

Escala visual analógica (EVA) para la medición del dolor



Fuente: Escala de Eva del dolor, Cilef medical 2019.

Evaluación de la escala MORSE (Riesgo de caídas)

ESCALA MORSE		Puntaje
CAÍDAS RECIENTES	No	0
DIAGNÓSTICO SECUNDARIO	Sí	15
AYUDA PARA DEAMBULAR	Con apoyo	15
VÍA VENOSA	Si	20
DEAMBULACIÓN	Débil	10
CONCIENCIA	Consciente	0
Puntaje total		60

RIESGO	PUNTAJE	ACCIÓN
BAJO	0 - 24	Cuidados generales de enfermería
MEDIO	25-50	Requiere plan de intervención.
ALTO	>50	Requiere cuidados especiales.

Fuente: Escala de Morse Historia clínica electrónica de Clínica Delgado AUNA (2022)

A la valoración de la escala de GLASGOW, paciente responde a todos los estímulos, se encuentra vigilante y alerta.

ESCALA DE GLASGOW		Puntaje
APERTURA OCULAR	Espontánea	4
RESPUESTA VERBAL	Orientada	5
RESPUESTA MOTORA	Obedece órdenes	6
Puntaje final		15

Fuente: Escala de Glasgow Historia clínica electrónica de Clínica Delgado AUNA (2022)

Valores y Clasificación de la Presión Arterial

AMERICAN HEART ASSOCIATION	PRESION SISTOLICA	PRESION DIASTOLICA	RECOMENDACIONES
NORMAL	< 120	< 80	Seguir un estilo de vida saludable y realizar un chequeo cada año
ELEVADA	120 - 129	< 80	Cambios de estilo de vida y reevaluación en 3 - 6 meses
ALTA (HIPERTENSION GRADO I)	130 - 139	80 - 89	Cambios de estilo de vida, medicación con control mensual hasta que la presión este controlada
ALTA (HIPERTENSION GRADO II)	> 140	> 90	Cambios de estilo de vida, dos diferentes tipos de medicamentos con control mensual hasta que la presión este controlada
CRISIS HIPERTENSIVA	> 180	> 120	Urgencia y Emergencia

Fuente: Clasificación de la presión arterial según la guía AHA (American Heart Association) (2017).

Modelo AREA (Modificado)

MARCO

Persona VALORACION:
 Paciente lúcida, orientada en tiempo, espacio y persona, con GLASGOW de 15, responde a estímulos, se encuentra vigilante y alerta. Segundigesta nulipara con actual gestación gemelar de 30 semanas, antecedente de un aborto en el año 2020, con resultado de ecografía obstétrica de acrotismo placentario, resultados de laboratorio alterados.
 Peso: 75 kg. Talla: 168 cm, IMC: 26.6 (sobrepeso), ha ido ganando peso en los dos últimos meses. Alergias a mariscos, Intolerante a la lactosa.
 Presión Arterial: 190/110 mmHg, Frecuencia Cardiaca: 105 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria: 22 respiraciones por minuto, SpO2: 99 %. Pulso rítmico, sin soplo cardíaco.
 Permanece en cama en posición antálgica, se moviliza sólo para la eliminación fisiológica, con deambulación limitada por la gestación, dolor y Edemas en ambos miembros inferiores ++ que abarca desde muslos hasta los pies. Portadora de vía periférica N° 20 en dorso de mano de miembro superior izquierdo.
 Refiere cefaleas y dolor pélvico, a la valoración de la escala de EVA 10/8.
 Paciente con signos de ansiedad, angustia, temor, nerviosismo, cefalea.
 Conoce de su enfermedad actual: Hipertensión, solicita con frecuencia información de su estado de salud y el de sus bebés. Mamas congestivas. Genitales con edema vulvar, sangrado vaginal sin coágulos hace 8 horas sin mal olor, no pérdida de líquido amniótico.
 La paciente y su esposo, muy angustiados refieren tener mucho miedo de perder a sus bebés. Se muestran muy cooperativos con el tratamiento indicado por el ginecólogo y el plan de cuidados que requiera.

DxEp
0209
Riesgo de alteración de la diada materno – fetal evidenciado por complicaciones en el embarazo por gestación múltiple.

Reflexión Profesional: El logro de los resultados en la gestante se obtuvieron durante el tiempo planificado. La estabilidad de la paciente en el área de hospitalización de ginecoobstetricia, se ha alcanzado el objetivo de identificar los factores de riesgo en la preeclampsia y elaborar un plan de cuidados de enfermería individualizado, logrando que la paciente se estabilizara gradualmente evitando complicación materno perinatal, por lo que, nuestro proceso de atención ha sido exitoso para la conservación de la diada materno fetal en este caso.

NOC	Estado/conducta/percepción	Estandar de normalidad	NOCp	PI	PD	TIEMPO	PA - EVALUACION
(1302) Afrontamiento de problemas	Raramente demostrado	Frecuentemente demostrado.	(1302) Afrontamiento de problemas	2	4	12	Con la atención de enfermería se ha logrado una puntuación de + 2
Indicador (130223) Obtiene ayuda de un profesional sanitario	Raramente demostrado	Proporcionar información acerca de las medidas de diagnóstico disponibles, según resulte adecuado.	Indicador (130223) Obtiene ayuda de un profesional sanitario	2	4	12	Con la atención de enfermería se ha logrado una puntuación Diana de 4 (+ 2)
Indicador (130205) Verbaliza aceptación de la situación	Raramente demostrado	Reconocer sentimientos tales como la ansiedad, ira o tristeza.	Indicador (130205) Verbaliza aceptación de la situación	2	4	12	Con la atención de enfermería se ha logrado una puntuación Diana de 4 (+ 2)
Indicador (130220) Busca información acreditada sobre el diagnóstico	Raramente demostrado	Identificar los recursos del centro para la ayuda a disminuir los factores de riesgo.	Indicador (130220) Busca información acreditada sobre el diagnóstico	2	4	12	Con la atención de enfermería se ha logrado una puntuación Diana de 4 (+ 2)
Indicador (130222) Busca Información acreditada sobre el tratamiento	Raramente demostrado	Determina el cumplimiento de los tratamientos médicos y de Enfermería.	Indicador (130222) Busca Información acreditada sobre el tratamiento	2	4	12	Con la atención de enfermería se ha logrado una puntuación Diana de 4 (+ 2)

Escala de Likert (1: Nunca demostrado, 2: Raramente demostrado, 3: A veces)

NIC: (5602) Enseñanza: Proceso Enfermedad
 (560201) Revisar el conocimiento del paciente sobre su afección. (560202) Proporcionar información acerca de las medidas de diagnóstico disponibles, según resulte adecuado.
 (560203) Comentar las opciones de terapia/tratamiento.
 (560204) Instruir al paciente sobre cuáles son los signos y síntomas que debe notificar al profesional sanitario, según corresponda.

NIC: (6610) Identificación de riesgos
 (661001) Revisar los antecedentes médicos y los documentos previos para determinar las evidencias de los diagnósticos médicos y de cuidados actuales o anteriores.
 (661002) Determinar la disponibilidad y calidad de recursos (psicológicos, económicos, nivel educativo, familia y otros recursos sociales, y comunidad).
 (661003) Identificar los recursos del centro para ayudar a disminuir los factores de riesgo.
 (661004) Determinar el cumplimiento de los tratamientos médicos y de Enfermería.

Escala de Likert (1: Nunca demostrado, 2: Raramente demostrado, 3: A veces)

NIC: (5270) Apoyo emocional
 (527001) Abrazar o tocar al paciente para proporcionarle apoyo.
 (527002) Ayudar al paciente a reconocer sentimientos tales como la ansiedad, ira o tristeza.
 (527003) Permanecer con el paciente y proporcionar sentimientos de seguridad durante los períodos de más ansiedad.
 (527004) Proporcionar ayuda en la toma de decisiones.

Nota. Fuente: Elaboración de los autores, a partir de Palomar-Aumatell (2017)

Modelo BIFOCAL

MARCO

Reflexión Profesional: NOC DxEp - Los resultados en la gestante se alcanzaron según las intervenciones de enfermería planificadas dentro del tiempo establecido, logrando los objetivos planteados. Frente a un adecuado manejo de los problemas de la paciente como es el caso: preeclampsia, gestación múltiple, un adecuado asesoramiento, nuestra paciente mejoró paulatinamente durante su estancia en el servicio de hospitalización. Mediante el plan de cuidados se logró alcanzar los objetivos propuestos priorizando el diagnóstico enfermero principal para brindar un cuidado oportuno y de calidad, mejorando el estado de salud materno- fetal.

Persona VALORACION:
 Paciente consciente, orientada en tiempo, espacio y persona, con GLASGOW de 15, responde a estímulos, se encuentra vigilante y alerta. Segundigesta nulipara con actual gestación gemelar de 30 semanas, antecedente de un aborto en el año 2020, con resultado de ecografía obstétrica de acretismo placentario, resultados de laboratorio normales.
 Pesa: 75 kg, Talla: 168 cm, IMC: 26.6 (sobrepeso), ha ido ganando peso en los dos últimos meses. Alergias a mariscos, Intolerante a la lactosa.
 Presión Arterial: 190/110 mmHg, Frecuencia Cardíaca: 105 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria: 22 respiraciones por minuto, SpO2: 99 %. Pulso rítmico, sin soplo cardíaco. Permanece en cama en posición antálgica, se moviliza sólo para la eliminación fisiológica, con deambulación limitada por la gestación, dolor y Edemas en ambos miembros inferiores ++ que abarca desde muslos hasta los pies.
 Portadora de vía periférica N° 20 en dorso de mano de miembro superior izquierdo.
 Quejosa de cefalea y dolor pélvico, a nivel de la escala de EVA 10/8.
 Paciente con signos de ansiedad, angustia, temor, nerviosismo, cefalea.
 Conoce de su enfermedad actual: Hipertensión, solicita con frecuencia información de su estado de salud y el de sus bebés. Mamas congestivas. Genitales con edema vulvar, sangrado vaginal sin coágulos hace 8 horas sin mal olor, no pérdida de líquido amniótico.
 La paciente y su esposo, muy angustiados refieren tener mucho miedo de perder a sus bebés. Se muestran muy cooperativos con el tratamiento indicado por el ginecólogo y el plan de cuidados que requiera.

Persona RCp
RC: Hipertensión maligna

Planificación NOCp(DxEp) (1302) Afrontamiento de problemas	1	PD	Tiempo	PA -Evaluación	Planificación NOCp (RCp) (2112) Severidad de la hipertensión	1	PD	Total	PA Evaluación
Indicador (130223) Obtiene ayuda de un profesional sanitario	2	4	12 horas	1 Con la atención de enfermería administrada a la paciente se logró una puntuación Diana de 4	(211207) Cefalea	2	4	12 horas	Con la atención de enfermería brindada se logró una puntuación Diana de 4. (+2)
Indicador (130205) Verbaliza aceptación de la situación	2	4	12 horas	1 Con la atención de enfermería administrada a la paciente se logró una puntuación Diana de 4 (+2)	(211212) Tinnitus	2	4	12 horas	Con la atención de enfermería brindada se logró una puntuación Diana de 4. (+2)
Indicador (130220) Busca información acreditada sobre el diagnóstico	2	4	12 horas	1 Con la atención de enfermería administrada a la paciente se logró una puntuación Diana de 4 (+2)	(211216) Aumento de P/A sistólica.	2	4	12 horas	Con la atención de enfermería brindada se logró una puntuación Diana de 4. (+2)
Indicador (130222) Busca información acreditada sobre el tratamiento	2	4	12 horas	1 Con la atención de enfermería administrada a la paciente se logró una puntuación Diana de 4 (+2)	(211217) Aumento de la P/A diastólica	2	4	12 horas	1 Con la atención de enfermería brindada se logró una puntuación Diana de 4. (+2)
Escala Likert 1: Nunca demostrado, 2: Raramente demostrado, 3: A veces demostrado, 4: Frecuentemente demostrado, 5: Siempre demostrado.					Escala Likert 1: Grave, 2: Sustancial, 3: Moderado, 4: Leve, 5: Ninguno.				
NICs para NOCs (DxEp)									
<p>NIC: (5602) Entrenamiento: Proceso Enfermedad. (560201) Aumentar el conocimiento del paciente sobre su afección. (560202) Proporcionar información acerca de las medidas de diagnóstico disponibles, según resulte adecuado. (560203) Presentar las opciones de terapia/tratamiento. (560204) Instruir al paciente sobre cuáles son los signos y síntomas que debe notificar al profesional sanitario, según corresponda.</p> <p>NIC: (6610) Identificación de riesgos 661001) Revisar los antecedentes médicos y los documentos previos para determinar las evidencias de los diagnósticos médicos y de cuidados actuales o anteriores. (661002) Determinar la disponibilidad y calidad de recursos (psicológicos, económicos, nivel educativo, familiares y recursos sociales, y comunidad). (661003) Identificar los recursos del centro para ayudar a disminuir los factores de riesgo. (661004) Determinar el cumplimiento de los tratamientos médicos y de Enfermería.</p> <p>NIC: (5270) Apoyo emocional (527001) Ayudar o tocar al paciente para proporcionarle apoyo. (527002) Ayudar al paciente a reconocer sentimientos tales como la ansiedad, ira o tristeza. (527003) Permanecer con el paciente y proporcionar sentimientos de seguridad durante los períodos de más ansiedad.</p>									
NICs para NOCs (RCp)									
<p>NIC: (6200) Cuidados en la emergencia (620001) Activar el sistema de emergencia médica. (620002) Monitorizar signos vitales de hipertensión. (620003) Proporcionar seguridad y apoyo emocional al paciente. (620004) Ayudar con el tratamiento proporcionando información sobre la situación potencial.</p> <p>NIC: (6771) Monitorización fetal electrónica: antes del parto (677101) Revisar el historial obstétrico, si estuviera disponible, para determinar los factores de riesgo obstétrico o médico referente al estado fetal que requieran la realización de pruebas antes al parto para comprobar el estado fetal. (677102) Verificar la frecuencia cardíaca fetal y materno antes de iniciar la monitorización fetal electrónica. (677103) Interpretar la tira de monitorización electrónica para la frecuencia cardíaca fetal (viabilidad a largo plazo y presencia de aceleraciones, desaceleraciones o contracciones fetales). (677104) Observar la tira de monitorización si hay presencia o ausencia de desaceleraciones fetales. (677105) Comunicar los resultados de la prueba al médico responsable o a la matrona.</p> <p>NIC: (4062) Cuidados circulatorios, insuficiencia arterial (406201) Realizar la valoración exhaustiva de la circulación periférica edema, relleno capilar, color y temperatura. (406202) Evaluar edemas y pulsos periféricos (406203) Monitorizar el balance hídrico.</p>									

Nota. Fuente: Elaboración de los autores, apartir de Palomar-Aumatell (2017)

● 20% de similitud general

Principales fuentes encontradas en las siguientes bases de datos:

- 20% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 2% Base de datos de publicaciones

FUENTES PRINCIPALES

Las fuentes con el mayor número de coincidencias dentro de la entrega. Las fuentes superpuestas no se mostrarán.

1	repositorio.upeu.edu.pe	Internet	9%
2	hdl.handle.net	Internet	2%
3	dominiodelasciencias.com	Internet	<1%
4	repositorio.ug.edu.ec	Internet	<1%
5	repositorio.upao.edu.pe	Internet	<1%
6	repositorio.unsa.edu.pe	Internet	<1%
7	1library.co	Internet	<1%
8	fenixfundacion.org	Internet	<1%
9	congreso enfermeria.com	Internet	<1%

10	qdoc.tips	Internet	<1%
11	pesquisa.bvsalud.org	Internet	<1%
12	dspace.utb.edu.ec	Internet	<1%
13	empresas.sence.cl	Internet	<1%
14	uvadoc.uva.es	Internet	<1%
15	ruc.udc.es	Internet	<1%
16	repositorio.upla.edu.pe	Internet	<1%
17	zagan.unizar.es	Internet	<1%
18	awomansview.com	Internet	<1%
19	repositorio.upeu.edu.pe:8080	Internet	<1%
20	es.scribd.com	Internet	<1%
21	dspace.unach.edu.ec	Internet	<1%

22	mindomo.com	Internet	<1%
23	fr.scribd.com	Internet	<1%
24	scielo.isciii.es	Internet	<1%
25	buenastareas.com	Internet	<1%
26	reproduccionasistida.org	Internet	<1%
27	docplayer.es	Internet	<1%
28	drug-mechanism-of-action.com	Internet	<1%
29	scribd.com	Internet	<1%
30	rraae.cedia.edu.ec	Internet	<1%
31	nnnconsult.com	Internet	<1%
32	repositorioinstitucional.buap.mx	Internet	<1%
33	repositorio.unjbg.edu.pe	Internet	<1%

34	s67d378623b10162d.jimcontent.com	Internet	<1%
35	docsity.com	Internet	<1%
36	es.slideshare.net	Internet	<1%
37	repositorio.ucam.edu	Internet	<1%
38	repositorio.utn.edu.ec	Internet	<1%
39	documentop.com	Internet	<1%
40	edoc.pub	Internet	<1%
41	livrosdeamor.com.br	Internet	<1%
42	aprenderly.com	Internet	<1%
43	repositorio.sibdi.ucr.ac.cr:8080	Internet	<1%
44	Julia Bernal Tirapo, Javier García Borda, Eduardo Ferrero Herrero. "Obs...	Crossref	<1%
45	repositorio.puce.edu.ec	Internet	<1%

46	ateservizi.it	Internet	<1%
47	do.emb-japan.go.jp	Internet	<1%
48	repositorio.ucv.edu.pe	Internet	<1%
49	repositorio.unemi.edu.ec	Internet	<1%
50	repositorio.unfv.edu.pe	Internet	<1%
51	repositorio.uwiener.edu.pe	Internet	<1%
52	ru.dgb.unam.mx	Internet	<1%
53	worldwidescience.org	Internet	<1%
54	aentde.com	Internet	<1%
55	gestiopolis.com	Internet	<1%
56	logoss.net	Internet	<1%
57	minsa-pmss.gob.ni	Internet	<1%

58

slideshare.net

Internet

<1%

● Excluir del Reporte de Similitud

- Base de datos de contenido publicado de Crossref
- Base de datos de trabajos entregados
- Material bibliográfico
- Material citado
- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 8 palabras)
- Bloques de texto excluidos manualmente

BLOQUES DE TEXTO EXCLUIDOS

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓNE **ESCUELA DE POSGRADO** **Unidad de Posgrado de C...**

repositorio.upeu.edu.pe

Mg. Sofía Dora Vivanco Hilario **Lima**

repositorio.upeu.edu.pe

Sofía Dora Vivanco Hilario, adscrita en la Facultad de Ciencias de la Salud, y docen...

repositorio.upeu.edu.pe

para obtener el Título de Segunda Especialidad **Profesional de Enfermería: Gineco ...**

hdl.handle.net

a **Autores del trabajo académico, Unidad de**

hdl.handle.net

cualitativo, tipo caso único, aplicando el proceso de atención de enfermería (PAE

repositorio.upeu.edu.pe

un problema

www.revista-portalesmedicos.com

the assessment guide of the 11 functional patterns of Marjory Gordon

repositorio.upeu.edu.pe

In conclusion, it was possible to identify the

rraae.cedia.edu.ec

lúcida, orientada entiempos, espacio y persona, conGLASGOW de 15

hdl.handle.net

alteración de ladiada materno -fetal

1library.co

Proporcionarinformación acerca de las medidas de diagnóstico disponibles, segú...

hdl.handle.net

130205)Verbaliza aceptación dela situación

www.scribd.com

Con la atención de enfermería se

repositorio.upeu.edu.pe

Identificar los recursos del

dspace.unach.edu.ec

130205) Verbalizaaceptación de la situación

www.scribd.com

Proporcionar informaciónacerca de las medidas dediagnóstico disponibles,según ...

edoc.pub

Revisar los antecedentes médicos y los documentos previos para determinar lase...

ruc.udc.es

Permanecer con el paciente y proporcionar sentimientos de seguridaddurante los ...

www.scribd.com

Presión Arterial

dspace.utb.edu.ec

Peso: 75 kg, Talla: 168 cm, IMC:26

es.scribd.com

Escala de Likert (1: Nunca demostrado, 2: Raramente demostrado, 3: A veces

repositorio.ucam.edu

Abrazar o tocar al paciente para proporcionarle apoyo

qdoc.tips

plan de cuidados se logró alcanzar los objetivos propuestos priorizando el diagnóstico...

hdl.handle.net

Revisar los antecedentes médicos y los documentos previos para determinar las e...

www.revistasanitariadeinvestigacion.com

620003) Proporcionar seguridad y apoyo emocional al paciente.(620004) Ayudar c...

hdl.handle.net

677103) Interpretar la tira de monitorización electrónica para la frecuencia cardiac...

hdl.handle.net

valoración de la escala de EVA

hdl.handle.net

Reconocer sentimientos tales como la ansiedad, ira o tristeza

fenixfundacion.org

90 Cambios de estilo de vida

www.studocu.com

hasta que la presión este controlada ALTA (HIPERTENSION GRADO

www.studocu.com

RECOMENDACIONES NORMAL < 120 < 80 Seguir un estilo de vida saludable y

repositorio.ug.edu.ec

ESCALA DE GLASGOW

historico.cnsc.gov.co

la valoración de la escala de GLASGOW, paciente

hdl.handle.net

Escala visual analógica (EVA) para la medición del

repositorio.upeu.edu.pe

dolorFuente: Escala de Eva del dolor, Cilef medical 2019

hdl.handle.net

Ligeramentelimitada3NUTRICIÓNAdecuada3RIESGO DE LESIONES CUTÁNEAS

historico.cnsc.gov.co

PERCEPCIÓN SENSORIALSin Limitaciones4EXPOSICIÓN A LA HUMEDADRaramen...

historico.cnsc.gov.co

La información

hdl.handle.net

Consentimiento InformadoUniversidad Peruana UniónEscuela de PosgradoUPG de...

hdl.handle.net

Patrón Cognitivo - PerceptivoPaciente

repositorio.upeu.edu.pe

Adaptación - Tolerancia al estrésLa paciente y su

Isaí Arturo Medina Fernández, Perla Noemi Polanco Tinal, Reyna Torres Obregón, Sandra Cecilia Esparza Go...

Definición: Temperatura corporal central por encima del rango diurno normal debi...

sinesss.org.pe

Seguridad/protección.Clase 6: Termorregulación.Patrón Actividad - Ejercicio

repositorio.ucam.edu

de la circulación sanguínea

repositorio.upeu.edu.pe:8080

Definición: Adulto susceptible de experimentar un evento que resulte en descansa...

sinesss.org.pe

Dominio 11: Seguridad/protección.Clase 2: Lesión física.Patrón Cognitivo - Percep...

repositorio.upeu.edu.pe:8080

Dominio 9: Afrontamiento/tolerancia al estrés.Clase 2: Respuesta de afrontamient...

repositorio.upeu.edu.pe

Definición: Respuesta emocional básica e intensa que se suscita ante la detección...

sinesss.org.pe

Definición: Susceptible a una disminución del volumen

repositorio.upeu.edu.pe

Adaptación - Tolerancia al estrés(00146). Ansiedad r/c factores estresantes m/p

es.scribd.com

respuesta emocional a una amenaza difusa en la que el individuo anticipa un peligr...

zagan.unizar.es

modelo establece

repositorio.upeu.edu.pe:8080

RC de hipertensión maligna.RC de convulsiones.RC proteinuria.RC de

hdl.handle.net

Identificación del RC principalSe ha identificado como Riesgo de Complicación Pri...

repositorio.upeu.edu.pe:8080

hipertensión maligna es la presión arterial muy alta que aparece de manera repent...

hdl.handle.net

Riesgo de alteración de la diada materno - fetal

cdn.www.gob.pe

Clase 3: Reproducción.Resultados NOC del

repositorio.upeu.edu.pe

Estado fetal: PrenatalDefinición: Grado en que los signos fetales están dentro de l...

www.scribd.com

Dominio: Salud funcional

www.scribd.com

1902). Control del riesgoDefinición: Acciones personales para comprender, evitar, ...

www.revistasanitariadeinvestigacion.com

Nivel de agitación

docplayer.es

1302) Afrontamiento de problemasDefinición: Acciones personales para controlar ...

www.scribd.com

Afrontamiento de problemasDefinición: Acciones personales para controlar los fa...

www.satse.net

Tabla 1Puntuación del NOC principal para el

repositorio.upeu.edu.pe

2412Fuente: Elaboración en base a la clasificación de resultados de enfermería N...

repositorio.upeu.edu.pe

de las intervenciones de enfermería fue de 2

repositorio.upeu.edu.pe

de los indicadores del

repositorio.upeu.edu.pe

NOC

repositorio.upeu.edu.pe

Verbaliza aceptación de la situación (130220) Busca información acreditada sobre el...
fr.scribd.com

2 4 12 Fuente: Elaboración en base a la clasificación de resultados de enfermería N...
repositorio.upeu.edu.pe

Respecto a los indicadores trazados para la medición del NOC principal para el
repositorio.upeu.edu.pe:8080

de las intervenciones de enfermería fue de 2
repositorio.upeu.edu.pe

Enseñanza: Proceso Enfermedad. Definición: Ayudar al paciente a comprender la in...
hdl.handle.net

Proporcionar información acerca de las medidas de diagnóstico disponibles, segú...
hdl.handle.net

6610) Identificación de riesgos Definición: Análisis de los factores de riesgo poten...
hdl.handle.net

Revisar los antecedentes médicos y los documentos previos para determinar la se...
ruc.udc.es

5270) Apoyo emocional Definición: Proporcionar seguridad, aceptación y ánimo en...
repositorio.ucam.edu

Abrazar o tocar al paciente para proporcionarle apoyo
qdoc.tips

Permanecer con el paciente y proporcionar sentimientos de seguridad durante los...
qdoc.tips

Resultado NOC del
hdl.handle.net

1822) Conocimiento: salud materna en la preconcepción(0401) Estado circulatori...

hdl.handle.net

NOC priorizado

hdl.handle.net

Tabla 3Puntuación del NOC principal del RC

repositorio.upeu.edu.pe

Fuente: Elaboración en base a la clasificación de resultados de enfermería NOC. A ...

repositorio.upeu.edu.pe

Fuente: Elaboración en base a la clasificación de resultados de enfermería NOC

repositorio.upeu.edu.pe

Campo 4: seguridad: cuidados que apoyan contra dañosClase U: control en caso d...

repositorio.upeu.edu.pe

6771) Monitorización fetal electrónica: antes del partoDefinición

hdl.handle.net

Campo 2: fisiológico complejo: cuidados que apoyan la regulación homeostáticaCl...

hdl.handle.net

Tabla 5Cronograma de intervenciones/Actividades de enfermería en

repositorio.upeu.edu.pe

Riesgo de alteración de la diada materno - fetal

hdl.handle.net

Definición: Susceptible a una interrupción de la relación simbiótica madre-fetal co...

www.doccity.com

Se estableció un periodo de seguimiento en el servicio de

hdl.handle.net

Indicadores Puntuación Puntuación Puntuación Inicial Diana alcanzada Tiempo

repositorio.ucam.edu

130205) Verbaliza aceptación de la situación (130220) Busca información acreditad...

fr.scribd.com

Afrontamiento de problemas Definición: Acciones personales para controlar los fa...

www.satse.net

Puntuación del NOC principal para el

repositorio.upeu.edu.pe

Fuente: Elaboración en base a la clasificación de resultados

hdl.handle.net

Evaluación del resultado del

repositorio.upeu.edu.pe

Fuente: Elaboración en base a la clasificación de resultados

hdl.handle.net

Puntuación de los indicadores del NOC principal del

repositorio.upeu.edu.pe

Fuente: Elaboración en base a la clasificación de resultados

repositorio.upeu.edu.pe

la paciente inició con una puntuación de 2

repositorio.upeu.edu.pe

alcanzar una puntuación de

repositorio.upeu.edu.pe
