

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

ESCUELA DE POSGRADO

Unidad de Posgrado de Psicología



**Depresión en mujeres que sufren violencia de pareja en
Latinoamérica: una revisión narrativa**

Trabajo Académico para obtener el Título de Segunda Especialidad Profesional
en Psicología Clínica y de la Salud

Autoras:

Roxana Huayhua Quispe

Kiana Nikkey Minchan Estrada

Asesor:

Mg. Julio Cesar Cjuno Suni

Lima, julio 2026

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD DEL TRABAJO ACADÉMICO

Yo Mg. Julio Cesar Cjuno Suni, docente de la Unidad de Posgrado de Psicología, Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Unión.

DECLARO:

Que la presente investigación titulada: "Depresión en mujeres que sufren violencia de pareja en Latinoamérica: una revisión narrativa" de Roxana Huayhua Quispe tiene un índice de similitud de 10% verificable en el informe del programa Turnitin, y fue realizada en la Universidad Peruana Unión bajo mi dirección.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponde ante cualquier falsedad u omisión de los documentos como de la información aportada, firmo la presente declaración en la ciudad de Lima, a los 01 días del mes de julio del año 2026.



Mg. Julio Cesar Cjuno Suni
Asesor

Depresión en mujeres que sufren violencia de pareja en Latinoamérica: una revisión narrativa

TRABAJO DE ACADÉMICO

Presentado para optar el Título de Segunda Especialidad

Profesional en Psicología Clínica y de la Salud



Mg. Ruth Evelyn Quiroz Soto
Dictaminadora

Lima, 01 de julio del 2026

Resumen

Objetivo: Analizar la evidencia científica disponible sobre la depresión en mujeres víctimas de violencia de pareja en América Latina, identificando los principales hallazgos y factores asociados reportados en la literatura reciente.

Método: Se ejecutó una revisión narrativa de publicaciones científicas a través de la exploración de estudios en los archivos digitales de Scopus, Web of Science y PubMed. Se consideraron publicaciones comprendidas dentro del periodo 2021 - 2025 en español, inglés y portugués. Se incluyeron estudios originales, revisiones sistemáticas y estudios con enfoque poblacional. Después del proceso de selección y aplicación de criterios de elegibilidad, se revisaron cinco estudios pertinentes para la revisión.

Resultados: Los estudios revisados mostraron una relación sustancial entre la violencia de pareja y una mayor incidencia de depresión en mujeres. La exposición a situaciones de violencia física, psicológica, sexual y económica incrementa la probabilidad de desarrollar sintomatología depresiva y puede intensificar su severidad. Asimismo, se identificó que variables ambientales o situacionales como el nivel socioeconómico, la inseguridad alimentaria y el nivel educativo influyen en esta relación. Algunos hallazgos señalan, además, que los síntomas depresivos actúan como mediadores entre la experiencia de violencia y el deterioro funcional, afectando la calidad de vida, el desempeño cotidiano y las relaciones interpersonales.

Conclusiones: La depresión en mujeres víctimas de violencia de pareja constituye un fenómeno complejo y multifactorial que demanda un abordaje integral desde ámbito investigativo, la atención clínica y las políticas públicas. Resulta necesario fortalecer la detección temprana, ampliar el acceso a servicios especializados en atención psicológica y psiquiátrica, e implementar intervenciones con perspectiva inclusiva de género y pertinencia sociocultural. Asimismo, se recomienda promover estudios a largo plazo que faciliten la comprensión de la evolución de este problema en la región.

Palabras clave: depresión, violencia de pareja, mujeres, salud mental, Latinoamérica.

Abstract

Objective: To analyze the available scientific evidence on depression among women victims of intimate partner violence in Latin America, identifying the main findings and associated factors reported in recent literature.

Method: A narrative review of scientific publications was conducted through the examination of studies indexed in the digital databases Scopus, Web of Science, and PubMed. Publications from 2021 to 2025 in Spanish, English, and Portuguese were considered. Original studies, systematic reviews, and population-based studies were included. After the selection process and the application of eligibility criteria, five relevant studies were reviewed.

Results: The reviewed studies demonstrated a significant relationship between intimate partner violence and a higher incidence of depression in women. Exposure to physical, psychological, sexual, and economic violence increases the likelihood of developing depressive symptoms and may intensify their severity. Additionally, environmental and situational variables such as socioeconomic status, food insecurity, and educational level were identified as influential factors in this relationship. Some findings also indicated that depressive symptoms act as mediators between the experience of violence and functional impairment, negatively affecting quality of life, daily functioning, and interpersonal relationships.

Conclusions: Depression among women victims of intimate partner violence constitutes a complex and multifactorial phenomenon that requires a comprehensive approach from research, clinical care, and public policy perspectives. It is necessary to strengthen early detection, expand access to specialized psychological and psychiatric care services, and implement interventions with an inclusive gender perspective and sociocultural relevance. Furthermore, long-term studies are recommended to facilitate a better understanding of the evolution of this problem in the region.

Keywords: depression, intimate partner violence, women, mental health, Latin America.

Introducción

La afectación depresiva en mujeres expuestas a la violencia de pareja representa un importante problema de salud pública en América Latina. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2020), aproximadamente una de cada tres mujeres en la región ha experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida. De igual modo, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) señala que este tipo de violencia constituye una de las principales causas de trastornos mentales en las mujeres, entre ellos la depresión, el trastorno de estrés postraumático y los intentos de suicidio.

En el Perú, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES, 2023) reporta que el 53,8 % de las mujeres de 15 a 49 años ha sido víctima de violencia psicológica, física o sexual por parte de su pareja en algún momento. De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa, 2024), se atendieron 256 563 casos de depresión, de los cuales el 75,28 % correspondió a mujeres.

Además, diversos estudios reportan que la violencia de pareja contribuye al desarrollo de la depresión en mujeres. Estudios longitudinales indican que, en mujeres expuestas a violencia de pareja, la exposición continua a esta dinámica incrementa la severidad de los síntomas depresivos (Han et al., 2019). De manera similar, un estudio grupal en México halló que el maltrato ejercido de forma física, psicológica y sexual se asocia con una mayor probabilidad de depresión, así con una mayor severidad y persistencia de los síntomas. Esto impacta negativamente en la funcionalidad y calidad de vida de las mujeres víctimas de violencia, lo cual es determinante para el mantenimiento de la depresión (Guzmán-Rodríguez et al., 2019).

En tal sentido, las diversas investigaciones cuantitativas demuestran la relación entre depresión y violencia de pareja, lo cual denota un vacío en la comprensión de la violencia en contextos latinoamericanos (Guzmán-Rodríguez et al., 2021). Sin embargo, la mayoría de estudios se ha centrado en la prevalencia, factores de riesgo y las consecuencias clínicas, dejando de lado el análisis integral de las dimensiones teóricas y contextuales de la depresión en mujeres víctimas de violencia de pareja (Costales Zavgorodniaya & Arguello Yonfa, 2023).

Por otro lado, existen investigaciones que toman en cuenta los factores psicosociales y culturales relacionados con la violencia y la depresión, lo cual limita el diseño de intervenciones psicoterapéuticas y programas de prevención que permitan establecer las características específicas de la población objetivo (Sandoval et al. 2021). Por lo expuesto, resulta pertinente revisar y sistematizar los hallazgos científicos existentes para fortalecer y ampliar la comprensión de la relación entre depresión y violencia de pareja en el contexto latinoamericano (García Villanueva et al., 2022).

La presente investigación se justifica porque permite identificar y consolidar los hallazgos existentes sobre la depresión en mujeres expuestas a vínculos disfuncionales de violencia dentro de una relación de pareja, proporcionando información relevante para profesionales de la salud, investigadores y responsables de políticas públicas. Sus resultados buscan fortalecer las estrategias de prevención, intervención y rehabilitación, así como la creación de proyectos o programas de intervención eficaces que respondan a las necesidades de la población afectada (Lara Caba et al., 2019).

De esta manera, a nivel científico, la investigación facilitará la sistematización de la evidencia disponible, para así generar un respaldo teórico consistente para futuras

investigaciones en el área de la salud mental y la violencia de pareja. A nivel clínico, los hallazgos podrán orientar a los especialistas de la salud para brindar una atención apropiada que permita una detección e intervenciones más eficaces. Finalmente, a nivel social y político, los hallazgos servirán de sustento para contribuir a la construcción de estrategias gubernamentales y programas de prevención que respondan de manera más efectiva a la magnitud de esta problemática en contextos latinoamericanos.

Por tanto, el propósito principal de esta investigación es revisar la literatura académica especializada disponible que trate sobre la depresión en mujeres que sufren violencia de pareja en Latinoamérica, identificando los hallazgos más relevantes y los aportes teóricos existentes, con el fin de profundizar la comprensión de esta problemática y generar insumos que contribuyan a la práctica clínica, la prevención en salud mental y la formulación de políticas públicas.

Metodología

El presente trabajo se desarrolla bajo la modalidad de revisión narrativa de literatura científica (Baethge et al., 2019).

Dicha revisión fue realizada a partir de la búsqueda ejecutada en Scopus, Web Of Science y PubMed, considerando el periodo de rastreo de los últimos cinco años (2021-2025). Para ello, en enero de 2026 se realizó la búsqueda empleando términos y descriptores en inglés relacionados con depresión, mujeres, violencia y Latinoamérica, conectados mediante los comandos de búsqueda booleanos como OR y AND. De igual modo, para lograr una búsqueda más precisa se emplearon delimitadores de campo: en Scopus

y Web Of Science se ajustaron en el título, resumen y palabras claves; en PubMed se utilizó términos MeSH junto con el título y resumen. Dicho proceso de búsqueda se describe en el Anexo A.

Una vez validada la estrategia de búsqueda, se dio inicio a la revisión de las bases bibliográficas seleccionadas y a la descarga de los estudios identificados. Esta labor estuvo a cargo de dos investigadores con experiencia en lectura crítica de literatura científica, quienes sistematizaron la información recopilada en una tabla cruzada elaborada en Microsoft Excel 2020. Posteriormente, cada investigador revisó de manera independiente las estructuras de los artículos encontrados con el fin de determinar su inclusión o exclusión, considerando el siguiente criterios de elegibilidad: estudios que buscaran determinar la sintomatología depresiva en población femenina víctimas de violencia.

Para esta revisión se consideraron investigaciones de carácter poblacional, censos, estudios con enfoque predictivo y diseños no experimentales. Se contemplaron, además, publicaciones científicas en forma de artículos originales, breves originales, revisiones sistemáticas y cartas al editor. Como condición adicional, se seleccionaron únicamente aquellos trabajos accesibles publicados en español, inglés o portugués, lo que aseguró un acceso pleno al contenido y facilitó un análisis crítico riguroso.

Por otro lado, se excluyeron los estudios realizados en jóvenes, adultas mayores, víctimas indirectas de violencia, enfermedades no asociadas a violencia, mujeres con depresión posparto y violencia obstétrica, así como aquellos que incluyeron a adolescentes. Asimismo, se descartaron las investigaciones publicadas como

editoriales, fe de erratas o estudios de caso. Luego de la revisión individual de los estudios descargados, en una reunión conjunta se evaluaron los artículos incluidos y excluidos, hasta lograr una decisión consensuada del 100% entre ambos investigadores.

Luego de identificar los estudios incluidos, se procedió a la revisión del texto completo de cada artículo. Esta tarea fue realizada de manera independiente por dos investigadores, quienes emplearon un formulario de recolección de datos que contemplaba las siguientes variables: autor principal, periodo de publicación, naturaleza del artículo, diseño de investigación, objetivo, alcance de los instrumentos aplicados, características de la población estudiada y hallazgos relacionados con los síntomas depresivos en mujeres que sufren violencia. Finalmente, los datos obtenidos por los investigadores fueron verificados y evaluados de forma conjunta, validándose así la tabla correspondiente a la revisión teórica.

Resultados

En la figura 1 se visualiza el esquema del flujograma de la metodología y la elección de estudios relevantes. Para la investigación se revisaron 3 bases de datos (Scopus, Web Of Science y PubMed), en las que se identificaron 359 registros. Posteriormente, se eliminaron 103 registros duplicados y se excluyeron 249 registros tras el análisis del título y el resumen de las investigaciones. Un total de 7 artículos fueron evaluados a texto completo, de los cuales se descartaron 2 por no alinearse a los parámetros de inclusión. Al concluir el procedimiento de evaluación se identificaron 5 estudios para el desarrollo de la investigación.

Figura 1.

Diagrama de flujo del proceso de selección de estudio




Tabla 1*Características de los estudios incluidos*

Nro	Autor y año	País	Tipo de investigación /temporalidad	Muestra	Instrumentos	Resultados
1	Hernández & Ortega (2025)	Perú	Cuasi experimental/longitudinal	N=6615 mujeres (15-49 años)	Demographic and Health Survey (DHS - Perú 2013-2018) Conflict Tactics Scales-2 (CTS-2) Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9)	Los resultados indican que a medida que aumenta la intensidad de la violencia de pareja (Clases 1 a 5), la depresión severa tiende a incrementarse, aunque no de forma estrictamente lineal. Entre las mujeres que no experimentaron violencia, el 59,5 % no presentó depresión y el 28,1 % mostró niveles mínimos. En las sobrevivientes, predominan niveles mínimos de depresión (26,2 %-36,0 %); sin embargo, en las clases más severas, la mayoría presentó depresión leve (35,3 % y 36,3 %).
2	Hernández (2021)	Perú	Explicativo / Transversal	N = 84,136 mujeres de 15 a 49 años /Base de datos secundaria (Encuesta Demográfica y de Salud -	Conflict Tactics Scale (CTS) - versión abreviada incluida en la DHS (para medir violencia psicológica, física y sexual). Patient Health Questionnaire-9	Según este estudio no indica que la violencia con riesgo de muerte hacia la mujer incrementó significativamente el cuadro depresivo reciente (16-22 puntos porcentuales) y, en menor consistencia, la depresión en el último año. Asimismo, se evidenció una elevación en el consumo de sustancias en mujeres víctimas de VFR. Los efectos fueron heterogéneos: variaron según historia previa de

				DHS 2010-2015	(PHQ-9) - para evaluar síntomas de depresión. Demographic and Health Survey (DHS) - Perú 2010-2015 - base de datos nacional que contiene los módulos de violencia, salud y variables sociodemográficas.	violencia sexual y nivel socioeconómico. En mujeres de bajo nivel socioeconómico se observaron mayores efectos en consumo de sustancias y depresión. El estudio concluye que la VFR genera consecuencias severas en el bienestar mental de las féminas con posibles efectos intergeneracionales.
3	Sandoval et al.(2021)	Colombia	Predictivo/Transversal	94 mujeres ≥18 años sobrevivientes de violencia de pareja íntima (IPV), reclutadas en dos hospitales públicos	Severity of Violence Against Women Scale (SVAWS) - versión ponderada Escala de síntomas depresivos (utilizada para evaluar depresión como variable mediadora) WHODAS / medición de discapacidad basada en ICF de la OMS (para nivel de discapacidad)	Esta investigación señala que el efecto directo de la gravedad de la violencia sobre la discapacidad no fue significativo ($\beta = 0.09$; $p = 0.63$). No obstante, el indirecto es canalizado por las manifestaciones depresivas fue relevante ($\beta = 0.39$; $p < 0.01$). El resultado del efecto total mostró mayor incremento y magnitud ($\beta = 0.48$; $p = 0.01$). Este estudio concluye que las manifestaciones depresivas ejercen una función mediadora entre la violencia de pareja íntima y el nivel de discapacidad en mujeres sobrevivientes.

4	Medina-Quispe et al. (2023).	Perú	Predictivo, transversal	267 mujeres gestantes del 3er trimestre	Escala de Edimburgo Index of Spouse Abuse-19 (ISA-19), versión en español	Este estudio señala que la prevalencia de depresión fue 62,17% y de violencia conyugal 17,6%. Las agresiones sufridas en el periodo de gestación aumentaron en 21% la prevalencia del estado depresivo (RPa: 1.21; IC95%: 1.04-1.41). El embarazo planificado y el antecedente de pérdida gestacional se asociaron con menor prevalencia de depresión.
5	Da Silva et al. (2024).	Brasil	Predictivo/Transversal	660 mujeres ≥18 años (cisgénero), residentes en Brasil.	CoRonaviruS Health Impact Survey (CRISIS) WHO Violence Against Women (WHO-VAW) Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9)	La evidencia encontrada señala que la prevalencia de violencia conyugal (IPV) fue 33.3%, depresión 36.1% e ideación suicida 19.8%. La IPV se asoció significativamente con mayor frecuencia de depresión (PR ajustado = 1.50 para un tipo de violencia; PR = 2.70 para dos o tres tipos) y con ideación suicida (PR = 2.26 para un tipo; PR = 3.27 para dos o tres tipos). Factores como inseguridad alimentaria, raza negra y menor nivel educativo incrementa el riesgo.

Los estudios analizados evidencian una relación estadísticamente notoria entre la manifestación depresiva en mujeres y la violencia de pareja. A continuación, se presentan los principales resultados reportados en las investigaciones revisadas.

Los estudios incluidos en esta revisión narrativa se realizaron principalmente en Perú, con tres investigaciones (Hernández, 2021; Hernández & Ortega, 2025; Medina-Quispe et al., 2023), seguidas de Colombia y Brasil, con un estudio cada uno, realizados por Sandoval et al. (2021) y Da Silva et al. (2024), respectivamente. Esto evidencia que la mayor parte de los estudios proviene del contexto peruano, aunque también se incorporan estudios de distintos países de América, aspecto que permitiría ampliar la comprensión del fenómeno en la región.

Además, en el análisis metodológico de los estudios incluidos evidencia el predominio de diseños de tipo transversal, empleados en cuatro investigaciones con enfoques predictivos o explicativos (Hernández, 2021; Medina-Quispe et al., 2023; Sandoval et al., 2021; Da Silva et al., 2024). Asimismo, se identificó un estudio cuasi experimental de tipo longitudinal (Hernández & Ortega, 2025).

Respecto a las evaluaciones aplicadas, se emplearon principalmente cuestionarios validados para medir depresión y violencia de pareja. Para medir la depresión, se empleó el *Patient Health Questionnaire-9* (PHQ-9) en tres estudios (Hernández, 2021; Hernández & Ortega, 2025; Da Silva et al., 2024). Además, un estudio utilizó la Escala de Depresión Posnatal de Edimburgo en gestantes (Medina-Quispe et al., 2023) y otro utilizó la Escala de síntomas depresivos (Sandoval et al., 2021). Para evaluar la violencia, cada estudio utilizó distintos instrumentos de medición, entre ellos la *Conflict Tactics Scale* (CTS) versión abreviada (Hernández, 2021) y su versión CTS-2 (Hernández & Ortega, 2025), el *Index of Spouse Abuse-19* (ISA-19) (Medina-Quispe et al., 2023), la *Severity of Violence Against Women Scale* (SVAWS) (Sandoval et al., 2021) y el cuestionario de *Violence Against Women* de la OMS (WHO-VAW) (Da Silva et al., 2024). Asimismo, uno de los estudios incorporó un instrumento adicional, el WHODAS, con el propósito de evaluar el nivel de

discapacidad (Sandoval et al., 2021). Además, dos investigaciones utilizaron bases de datos secundarias provenientes de encuestas poblacionales, como la Demographic and Health Survey (DHS) (Hernández, 2021; Hernández & Ortega, 2025). Por otro lado, Da Silva et al. (2024) emplearon un cuestionario estandarizado denominado Coronavirus Health Impact Survey (CRISIS) para evaluar el impacto psicológico y contexto social intensificado durante la pandemia. En conjunto, estos instrumentos permitieron evaluar de manera estandarizada la asociación de las variables estudiadas.

Los trabajos científicos revisados muestran una vinculación significativa entre la violencia de pareja y la depresión en mujeres. Hernández y Ortega (2025) encontraron que, entre las sobrevivientes de violencia, se observaron niveles mínimos de depresión entre el 26,2 % y el 36,0 %; mientras que en los niveles más severos de violencia predominó la depresión leve, con porcentajes entre el 35,3 % y el 36,3 % evidenciándose además una mayor probabilidad de depresión reciente en quienes experimentaron violencia. Asimismo, Hernández (2021) reportó que la violencia con riesgo de feminicidio incrementó los síntomas de depresión reciente entre 16 % y 22 %. Por su parte, Medina-Quispe et al. (2023) identificaron una prevalencia de depresión de 62,17 % en gestantes y demostraron que la violencia marital aumenta en 21 % la prevalencia de depresión.

Finalmente, Da Silva et al. (2024) encontraron una prevalencia de 33,3 % de dinámicas de violencia en una relación afectiva y 36,1 % de depresión, observándose que las mujeres expuestas a uno o más tipos de violencia presentan mayor probabilidad de depresión e ideación suicida. De esta manera, estos hallazgos confirman que las conductas violentas en una relación de pareja se asocian con un incremento importante en los niveles de depresión en la población investigada.

Discusión

Los trastornos del estado de ánimo afectan con más frecuencia a la población femenina. A lo largo de los años, ha representado un importante problema de salud mental y de salud pública, debido a que genera un significativo malestar psicológico, social y funcional en las mujeres (Organización Mundial de la Salud, 2023). En América Latina, diversos estudios evidencian que la sintomatología depresiva en mujeres responde a factores psicosociales multicausales que afectan su bienestar integral (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2022). Entre estos, destaca la violencia en sus múltiples formas, presente a lo largo del ciclo vital, especialmente en el marco de una relación sentimental de pareja. La exposición continua al maltrato dentro de la dinámica de pareja ha sido identificada como un factor de riesgo relevante y un mediador negativo en el desarrollo de trastornos psicológicos, particularmente la depresión (Organización Mundial de la Salud, 2021).

Pese al creciente interés por esta problemática, persiste un vacío en el conocimiento respecto a la comprensión integral de la relación entre la depresión y la violencia de pareja en mujeres, especialmente en contextos socioculturales específicos de América Latina (Villagrán et al., 2024). Si bien diversos estudios han abordado ambas variables de manera independiente, todavía existen limitaciones en estudios que analizan su interrelación. Por tanto, el objetivo de este trabajo investigativo fue revisar la literatura científica disponible sobre la depresión en mujeres que sufren violencia de pareja en Latinoamérica, identificando los hallazgos más relevantes y los aportes teóricos existentes.

Los hallazgos de esta revisión de la literatura ponen de manifiesto que la depresión y la violencia de pareja se encuentran estrechamente relacionadas, evidenciando que experimentar violencia no solo incrementa la sintomatología depresiva, sino que intensifica su magnitud. Esta evidencia reportada coincide con Devries et al. (2013), quienes confirmaron una relación

significativa entre el comportamiento agresivo dentro de la relación de pareja y los estados depresivos en la población femenina. De igual manera, Ludermit et al. (2010) identificaron que la constante exposición a la violencia dentro de la relación de pareja se asocia con una mayor probabilidad de presentar trastornos mentales comunes, como la depresión. En conjunto, estos estudios respaldan la evidencia de que la violencia dentro de los vínculos de pareja constituye un factor riesgo relevante que impactan el bienestar mental de las mujeres.

Una explicación razonable de la asociación entre la violencia ejercida por la pareja y la depresión en mujeres se sustenta en diversos enfoques teóricos que evidencian el impacto del estrés crónico y la vulnerabilidad psicológica. Desde el modelo de estrés y afrontamiento, la exposición recurrente a situaciones de violencia genera una fragilidad emocional que al mantenerse en el tiempo debilita los recursos de afrontamiento de la persona, permitiendo el desarrollo de la depresión (Lazarus & Folkman, 1984; Cavanaugh et al., 2018). Por otro lado, el enfoque cognitivo, Beck (1967) señala que las experiencias adversas, como la violencia de pareja, contribuyen a la construcción de esquemas cognitivos negativos sobre uno mismo, el entorno y el futuro, los cuales se encuentran vinculados al desarrollo de la sintomatología depresiva.

Los estudios analizados explican que la interacción entre la violencia en una relación sentimental y la depresión en el género femenino no es homogénea, la cual se encuentra condicionada por diversos factores personales, ambientales, sociales y culturales. En esta misma línea, investigaciones como las de Hernández (2021) y Da Silva et al. (2024) muestran que variables como el nivel socioeconómico, la inseguridad alimentaria y el nivel educativo incrementan el riesgo a presentar sintomatología depresiva en situaciones de violencia. Esta variabilidad puede explicarse desde el modelo ecológico, el cual plantea que la conducta humana y sus consecuencias se encuentran determinadas por la interacción de múltiples niveles de influencia, incluyendo factores individuales, relacionales y socioculturales (Bronfenbrenner, 1979; Sunsern & Lawang, 2019). Asimismo, desde el enfoque de los determinantes sociales de la salud, se

reconoce que condiciones como la pobreza y el limitado acceso a recursos incrementan el riesgo de problemas de salud mental en contextos de violencia (Marmot, 2005).

Aunque la presente revisión narrativa ofrece una visión amplia sobre la relación entre la depresión y la violencia de pareja en mujeres de Latinoamérica, presenta algunas limitaciones relevantes a tomar en cuenta. Inicialmente, la gran parte de los artículos analizados corresponden al tipo transversal, situación que restringe la posibilidad de explicar relaciones de causa y efecto entre ambas variables. En segundo lugar, las investigaciones incluidas muestran diversidad con respecto al diseño metodológico utilizado, el tamaño muestral y los instrumentos utilizados, lo que interfiere en la comparación directa de los resultados. Finalmente, al tratarse de una revisión narrativa, existe la posibilidad de sesgo en el cribado de estudios, debido a que no se sigue un procedimiento sistemático y estandarizado para su búsqueda e inclusión.

Se recomienda que futuras investigaciones adopten diseños longitudinales que permitan comprender con mayor precisión la relación causal entre estado mental depresivo y el abuso en la relación de pareja. Asimismo, se sugiere incorporar variables contextuales, culturales y socioeconómicas que favorezcan un análisis más completo de los fenómenos estudiados. De la misma manera, se enfatiza la importancia de ampliar los estudios a contextos internacionales, incluyendo regiones asiáticas y europeas, con el fin de realizar estudios comparativos que fortalezcan la comprensión del fenómeno en distintos escenarios. Para concluir, se sugiere implementar estrategias de prevención y fortalecimiento de políticas públicas desde un enfoque multidimensional, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad.

Conclusiones

Esta revisión narrativa pone de manifiesto que la depresión en mujeres se vincula significativamente con la violencia de pareja, manifestándose tanto en su aparición como en el

incremento de su severidad, y estableciéndose como un problema de la salud mental. Los estudios revisados y analizados, en su mayoría, de diseño transversal, y muestran que las mujeres expuestas a diversas formas de vínculo violento en una relación sentimental presentan un mayor riesgo en desarrollar manifestaciones clínicas depresivas; sin embargo, algunos de estos estudios presentan limitaciones para establecer relaciones causales. En conjunto, los resultados demuestran que esta relación es compleja y multifactorial, influida por factores contextuales, sociales y personales, lo que resalta la importancia de abordajes integrales tanto en la investigación como en la intervención.

Referencias

- Baethge, C., Goldbeck-Wood, S., & Mertens, S. (2019). SANRA—a scale for the quality assessment of narrative review articles. *Research Integrity and Peer Review*, 4, 5. <https://doi.org/10.1186/s41073-019-0064-8>
- Beck, A. T., & Haigh, E. A. P. (2014). Advances in cognitive theory and therapy: The generic cognitive model. *Annual Review of Clinical Psychology*, 10, 1-24. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-032813-153734>
- Cavanaugh, C. E., Messing, J. T., Petras, H., Fowler, B., La Flair, L., Kub, J., & Campbell, J. (2018). Intimate partner violence among low-income fathers: Testing a stress-coping model. *Journal of Interpersonal Violence*, 33(12), 1865-1888. <https://doi.org/10.1177/0886260515622300>
- Cerveira de Baumont, A., Sá Oliveira, G., Bastos de Figueiredo, J., Foschiera dos Santos, J., Pasqualini Genro, B., Habigzang, L. F., & Manfro, G. G. (2021). Intimate partner violence and women's mental health during the COVID-19 pandemic in Brazil. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 43(5), 507-510. <https://doi.org/10.1590/1516-4446-2020-1472>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2022). *La sociedad del cuidado: Horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género*. CEPAL. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/48381-la-sociedad-del-cuidado-horizonte-recuperacion-sostenible-igualdad-genero>
- Costales, A. I., y Argüello, E. D. (2023). Somatización, ansiedad y depresión en mujeres víctimas de violencia de pareja íntima. *Interdisciplinaria*, 40(1), 173-189. <https://doi.org/10.16888/interd.2023.40.1.11>

García, J., Hernández, C. I., y López, D. D. (2022). Narrativas sobre violencia hacia las mujeres desde una perspectiva de género. *Contribuciones desde Coatepec*, 37, 1-25.

<https://doi.org/10.36677/cdc.v0i37.16627>

Guzmán-Rodríguez, C., Cupul-Uicab, L. A., Guimarães, G. L., Salazar-Martínez, E., Salmerón, J., & Reynales-Shigematsu, L. M. (2021). Violencia de pareja y depresión en mujeres que trabajan en una institución de salud de México. *Gaceta Sanitaria*, 35(2), 161-167.

<https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2019.09.005>

Guzmán-Rodríguez, C., Cupul-Uicab, L. A., Guimarães, G. L., Salazar-Martínez, E., Salmerón, J., & Reynales-Shigematsu, L. M. (2019). Violencia de pareja y depresión en mujeres que trabajan en una institución de salud de México. *Gaceta Sanitaria*, 35(2), 161-167.

<https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2019.09.005>

Han, K. M., Jee, H. J., An, H., Shin, C., Yoon, H. K., Ko, Y. H., Ham, B. J., Kim, Y. K., & Han, C. (2019). *Intimate partner violence and incidence of depression in married women: A longitudinal study of a nationally representative sample*. *Journal of Affective Disorders*, 245, 305-311. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.11.041>

Hernández, W. (2018). Violence with femicide risk: Its effects on women and their children.

Journal of Interpersonal Violence, 35(23-24), 5855-5882.

<https://doi.org/10.1177/0886260518815133>

Hernández, W., & Ortega, J. (2024). Beyond the surface: Intimate partner violence typology and recent depression. *Violence Against Women*.

<https://doi.org/10.1177/10778012241248452>

- Lara, E. Z., Suriel, A. C., Rosario, M. P., & Medrano, L. A. (2019). Depresión y ansiedad en mujeres víctimas de violencia en la relación de pareja. *Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento*, 11(1), 1-8. <https://doi.org/10.32348/1852.4206.v11.n1.22582>
- Ludermir, A. B., Schraiber, L. B., D'Oliveira, A. F. P. L., França-Junior, I., & Jansen, H. A. (2010). Violence against women by their intimate partner and common mental disorders. *Social Science & Medicine*, 71(4), 683-690. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2010.05.025>
- Marmot, M. (2005). Social determinants of health inequalities. *The Lancet*, 365(9464), 1099-1104. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(05\)71146-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)71146-6)
- Medina-Quispe, C. I., Quispe, Y. N., Linares, A., & Huaccho-Rojas, J. (2022). Depresión y violencia conyugal en gestantes peruanas durante la pandemia por la COVID-19. *Revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo*, 15(4). <https://www.imbiomed.com.mx/articulo.php?id=120065>
- Organización Mundial de la Salud. (2021). *Violencia contra la mujer*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>
- Organización Mundial de la Salud. (2023). *Depression (depressive disorder)*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression>
- Organización Panamericana de la Salud. (2020). *La depresión en mujeres víctimas de violencia de pareja constituye un problema relevante de salud pública en América Latina*. <https://www.paho.org>
- Sandoval, L. M., Castro, E. S., Fandiño-Losada, A., Pacichana-Quinayaz, S. G., Lennon, S. E., & Gutiérrez-Martínez, M. I. (2024). Violence exposure and disability in Colombian female survivors of intimate partner violence: The mediating role of depressive symptoms.

<https://doi.org/10.1016/j.rcp.2021.11.009>

Sunsern, R., & Lawang, W. (2019). Bronfenbrenner's ecological model: Theoretical lens for a community-based research. *Journal of Health Science and Alternative Medicine*, 1(1), 4-7. <https://doi.org/10.14456/jhsam.2019.3>

Villagrán, A. M., Santirso, F. A., Lila, M., & Gracia, E. (2024). Attitudes toward intimate partner violence against women in Latin America: A systematic review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 25(3), 2065-2077. <https://doi.org/10.1177/15248380231205825>

Anexo A

Tabla de descriptores

Tabla 1. *Lista de descriptores por cada componente de la pregunta de investigación*

Mujeres	Depresión	Violencia	Latinoamérica
Mujeres	depresión	violencia	Latinoamérica
féminas	"trastorno distimico"	maltrato	Sudamérica
Hembras	"trastorno depresivo"	abuso	"América latina"
Gestante	distimia	"violencia doméstica"	"Países latinoamericanos"
Novia	"depresión mayor"	"exposición a la violencia"	"América del Sur"
Esposas	"Trastorno del estado de ánimo"	"violencia contra la mujer"	"Centro américa"
Madres		"violencia de pareja"	"Paises andinos"
enamorada		"Violencia de género"	"Hispanoamerica"
			"comunidades andinas"
			Argentina
			Argentino
			argentina
			Bolivia
			Boliviano
			Boliviana
			Brasil
			brasileño
			brasileña
			Chile
			chileno
			chilena
			Colombia
			colombiano
			colombiano
			Costa Rica
			costarricense
			tico
			tica
			Cuba
			cubano
			cubana
			República Dominicana
			dominicano

Women
Females
Pregnant
women

depression
"dysthymic
disorder"
"depressive
disorder"

violence
abuse
"domestic violence"

"Latin America"
"South America"
"Latin American
countries"

dominicana
Ecuador
ecuatoriano
ecuatoriana
El Salvador
Salvadoreño
salvadoreña
Guatemala
Guatemalteco
Guatemalteca
Honduras
Hondureño
Hondureña
México
Mexicano
mexicana
Nicaragua
Nicaragüense
nica
Panamá
Panameño
Panameña
Paraguay
Paraguayo
paraguaya
Perú
Peruano
peruana
Puerto Rico
Puertorriqueño
Puertorriqueño
boricua
Uruguay
Uruguayo
Uruguaya
Venezuela
venezolana
Haití
Haitiano
Haitiana

bride	dysthymia	"exposure to violence"	"Central America"
wife	"major depression"	"violence against women"	"Andean countries"
Mothers	"Mood disorder"	"intimate partner violence"	"Hispanoamerica"
girlfriend		"gender violence"	"Andean communities"
			Argentina
			Argentinean
			Bolivia
			Bolivian
			Brazil
			brazilian
			Chile
			Chilean
			Colombia
			Colombian
			Costa Rica
			Cuba
			Cuban
			Dominican Republic
			dominican
			Ecuador
			ecuadorian
			El Salvador
			Salvadoran
			Guatemala
			Guatemalan
			Honduras
			Honduran
			Mexico
			mexican
			Nicaragua
			Nicaraguan
			nica
			Panama
			Panamanian
			Paraguay
			paraguayan
			Peru
			peruvian
			Puerto Rico
			Puerto Rican
			boricua

Uruguay
Uruguayan
Venezuela
Venezuelan
Haiti
Haitian

Anexo B

Estrategias de búsqueda de las tres bases de datos

BASE DE DATOS	ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA	Nº DE ARTICULOS
WED OF SCIENCE	(TI=(women OR females OR "pregnant women" OR bride OR wife OR mothers OR girlfriend) OR AB=(women OR females OR "pregnant women" OR bride OR wife OR mothers OR girlfriend) OR AK=(women OR females OR "pregnant women" OR bride OR wife OR mothers OR girlfriend)) (TI=(depression OR "dysthymic disorder" OR "depressive disorder" OR dysthymia OR "major depression") OR AB=(depression OR "dysthymic disorder" OR "depressive disorder" OR dysthymia OR "major depression" OR "mood disorder") OR AK =(depression OR "dysthymic disorder" OR "depressive disorder" OR dysthymia OR "major depression")) (TI=(violence OR abuse OR "domestic violence" OR "exposure to violence" OR "violence against women" OR "intimate partner violence" OR "gender violence") OR AB=(violence OR abuse OR "domestic violence" OR "exposure to violence" OR "violence against women" OR "intimate partner violence" OR "gender violence") OR AK=(violence OR abuse OR "domestic violence" OR "exposure to violence" OR "violence against women" OR "intimate partner violence" OR "gender violence")) (TI=("Latin America" OR "South America" OR "Latin American countries" OR "Central America" OR "Andean countries" OR "Hispanoamerica" OR "Andean communities" OR Argentina OR Argentinean OR Bolivia OR Bolivian OR Brazil OR brazilian OR Chile OR Chilean OR Colombia OR Colombian OR "Costa	Resultado: 117 artículos

	Rica" OR Cuba OR Cuban OR "Dominican Republic" OR dominican OR Ecuador OR ecuadorian OR El Salvador OR Salvadoran OR Guatemala OR Guatemalan OR Honduras OR Honduran OR Mexico OR mexican OR Nicaragua OR Nicaraguan OR nica OR Panama OR Panamanian OR Paraguay OR paraguayan OR Peru OR peruvian OR "Puerto Rico" OR "Puerto Rican" OR boricua OR Uruguay OR Uruguayan OR Venezuela OR Venezuelan OR Haiti OR Haitian) OR AB=("Latin America" OR "South America" OR "Latin American countries" OR "Central America" OR "Andean countries" OR "Hispanoamerica" OR "Andean communities" OR Argentina OR Argentinean OR Bolivia OR Bolivian OR Brazil OR brazilian OR Chile OR Chilean OR Colombia OR Colombian OR "Costa Rica" OR Cuba OR Cuban OR "Dominican Republic" OR dominican OR Ecuador OR ecuadorian OR El Salvador OR Salvadoran OR Guatemala OR Guatemalan OR Honduras OR Honduran OR Mexico OR mexican OR Nicaragua OR Nicaraguan OR nica OR Panama OR Panamanian OR Paraguay OR paraguayan OR Peru OR peruvian OR "Puerto Rico" OR "Puerto Rican" OR boricua OR Uruguay OR Uruguayan OR Venezuela OR Venezuelan OR Haiti OR Haitian) OR AK=("Latin America" OR "South America" OR "Latin American countries" OR "Central America" OR "Andean countries" OR "Hispanoamerica" OR "Andean communities" OR Argentina OR Argentinean OR Bolivia OR Bolivian OR Brazil OR brazilian OR Chile OR Chilean OR Colombia OR Colombian OR "Costa Rica" OR Cuba OR Cuban OR "Dominican Republic" OR dominican OR Ecuador OR ecuadorian OR El Salvador OR Salvadoran OR Guatemala OR Guatemalan OR Honduras OR Honduran OR Mexico OR mexican OR Nicaragua OR Nicaraguan OR nica OR Panama OR Panamanian OR Paraguay OR paraguayan OR Peru OR peruvian OR "Puerto Rico" OR "Puerto Rican" OR boricua OR Uruguay OR Uruguayan OR Venezuela OR Venezuelan OR Haiti OR Haitian))	
SCOPUS	TITLE-ABS-KEY(depression OR "dysthymic disorder" OR "depressive disorder" OR dysthymia OR "major depression" OR "Mood disorder") AND TITLE-ABS-KEY(women OR females OR "pregnant women" OR bride OR wife OR mothers OR girlfriend) AND TITLE-ABS-KEY(violence OR abuse OR "domestic violence" OR "exposure to violence" OR "violence against women" OR "intimate partner violence" OR "gender violence") TITLE-ABS-KEY("Latin America" OR "South America" OR "Latin American countries" OR "Central	Resultado: 35 artículos

	America" OR "Andean countries" OR "Hispanoamerica" OR "Andean communities" OR Argentina OR Argentinean OR Bolivia OR Bolivian OR Brazil OR brazilian OR Chile OR Chilean OR Colombia OR Colombian OR "Costa Rica" OR Cuba OR Cuban OR "Dominican Republic" OR dominican OR Ecuador OR ecuadorian OR El Salvador OR Salvadoran OR Guatemala OR Guatemalan OR Honduras OR Honduran OR Mexico OR mexican OR Nicaragua OR Nicaraguan OR nica OR Panama OR Panamanian OR Paraguay OR paraguayan OR Peru OR peruvian OR "Puerto Rico" OR "Puerto Rican" OR boricua OR Uruguay OR Uruguayan OR Venezuela OR Venezuelan OR Haiti OR Haitian)	
PUB MED	("Women"[Mesh] OR women[tiab] OR "Female"[Mesh] OR female[tiab] OR females[tiab] OR "Pregnant Women"[Mesh] OR "pregnant women"[tiab] OR "Mothers"[Mesh] OR mothers[tiab] OR wife[tiab] OR wives[tiab] OR bride[tiab] OR girlfriend[tiab])AND("Depression"[Mesh] OR depression[tiab] OR "Depressive Disorder"[Mesh] OR "depressive disorder"[tiab] OR "Dysthymic Disorder"[Mesh] OR "dysthymic disorder"[tiab] OR dysthymia[tiab] OR "Major Depressive Disorder"[Mesh] OR "major depression"[tiab] OR "Mood Disorders"[Mesh] OR "mood disorder"[tiab])AND("Violence"[Mesh] OR violence[tiab] OR "Domestic Violence"[Mesh] OR "domestic violence"[tiab] OR "Intimate Partner Violence"[Mesh] OR "intimate partner violence"[tiab] OR "Gender-Based Violence"[Mesh] OR "gender violence"[tiab] OR "Violence Against Women"[Mesh] OR "violence against women"[tiab] OR "Abuse"[Mesh] OR abuse[tiab] OR "Exposure to Violence"[Mesh] OR "exposure to violence"[tiab])AND("Latin America"[Mesh] OR "Latin America"[tiab] OR "South America"[Mesh] OR "South America"[tiab] OR "Central America"[Mesh] OR "Central America"[tiab] OR "Latin American Countries"[tiab] OR "Andean countries"[tiab] OR Hispanoamerica[tiab] OR "Andean communities"[tiab] OR Argentina[Mesh] OR Argentina[tiab] OR Argentinean[tiab] OR Bolivia[Mesh] OR Bolivia[tiab] OR Bolivian[tiab] OR Brazil[Mesh] OR Brazil[tiab] OR Brazilian[tiab] OR Chile[Mesh] OR Chile[tiab] OR Chilean[tiab] OR Colombia[Mesh] OR Colombia[tiab] OR Colombian[tiab] OR "Costa Rica"[Mesh] OR "Costa Rica"[tiab] OR Costa Rican[tiab] OR Cuba[Mesh] OR Cuba[tiab] OR Cuban[tiab] OR "Dominican Republic"[Mesh] OR "Dominican Republic"[tiab] OR Dominican[tiab] OR	Resultado: 207 artículos

	Ecuador[Mesh] OR Ecuador[tiab] OR Ecuadorian[tiab] OR "El Salvador"[Mesh] OR "El Salvador"[tiab] OR Salvadoran[tiab] OR Guatemala[Mesh] OR Guatemala[tiab] OR Guatemalan[tiab] OR Honduras[Mesh] OR Honduras[tiab] OR Honduran[tiab] OR Mexico[Mesh] OR Mexico[tiab] OR Mexican[tiab] OR Nicaragua[Mesh] OR Nicaragua[tiab] OR Nicaraguan[tiab] OR Nica[tiab] OR Panama[Mesh] OR Panama[tiab] OR Panamanian[tiab] OR Paraguay[Mesh] OR Paraguay[tiab] OR Paraguayan[tiab] OR Peru[Mesh] OR Peru[tiab] OR Peruvian[tiab] OR "Puerto Rico"[Mesh] OR "Puerto Rico"[tiab] OR "Puerto Rican"[tiab] OR Boricua[tiab] OR Uruguay[Mesh] OR Uruguay[tiab] OR Uruguayan[tiab] OR Venezuela[Mesh] OR Venezuela[tiab] OR Venezuelan[tiab] OR Haiti[Mesh] OR Haiti[tiab] OR Haitian[tiab])	
		Resultado: 395 artículos

CAPTURA DE WEB OF SCIENCE

Search > Refine results for #1 AND #2 AND #3 AND #4 and 2021 or 2022 or 2023 or 2024 or 2025...

117 results from Web of Science Core Collection for:

#1 AND #2 AND #3 AND #4

Copy query link

+ Add Keywords Quick add keywords: + obstetric violence + transgender persons + violence against women + transgender women + gender-base

Refined By: Publication Years: 2021 or 2022 or 2023 or 2024 or 2025 X Document Types: Article X Publication Years: 2025 or 2024 or 2023 or 2022 or 2021 X Document Types: Article X

Document Types: Article X Publication Years: 2025 or 2023 or 2024 or 2022 or 2021 X Open Access X Clear all

117 Documents You may also like... Analyze Results Citation Report Create Alert

Refine results Export Refine

Search within results...

Quick Filters

- ☐ Early Access 2
- ☐ Open Access 117
- ☐ Enriched Cited References 65
- ☐ Open publisher invited reviews 1

Publication Years

- ☐ Show Final Publication Year
- ☐ 2025 20
- ☐ 2024 29
- ☐ 2023 20
- ☐ 2022 16
- ☐ 2021 32

0/117 Add To Marked List Export

Sort by Relevance < 1 of 3 >

1 Factors associated with women suffering domestic violence during the last semester of the pandemic in Honduras-Central America 48 References

Expinoza Turcios, E; Zambrano, L; ...; Mejia, C R
Dec 31 2025 | CRITICAL PUBLIC HEALTH 35(1)

Mental health deterioration has been previously linked to domestic violence against women, and we wanted to study the factors associated with domestic violence against women during the latter half of the pandemic in Honduras. An Analytical and retrospective cross sectional study, in which the primary variable was derived from the question, "I ... Show more

Free Full Text from Publisher

Related records

2 Predictive Factors of Mental Health in Survivors of Intimate Partner Violence in Chile 3 Citations 43 References

Labra Valerdi, P; Chacón Moscoso, S and Sanduette Chaves, S
Nov 2022 | JOURNAL OF INTERPERSONAL VIOLENCE 37(21-22), pp.NP19447-NP19467

Studies about violence against women specific to the Chilean population are scarce. As a result, government treatment programs lack a local perspective. Predictor variables were analyzed in the mental health of Chilean women who have survived intimate partner abuse. Two hundred and two women who made regular visits to public Women's Centers p... Show more

CAPTURA DE SCOPUS

WhatsApp | Advanced Search Results - Pub... | Scopus - Document search res... | Descriptores de depresión

scopus.com/results/results.uri?sort=plf-fbsrc=s&sid=a229951d3b3e923fd1fd378bd4e3e6368&ot=a&sdt=c&l=10978&=TITLE-ABS-KEY%28depression+OR+"dysthymic+disorder"+OR+"depressive...

Documents Preprints Secondary documents

35 documents found

Refine search

Search within results

Filters Clear all

Year

Range Individual

Author name

Subject area Clear (1)

Limited to Psychology 35

Medicine 27

Social Sciences 6

Arts and Humanities 1

Document title Authors Source Year Citations

1 Book Chapter
Perinatal Mental Health in Women Living in Mexico During Periods of Crises: Experiences of an Earthquake and the COVID-19 Pandemic
Palacios-Hernández, B., Vello, M.F.B., Rodríguez, M.S.M., ... Martínez, I.A.P., González-Rodríguez, A.
An Integrated Approach to Perinatal Depression and Anxiety in Spanish Speaking and Latina Women, pp. 65–87
2025 0

Show abstract View at Publisher Related documents

2 Article
Global burden of major depressive disorders attributable to intimate partner violence against women: Magnitude, temporal trends, and regional inequalities
Hu, C., Ding, L., Peng, K.
Journal of Affective Disorders, 363, pp. 182–191
2024 12

Show abstract View at Publisher Related documents

3 Article - Open access
Efficacy of online behavioral activation and cognitive-behavioral therapies for the treatment of depression in Mexican women victims of violence | Eficacia de las terapias online de activación conductual y cognitiva conductual para el tratamiento de la depresión en mujeres mexicanas víctimas de violencia
Ramírez-Cruz, J.C., Bianchi, I.M., Santana-Cárdenas, S., Javier-Juárez, S.P., Franco-Paredes, K.
Terapia Psicológica, 41(1), pp. 87–109
2023 4

Show abstract View at Publisher Related documents

Feedback

Búsqueda

21/02 22/09/2025

CAPTURAS DE PUB MED

RIO COMP... | DIRECTORIO CSMC... | Zimbra: Bandeja de... | WhatsApp | LIT nuevo | Curso de Ingles Grá... | AGENDA 2026 - CIT... | Lamb Learning UPeU | Portal del Alumno | ... | Todos los f

An official website of the United States government. Here's how you know

NIH National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information

Log in

PubMed

("Women"[Mesh] OR women[tiab] OR "Female"[Mesh] OR female[tiab] OR fe

Advanced Create alert Create RSS User Guide

Save Email Send to Sort by: Best match Display options

MY CUSTOM FILTERS
Edit custom filters

RESULTS BY YEAR

2021- 2025

PUBLICATION DATE

1 year
5 years

207 results

Quoted phrases not found in phrase index: "Pregnant Women", "Violence Against Women", "Abuse"

1 Epidemiology of obstetric violence: a narrative review of the Brazilian context.
Leite TH, Marques ES, Corrêa RG, Leal MDC, Olegário BDCD, Costa RMD, Mesenburg MA.
Cien Saude Colet. 2024 Sep;29(9):e12222023. doi: 10.1590/1413-81232024299.12222023. Epub 2023 Sep 13.
PMID: 39194114 Free article. Review. English, Portuguese.
The aim of this review is to present the state of the art regarding obstetric violence in Brazil. The most commonly used terms are "obstetric violence," "disrespect and abuse," and "mistreatment".
...Interventions to mitigate obstetric violence ...

