

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

ESCUELA DE POSGRADO

Unidad de Posgrado de Psicología



**Producción científica sobre violencia en población quechua
hablante**

Trabajo Académico para obtener el Título de Segunda Especialidad Profesional
en Psicología Clínica y de la Salud

Autora:

Maritza Sierra Monzon

Asesor:

Mg. Julio Cesar Cjuno Suni

Lima, mayo de 2025


DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD DEL TRABAJO ACADÉMICO

Yo Julio Cesar Cjuno Suni, docente de la Unidad de Posgrado de Psicología, Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Unión.

DECLARO:

Que la presente investigación titulada: **“Producción científica sobre violencia en población quechua hablante”** de la autora Maritza Sierra Monzon, tiene un índice de similitud de 13% verificable en el informe del programa Turnitin, y fue realizada en la Universidad Peruana Unión bajo mi dirección.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponde ante cualquier falsedad u omisión de los documentos como de la información aportada, firmo la presente declaración en la ciudad de Lima, a los 05 días del mes de mayo del año 2025.



Mg. Julio Cesar Cjuno Suni
Asesor

**Producción científica sobre violencia en población
quechua hablante**

TRABAJO ACADÉMICO

Presentado para optar el Título de Segunda Especialidad
Profesional en Psicología Clínica y de la Salud



Mg. Sandra Vanessa Revelo Aulestia
Dictaminadora

Lima, 05 de mayo de 2025

Producción científica sobre violencia en población quechua hablante

Scientific production on violence in the Quechua-speaking population

Autores

Maritza Sierra Monzón¹

Filiación

¹ Universidad Peruana Unión, Unidad de Posgrado de Psicología, Lima, Perú

ORCID

Maritza Sierra: <https://orcid.org/0009-0004-6599-8825>

CORREOS

Maritza Sierra Monzón: sierramonzon.m@gmail.com

Corresponsal

Nombre de autor corresponsal/es

Dirección de domicilio, incluye el código postal de la zona

RESUMEN

El objetivo de este artículo es recopilar y revisar la producción científica sobre la violencia en población quechua hablante. Se trata de una investigación de tipo revisión narrativa, que tuvo como fuentes de información las bases de datos Scopus, Web of Science, SciELO y PubMed, incluyendo estudios en inglés y español. Se emplearon descriptores relacionados con violencia y población quechua hablante, sin establecer un periodo específico de búsqueda. Los resultados fueron organizados en un archivo Excel 2019. Todos los estudios incluidos tuvieron como factor común la violencia en población quechua hablante.

Se identificaron nueve estudios: tres de diseño transversal, dos de enfoque mixto, dos teóricos, uno de revisión y uno comparativo. Los hallazgos revelan la presencia de problemas de salud mental como depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático (TEPT) asociados a la exposición a violencia política y otros tipos de violencia. No se encontraron investigaciones experimentales sobre esta temática en la población quechua hablante. Cabe destacar que siete de los nueve estudios fueron realizados en la región de Ayacucho, Perú. Algunos de ellos utilizaron herramientas psicométricas como las partes I y IV del Cuestionario de Trauma de Harvard, la Escala de Resiliencia de Connor-Davidson y el Cuestionario de Estrés Vitalicio.

Se concluye que la violencia política y otros tipos de violencia han tenido un impacto negativo en la salud mental de la población quechua hablante. Sin embargo, la investigación sobre este fenómeno sigue siendo limitada, al igual que la construcción o adaptación de instrumentos psicométricos cultural y lingüísticamente adecuados que garanticen validez y confiabilidad.

Palabras Clave: Violencia, población, quechua, quichua, pueblos originarios.

ABSTRACT

The objective of this article is to compile and review the scientific production on violence in the Quechua-speaking population. It was a narrative review research, which had as its source of information the Scopus, Web of Science, Scielo, and PubMed databases with studies in English and Spanish, with descriptors for violence and the Quechua-speaking population. Without limiting the search period, the results were organized in an Excel 2019 file. All the studies included had violence in the Quechua-speaking population as a common factor.

The results obtained were nine studies on violence in the Quechua-speaking population, three cross-sectional studies, two mixed studies, two theoretical studies, one review study, and one comparative study. The findings reveal mental health problems such as depression, anxiety, and post-traumatic stress disorder (PTSD) after exposure to political violence and other types of violence. No experimental research was found on this topic in the Quechua-speaking population. Also, seven of the nine studies were conducted in the Ayacucho region of Peru. Some of these studies used psychometric tools, such as Parts I and IV of the Harvard Trauma Questionnaire, the Connor-Davidson Resilience Scale, and the Lifetime Stress Questionnaire.

It is concluded that political violence and other types of violence have negatively impacted the mental health of the Quechua-speaking population. However, research on this phenomenon remains limited, as is the construction or adaptation of culturally and linguistically appropriate psychometric tools that guarantee validity and reliability.

Keywords: Violence, population, Quechua, Quichua, indigenous peoples.

INTRODUCCIÓN

Los pueblos quechua hablantes están presentes en países como Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile y Bolivia (UNICEF, 2020). En el caso del Perú, el 22,3 % de la población se autoidentifica como de origen quechua, siendo las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Cusco las que presentan los mayores porcentajes (INEI, 2018).

La violencia constituye una de las principales causas de muerte a nivel mundial en la población de 15 a 44 años, afectando al 14 % de varones y al 7 % de mujeres. Por tal motivo, en 1996 la Asamblea Mundial de la Salud la declaró como uno de los principales problemas de salud pública a nivel global, subrayando sus graves consecuencias inmediatas y futuras para la salud, así como para el desarrollo psicológico y social de los individuos, las familias, las comunidades y los países (OPS, 2002).

La violencia en la población quechua hablante es un fenómeno complejo, influenciado por factores históricos, sociales, económicos y políticos. Algunos datos relevantes ilustran esta problemática. Por ejemplo, según el Banco Mundial, en Perú más del 60 % de las personas que no tienen acceso a servicios de salud hablan quechua. Esta situación de discriminación ha llevado a que muchas personas decidan no transmitir el idioma a sus descendientes por temor al rechazo o la burla (Banco Mundial, abril de 2014).

Asimismo, según un informe del Ministerio de la Mujer, en el año 2022 el Registro Único de Víctimas (RUV) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) reportó un total de 7,058 casos de violación sexual ocurridos durante el conflicto armado interno en el Perú. Esta cifra representa un incremento significativo en

comparación con los 527 casos documentados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el año 2003 (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2023).

En ese contexto, la población quechua hablante ha sido profundamente afectada por la violencia política y los conflictos armados. Entre 1980 y 2000 se registraron en el Perú un total de 69,280 muertes, de las cuales aproximadamente el 75 % correspondían a personas quechua hablantes, víctimas de graves violaciones de derechos humanos (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003).

Es crucial generar conocimiento sobre la violencia en la población quechua hablante, con el fin de visibilizar su impacto en la salud mental de esta población específica. Esta información puede contribuir al diseño de políticas públicas adecuadas y a la garantía de sus derechos. Sin embargo, según la presente revisión, aún son escasas las investigaciones que aborden esta problemática y su impacto. Por ello, el objetivo del presente estudio fue describir la producción científica sobre violencia en población quechua hablante.

METODOLOGÍA


La presente investigación corresponde a una revisión narrativa. La búsqueda de literatura científica se llevó a cabo en las bases de datos Scopus, Web of Science, Scielo y PubMed, considerando estudios en inglés y español, sin limitar el periodo de búsqueda. La estrategia de búsqueda incluyó términos y descriptores relacionados con la violencia y la población quechua hablante.

La búsqueda se realizó en noviembre de 2024 por un revisor independiente. Los resultados fueron organizados en un archivo de Microsoft Excel 2019. Se encontraron 46 resultados en Scopus, 10 en Web of Science, 7 en PubMed y 3 en Scielo. Se procuró

incluir estudios que abordaran el fenómeno de la violencia en población quechua hablante; finalmente, 9 estudios cumplieron con los criterios de inclusión y fueron considerados elegibles.

Una vez obtenida la lista de artículos seleccionados, se procedió al análisis completo de los documentos y a la recopilación de datos. Las variables consideradas fueron: autor, año de publicación, tipo de estudio, diseño, objetivo, instrumentos, participantes y resultados. Asimismo, se excluyeron algunos artículos por no contar con información suficiente.

Figura 1. Diagrama de flujo de la selección de estudios:



RESULTADOS

Se realizó una búsqueda en las bases de datos Scopus, Web of Science, Scielo y PubMed, identificándose un total de 66 estudios. Tras la eliminación de duplicados, se incluyeron finalmente 9 estudios, de los cuales 3 son estudios transversales, 2 estudios mixtos, 1 estudio de revisión, 1 estudio comparativo y 2 estudios teóricos, por ser pertinentes al objetivo e intención del presente estudio.

Los estudios revisados tuvieron como objetivos: examinar las respuestas postraumáticas (Suárez, 2013); analizar la prevalencia de enfermedades tras la exposición a la violencia política (Tremblay et al., 2009); explorar las secuelas de la violencia política (Pedersen et al., 2008); evaluar el acceso a servicios después de haber sufrido violencia de pareja (Calderón et al., 2023); interpretar representaciones de la violencia (Lerner, 2020); describir manifestaciones de violencia obstétrica (Giacomozzi et al., 2021); documentar testimonios de sobrevivientes de la violencia (Johansson, 2023); y analizar expresiones de angustia vinculadas a la exposición a la violencia (Pedersen et al., 2010).

Este estudio no identificó investigaciones experimentales sobre la violencia en la población quechua hablante. Si bien es posible abordar este fenómeno mediante metodologías experimentales, estas deben llevarse a cabo bajo estrictas normas éticas que garanticen el bienestar de los participantes y prevengan cualquier daño. Esta ausencia evidencia una brecha significativa en el conocimiento científico sobre la temática.

Se identificaron 7 estudios realizados en la región de Ayacucho, Perú (Suárez, 2013; Tremblay et al., 2009; Pedersen et al., 2008; Lerner, 2020; Johansson, 2023;

Suárez, 2013; Pedersen et al., 2010), lo que destaca la relevancia de esta región en la investigación sobre violencia y salud mental en población quechua hablante.

Los estudios de Suárez (2013) utilizaron instrumentos validados para evaluar aspectos clave de la salud mental, tales como la Parte I y IV del Cuestionario de Trauma de Harvard, la Escala de Resiliencia de Connor-Davidson y el Cuestionario de Estrés Vitalicio. Estas herramientas permitieron medir la exposición a traumas, la resiliencia frente a la adversidad y el estrés vital acumulado en dicha población.

TABLA 1. Características de los estudios seleccionados sobre violencia en población quechua hablantes.

AUTOR (año)	TIPO DE ESTUDIO / DISEÑO	OBJETIVO	INSTRUMENTOS	PARTICIPANTES	RESULTADOS
Suarez (2013)	Original/Trasversal	Examina la resiliencia y las respuestas postraumáticas de las mujeres indígenas quechuas.	Cuestionario de Trauma de Harvard, parte I y parte IV; la escala de resiliencia de Connor - Davidson" y el Cuestionario de Estrés vital"; "Cuestionario de trauma desarrollado por Pedersen"	Participaron 151 mujeres quechuas de 25 a más, pertenecientes a los pueblos de Socos, Maucallpta y Ccayarpachi del departamento de Ayacucho/Perú.	Las mujeres presenciaron un promedio de casi 9 eventos violentos, el 67 % resultó gravemente herido o casi muere, el 58% fue torturado y 83 % la muerte violenta de familiares y vecinos.
Tremblay et. al. (2009)	Original/trasversal	Documenta la alta prevalencia de enfermedades entre la población quechua, expuestas a la violencia política.	El Cuestionario de Salud General (GHQ) (Goldberg, 1972); la Lista de verificación de síntomas de Hopkins (HSCL) (Mattsson et al., 1969); y un Cuestionario de Trauma (TQ) desarrollado por el equipo investigador.	Participaron 373 personas, 226 mujeres y 147 varones; cuyas edades oscilan desde los 15- 50 años a más del departamento de Ayacucho/Perú	Problema de salud mental (72,9%), Ansiedad y/o depresión (38,9%), Compatibles con TEPT, (24,9%). Después de una exposición prolongada a violencia política
Pedersen et. al. (2008)	Original/ mixto	Medir las secuelas de la violencia política.	Encuestas y grabaciones	Participaron 147 hombres y 226 mujeres de 14 a 50 años pertenecientes a los pueblos de Chaca, Cunya, Huaychau, Huaynacancha y Nueva Jerusalén del norte de Ayacucho/Perú	144 hombres y mujeres obtuvieron puntuación positiva en ansiedad y/o depresión. 92 hombres y mujeres dieron positivo a síntomas compatibles Con un diagnóstico de TEPT. Estos resultados están asociados a la exposición a la violencia política.
Calderón et.al. (2023)	Original/mixto	Evaluar el acceso a los servicios disponibles para las mujeres sobrevivientes de	Entrevistas semiestructuradas, a través de llamadas telefónicas y medios virtuales, utilizando	Entrevistas a 17 informantes claves, policiales y de la sociedad civil, de la	Falta de capacitación en los profesionales de la salud para dar respuesta a la violencia de pareja,

		violencia de pareja.	el marco del paquete de servicios de la ONU.	comunidad indígena quechua de Amantani/Perú	que tome en cuenta las características culturales.
Lerner (2020)	Revisión/Revisión	Arte y memoria después de la violencia política en el Perú.	Representación	Experiencia de la comisión de la Verdad y el Grupo Cultural Yutachkani Ayacucho/Perú (No tiene muestra)	El arte restaura el significado al ponernos como seres responsables cara cara con hechos y circunstancias innegables. Nos permite reconstruir la memoria e interpretar la violencia.
Giacomozzi et.al. (2021)	Revisión/comparativa	Explorar las manifestaciones de la violencia obstétrica.	Preguntas de investigación	Dos estudios, de revisión narrativa de forma independiente que luego fueron fusionados, la primera que corresponde a la población quichua y la otra de la población egipcia.	Los hallazgos revelan violencia obstétrica en forma de negación a la elección de la posición preferida para el parto. En Perú el 97% de las mujeres habían experimentado, al menos una forma de violencia obstétrica.
Johansson (2023)	Revisión/teórico	Testimonios de Angélica Mendoza y Georgina Gamboa ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación, como víctimas políticas.	Entrevista	Angélica Mendoza (1929-2017) Georgina Gamboa, ambas mujeres adultas de Ayacucho/Perú	Declararon ante el VCR, haber sido víctimas de violencia política, y aceptaron que sus testimonios fueran televisados.
Suarez (2013)	Original/trasversal	Resultados a largo plazo de las respuestas postraumáticas y resiliencia de mujeres indígenas quechuas adultas, que sufrieron la violencia política.	(Cuestionario de Trauma de Harvard Parte I y IV; Escala de Resiliencia de Connor-Davidson; Cuestionario de Estrés Vitalicio) fueron traducidos al quechua y validados transculturalmente.	Participaron 75 mujeres de 25 – 45 años de edad, de Ayacucho/Perú	Los participantes, informaron una exposición extrema a violencia (violencia sexual, tortura, combates, muerte de familiares y desplazamiento), por lo que, 73 mujeres han sufrido o presenciado un promedio de 8 eventos traumáticos. El 5,3% un posible trastorno del estrés postraumático (TEPT).
Pedersen et.al. (2010)	Original/teórico	Examinar expresiones de angustia entre los quechuas, en relación con su exposición a la violencia.	Entrevista y recolección de datos. (Preguntas orientadas a expresiones idiomáticas de angustia).	45 entrevistas semiestructuradas a adultos de ambos sexos, y 226 recolecciones de historias de trauma, en los pueblos de Chaca, Cunya, Huaychau, Huaynacancha y Nueva Jerusalén. Ayacucho/ Perú.	El sassachacuy como una de las categorías centrales en el discurso popular, equivale a dificultades y se asocia consistentemente con la experiencia de violencia durante los años de la guerra armada.

DISCUSIÓN

El presente estudio tuvo como objetivo revisar la información científica disponible sobre el fenómeno de la violencia en la población quechua hablante, identificando principalmente la violencia política, así como otras formas de violencia en menor medida, como la violencia obstétrica y el acceso a servicios para mujeres sobrevivientes de violencia de pareja.

Los resultados de los estudios incluidos en esta investigación revelan problemas de salud mental como ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático (TEPT) en la población quechua hablante, después de la exposición a la violencia política ocurrida entre 1980 y 2000 (Gurmendi, 2019). Además, se identificó la exposición a otros tipos de violencia, aunque con menor frecuencia. Un estudio anterior encontró que las mujeres quechuas de Cusco, Perú, presentaron síntomas depresivos casi cinco veces más intensos que las mujeres Zenú (Colombia) (Cjuno, 2021). De manera similar, otro estudio realizado en una población quechua hablante de Ayacucho, Perú, identificó problemas de salud mental en un 72.9% de los casos, siendo la ansiedad y/o depresiones predominantes (38.9%), con un 24.9% compatible con TEPT después de una exposición prolongada a la violencia política (Tremblay et al., 2009). Estos hallazgos evidencian que la violencia ha tenido un impacto significativo en la salud mental de las comunidades quechua hablantes objeto de este estudio.

La ausencia de investigaciones experimentales sobre violencia en la población quechua hablante pone de manifiesto una brecha crítica en el conocimiento científico, limitando la capacidad para abordar eficazmente la problemática y dificultando la formulación de políticas públicas basadas en evidencia que respondan a las necesidades específicas de esta población. Por lo tanto, es crucial promover estudios experimentales

que exploren las causas, manifestaciones y consecuencias de la violencia en estas comunidades, incorporando perspectivas interdisciplinarias y colaborativas que integren a las comunidades locales en el proceso, garantizando que los hallazgos sean culturalmente relevantes y aplicables (Chaverri & Arguedas, 2020).

Dentro de los nueve artículos incluidos en esta investigación, siete fueron realizados en Ayacucho, Perú, con autores como Suárez (2013), Tremblay et al. (2009), Pedersen et al. (2008), Lerner (2020), Johansson (2023), Suárez (2013) y Pedersen et al. (2010). Si bien estos estudios proporcionan valiosa información sobre la violencia en la población quechua hablante, se presentan limitaciones de información sobre otros espacios geográficos del Perú y de los países andinos donde también habitan comunidades quechua hablantes. La mayor presencia de investigaciones en la región de Ayacucho puede deberse a la historia de violencia política que ha motivado un interés nacional e internacional particular por estudiar esta población.

Dos estudios emplearon herramientas validadas para evaluar distintos aspectos de la salud mental en la población quechua hablante. Entre los instrumentos utilizados destacan la Parte I y IV del Cuestionario de Trauma de Harvard, que mide la exposición a eventos traumáticos y sus impactos; la Escala de Resiliencia de Connor-Davidson, utilizada para evaluar la capacidad de afrontamiento frente a la adversidad; y el Cuestionario de Estrés Vitalicio, enfocado en la identificación de experiencias estresantes a lo largo de la vida. El uso de estas herramientas permitió visibilizar las secuelas de la violencia en las poblaciones quechua hablantes. Sin embargo, los datos arrojados deben ser tomados con prudencia, como señala Suárez (2013).

Es un avance significativo la implementación de 288 Centros de Salud Mental Comunitarios, 51 unidades hospitalarias, 94 hogares protegidos y 11 equipos móviles

para personas en situación de calle, destinados a la atención de la salud mental a nivel del estado peruano. Sin embargo, es fundamental contar con información oficial y desagregada que permita conocer cómo estos servicios están respondiendo a las necesidades específicas de las comunidades quechua hablantes en el Perú (Ministerio de Salud, 2024).

Existe una brecha en la investigación y adaptación de herramientas psicométricas aplicables que respondan a las necesidades específicas de las comunidades quechua hablantes.

Fortalezas y limitaciones

Aunque esta investigación contribuye a aumentar el número limitado de estudios existentes, permitiendo continuar explorando y fortaleciendo el conocimiento en el área, es importante destacar algunas limitaciones que podrían haber influido en los hallazgos. El estudio se basó en búsquedas realizadas en Scopus, Web of Science, Scielo y PubMed, por lo que es posible que exista más información relevante en otras bases de datos. Además, para este estudio no se utilizó un criterio específico de calidad metodológica, lo cual puede representar una limitación al interpretar los hallazgos y su rigor. Reconocer estas limitaciones permite interpretar los resultados de manera más cuidadosa y contextualizada. Futuras investigaciones podrían incluir criterios más rigurosos de calidad metodológica y ampliar el alcance de las búsquedas en otras bases de datos, con el fin de obtener una visión más integral sobre el tema.

Conclusiones

La violencia política y otros tipos de violencia han tenido un impacto profundamente negativo en la salud mental de la población quechua hablante, afectando su bienestar emocional y social de manera significativa. Sin embargo, la investigación

sobre este fenómeno en dichas comunidades sigue siendo limitada, lo que dificulta una comprensión integral de sus efectos y la implementación de estrategias efectivas de intervención. Además, persiste la necesidad de construir o adaptar herramientas psicométricas que sean cultural y lingüísticamente pertinentes, capaces de captar de manera precisa las realidades de esta población y garantizar niveles adecuados de validez y confiabilidad para su uso en contextos específicos.

REFERENCIAS

Calderón M.; Cortez-Vergara C.; Brown L.; Lowe H.; Abarca B.; Rondon M.; Mannell J. (2023). *“Assessing essential service provision for prevention and management of violence against women in a remote indigenous community in Amantani, Perú.”* 10.1186/s12939-023-02012-3

Chaverri y Arguedas (2020). “Políticas Públicas Basadas en Evidencia: una revisión del concepto y sus características.”
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2215-29972020000100040

Comisión de la Verdad y Reconciliación CVR (2003). “Informe final.”
<https://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php>

Fondo de las Naciones Unidad para la Infancia UNICEF (2020). “Presenta el Atlas sociolingüístico de pueblos indígenas, en América Latina.”
<https://www.unicef.es/prensa/unicef-presenta-el-atlas-sociolinguistico-de-pueblos-indigenas-en-america-latina>

Giacomozzi M.; Farje De La Torre F.; Khalil M. (2021). “Standing up for your birth rights: An intersectional comparison of obstetric violence and birth positions between Quichua and Egyptian women.” 10.1002/ijgo.13890

Gurmendi A. (2019). “Conflicto armado en el Perú, la época del terrorismo bajo el derecho internacional.” Cp 1.
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=vZsPEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=algun+estudio+de+precice+cuanto+duro+el+conficto+armado+en+el+peru&ots=oYUZ8isrZ_&sig=w1ufVPSsfOogl87HeOZ1dS1gHY#v=onepage&q&f=false

Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI (2018). “Perú perfil sociodemográfico, informe nacional, Censos Nacionales 2017; XII de población, VII de Vivienda y III de comunidades indígenas.” Pg219.
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf

Johansson M.T. (2023). “Peruvian testimony of Quechua-speaking female victims: peoples, languages and motherhood; [Testimonio peruano de víctimas mujeres quechuahablantes: pueblos, lenguas y maternidad].” 10.30920/letras.94.139.3

Julio Cjuno, Joel Figueroa-Quiñones, Gino Gabriel Marca-Dueñas, Renzo Felipe Carranza-Esteban (2021). “Producción Científica sobre depresión en poblaciones quechua hablantes: Una revisión narrativa.”
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-48082021000200163&script=sci_arttext&tlng=en

Lerner Febres S. (2020). “Memory of Violence and Drama in Peru: The Experience of the Truth Commission and Grupo Cultural Yuyachkani - Violence and Dehumanization.” 10.1093/ijtj/ijz032

Ministerio de Salud MINSA (2024, 05 de enero). “El Perú cuenta con 288 centros de salud mental comunitaria distribuidos en todo el país.” Nota de prensa.
<https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/1086134-el-peru-cuenta-con-288-centros-de-salud-mental-comunitaria-distribuidos-en-todo-el-pais>

Organización Panamericana de la Salud OPS (2002). “Informe Mundial sobre la violencia y la Salud.” pág. 1.
https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/43431/9275324220_spa.pdf

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. MIMP (2023). *Factores explicativos de la violencia sexual contra niñas y niños*.
<https://www.mimp.gob.pe/omep/pdf/evidencias/DPVLSV2023-1-Factores-explicativos-de-la-violencia-sexual-contraninos-y-ninias.pdf>

Pedersen D.; Tremblay J.; Errázuriz C.; Gamarra J. (2008). “The sequelae of political violence: Assessing trauma, suffering and dislocation in the Peruvian highlands.” 10.1016/j.socscimed.2008.03.040

Pedersen D.; Kienzler H.; Gamarra J. (2010). “Llaki and Aakary: Idioms of Distress and Suffering Among the Highland Quechua in the Peruvian Andes.” 10.1007/s11013-010-9173-z

Suarez E.B. (2013). “Two decades later: The resilience and post-traumatic responses of Indigenous Quechua girls and adolescents in the aftermath of the Peruvian armed conflict.” 10.1016/j.chiabu.2012.09.011

Suarez E. (2013). “The association between post-traumatic stress-related symptoms, resilience, current stress and past exposure to violence: A cross-sectional study of the survival of Quechua women in the aftermath of the Peruvian armed conflict.” 10.1186/1752-1505-7-21

Tremblay J.; Pedersen D.; Errazuriz C. (2009). “Assessing mental health outcomes of political violence and civil unrest in Peru.” 10.1177/0020764009103214

ANEXOS

Estrategia de búsqueda en la base de datos Scopus (46 resultados)

TITLE-ABS-KEY (quechua OR quichua OR kechua OR kichwa OR kichua OR queshua OR "original towns") AND TITLE-ABS-KEY ("Intimate Partner Violence" OR "Domestic Violence" OR "Spousal Abuse" OR "Relationship Violence" OR "Partner Aggression" OR "Interpersonal Violence" OR "Abusive Relationships" OR "Battered Women" OR "Family Violence" OR "Marital Violence" OR "Dating Violence" OR "Gender-Based Violence" OR "Domestic Abuse" OR "Relationship Conflict" OR violence OR "psychological violence" OR "physical violence" OR "sexual violence")

Scopus - Document search result

https://www.scopus.com/results/results.uri?sort=plf-f&src=s&sid=133a7893b431e66d681b494835d2fc66&sot=a&sdt=a&sl=533&ts=TITLE-ABS-KEY+%28quechua+OR+quichua+OR+kechua+OR+kichwa+OR+kichua+OR+queshua+OR+original+towns%29+AND+TITLE-ABS-KEY+%28Intimate+Partner+Violence+OR+Domestic+Violence+OR+Spousal+Abuse+OR+Relationship+Violence+OR+Partner+Aggression+OR+Interpersonal+Violence+OR+Abusive+Relationships+OR+Battered+Women+OR+Family+Violence+OR+Marital+Violence+OR+Dating+Violence+OR+Gender-Based+Violence+OR+Domestic+Abuse+OR+Relationship+Conflict+OR+violence+OR+psychological+violence+OR+physical+violence+OR+sexual+violence%29

Beta

Documents Preprints Patents Secondary documents Research data

Are you searching for: TITLE-ABS-KEY (quechua OR quichua OR kechua OR schwa OR sichuan OR quechua...

46 documents found

Analyze results

Refine search

Search within results

Filters

Year

Range Individual

from to

Document title Authors Source Year Citations

1 **When the past meets the future: Latin American Indigenous futures, transitional justice and global energy governance** Segovia-Tzompa, S.M., Cosimero, I., Apagüño, M.G. Futures, 163, 103438 2024 2

Show abstract View at Publisher Related documents

2 **Storytelling dreams and life: Traveling across worlds in the Amazon of Ecuador** Noroña, M.B. Environment and Planning E: Nature and Space, 7(5), pp. 1975-1994 2024 1

Show abstract View at Publisher Related documents


Author name

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85200249117&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=133a7893b431e66d681b494835d2fc66&sot=a&sdt=a&sl=533&ts=TITLE-ABS-KEY+%28quechua+OR+quichua+OR+kechua+OR+kichwa+OR+kichua+OR+queshua+OR+original+towns%29+AND+TITLE-ABS-KEY+%28Intimate+Partner+Violence+OR+Domestic+Violence+OR+Spousal+Abuse+OR+Relationship+Violence+OR+Partner+Aggression+OR+Interpersonal+Violence+OR+Abusive+Relationships+OR+Battered+Women+OR+Family+Violence+OR+Marital+Violence+OR+Dating+Violence+OR+Gender-Based+Violence+OR+Domestic+Abuse+OR+Relationship+Conflict+OR+violence+OR+psychological+violence+OR+physical+violence+OR+sexual+violence%29

ES 10:51 p.m. 04/03/2025


Estrategia de búsqueda en la base de datos Web of Science (10 resultados)

(TI=(quechua OR quichua OR kechua OR kichwa OR kichua OR qeshua OR "original towns") OR AB=(quechua OR quichua OR kechua OR kichwa OR kichua OR qeshua OR "original towns") OR AK=(quechua OR quichua OR kechua OR kichwa OR kichua OR qeshua OR "original towns")) AND (TI=("Intimate Partner Violence" OR "Domestic Violence" OR "Spousal Abuse" OR "Relationship Violence" OR "Partner Aggression" OR "Interpersonal Violence" OR "Abusive Relationships" OR "Battered Women" OR "Family Violence" OR "Marital Violence" OR "Dating Violence" OR "Gender-Based Violence" OR "Domestic Abuse" OR "Relationship Conflict" OR violence OR "psychological violence" OR "physical violence" OR "sexual violence") OR AB=("Intimate Partner Violence" OR "Domestic Violence" OR "Spousal Abuse" OR "Relationship Violence" OR "Partner Aggression" OR "Interpersonal Violence" OR "Abusive Relationships" OR "Battered Women" OR "Family Violence" OR "Marital Violence" OR "Dating Violence" OR "Gender-Based Violence" OR "Domestic Abuse" OR "Relationship Conflict" OR violence OR "psychological violence" OR "physical violence" OR "sexual violence") OR AK=("Intimate Partner Violence" OR "Domestic Violence" OR "Spousal Abuse" OR "Relationship Violence" OR "Partner Aggression" OR "Interpersonal Violence" OR "Abusive Relationships" OR "Battered Women" OR "Family Violence" OR "Marital Violence" OR "Dating Violence" OR "Gender-Based Violence" OR "Domestic Abuse" OR "Relationship Conflict" OR violence OR "psychological violence" OR "physical violence" OR "sexual violence"))



Estrategia de búsqueda en la base de datos Scielo (3 resultados)

((quechua) OR (quichua) OR (kechua) OR (kichwa) OR (kichua) OR (queshua))
AND (violencia)



Estrategia de búsqueda en la base de datos PubMed (7 resultados)

(quechua [TIAB] OR quichua[TIAB] OR kechua[TIAB] OR kichwa [TIAB])

OR kichua [TIAB] OR quechua [TIAB] OR "original towns" [TIAB]) AND ("Intimate Partner Violence" [TIAB] OR "Domestic Violence" [TIAB] OR "Spousal Abuse" [TIAB] OR "Relationship Violence" [TIAB] OR "Partner Aggression" [TIAB] OR "Interpersonal Violence" [TIAB] OR "Abusive Relationships" [TIAB] OR "Battered Women" [TIAB] OR "Family Violence" [TIAB] OR "Marital Violence" [TIAB] OR "Dating Violence" [TIAB] OR "Gender-Based Violence" [TIAB] OR "Domestic Abuse" [TIAB] OR "Relationship Conflict" [TIAB] OR violence [TIAB] OR "psychological violence" [TIAB] OR "physical violence" [TIAB] OR "sexual violence" [TIAB]).

