

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

ESCUELA DE POSGRADO

Unidad de Posgrado de Psicología



**Producción científica sobre disfunción familiar como factor de riesgo
en el consumo de alcohol en adolescentes latinoamericanos**

Trabajo Académico para obtener el Título de Segunda Especialidad Profesional en
Psicología Clínica y de la Salud

Autora:

Wendy Jennyfer Chura Paja

Asesor:

Mg. Cristian Edwin Adriano Rengifo

Lima, julio 2025

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD DEL TRABAJO ACADÉMICO

Yo Mg. Cristian Edwin Adriano Rengifo, docente de la Unidad de Posgrado de Psicología, Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Unión.

DECLARO:

Que la presente investigación titulada: **“Producción científica sobre disfunción familiar como factor de riesgo en el consumo de alcohol en adolescentes latinoamericanos”** del autor Wendy Jennyfer Chura Paja, tiene un índice de similitud de 13% verificable en el informe del programa Turnitin, y fue realizada en la Universidad Peruana Unión bajo mi dirección.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponde ante cualquier falsedad u omisión de los documentos como de la información aportada, firmo la presente declaración en la ciudad de Lima, a los 04 días del mes de julio del año 2025.



Mg. Cristian Edwin Adriano Rengifo
Asesor

**Producción científica sobre disfunción familiar como
factor de riesgo en el consumo de alcohol en adolescentes
latinoamericanos**

TRABAJO DE ACADÉMICO

Presentado para optar el Título de Segunda Especialidad
Profesional en Psicología Clínica y de la Salud



Mg. Esther Edelmira Méndez Zavaleta

Dictaminadora

Lima, 04 de julio del 2025

**Producción científica sobre disfunción familiar como factor de riesgo en el
consumo de alcohol en adolescentes Latinoamericanos”**

Scientific production on family dysfunction as a risk factor in alcohol consumption in Latin
American adolescents

Autores

Wendy Jennyfer Chura Paja¹

Filiación

¹ Universidad Peruana Unión, Unidad de Posgrado de Psicología, Lima, Perú

ORCID

Wendy Jennyfer Chura Paja: <https://orcid.org/0009-0008-1538-439X>

Correos

Wendy Jennyfer Chura Paja: wendy.chura@upeu.edu.pe

Corresponsal

Nombre de autor corresponsal: Wendy Jennyfer Chura Paja

Resumen

El presente estudio tuvo el objetivo describir por medio de la revisión bibliográfica la disfunción familiar como factor de riesgo en el consumo de alcohol en adolescentes latinoamericanos. La metodología aplicada fue la revisión narrativa, empleando la búsqueda de información a través de base de datos como Scopus, PubMed, Web of Science y Scielo. Se consideraron artículos científicos en inglés y español, utilizando buscadores booleanos, los criterios de selección integraron términos y descriptores claves como: adolescentes, factor de riesgo, influencia familiar, disfunción familiar, conflicto familiar y consumo de alcohol. Se obtuvo una totalidad de 48 artículos científicos; no obstante, se eliminaron los artículos científicos que no se regían el tema de investigación y duplicados de los cuales fueron seleccionados 5 artículos. Finalmente, se concluye que los adolescentes que crecen en hogares disfuncionales, especialmente aquellos con antecedentes de alcoholismo, tienen una mayor probabilidad de consumir alcohol. Por otro lado, el entorno familiar desempeña un papel clave en la formación de las actitudes de los adolescentes, ya que los comportamientos y valores familiares son transmitidos.

Palabras claves: *Disfunción familiar, factor de riesgo, consumo de alcohol en adolescentes.*

Abstract

The objective of this study was to describe, through a bibliographic review, family dysfunction as a risk factor in alcohol consumption in Latin American adolescents. The methodology applied was the narrative review, using the search for information through databases such as Scopus, PubMed, Web of Science and Scielo; Scientific articles in English and Spanish were considered, using Boolean search engines, the selection criteria integrated key terms and descriptors such as: adolescents, risk factor, family influence, family dysfunction, family conflict and alcohol consumption. A total of 48 scientific articles were obtained; However, scientific articles that did not address the research topic and duplicates were eliminated, of which 5 articles were selected. Finally, it is concluded that adolescents who grow up in dysfunctional homes, especially those with a history of alcoholism, have a greater probability of consuming alcohol. On the other hand, the family environment plays a key role in the formation of adolescents' attitudes, since family behaviors and values are transmitted.

Keywords: *Family dysfunction, risk factor, alcohol consumption in adolescents.*

Introducción

La adolescencia es una etapa clave para el inicio de diferentes comportamientos que pueden suponer consecuencias negativas para la salud, tanto a corto, medio y largo plazo (Sorabilla & Goñi, 2020). Uno de estos comportamientos es el consumo de alcohol, el cual se ha relacionado con una dimensión de la personalidad denominada búsqueda de sensaciones. Esta se caracteriza por una baja tolerancia al aburrimiento, una necesidad constante de estimulación y una marcada disposición a asumir riesgos y experimentar nuevas vivencias (Pumahuanca, 2021).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2024), el uso nocivo del alcohol constituye un problema social ya que impacta negativamente en la vida de una proporción considerable de la población. Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2019) señala un incremento en la prevalencia de episodios de consumo, con una tendencia creciente especialmente entre los jóvenes, lo cual se relaciona con factores como la disponibilidad de bebidas alcohólicas y su fácil acceso. A nivel global, se estima que más de una cuarta parte 26.5% de los adolescentes entre 15 a 19 años consumieron alcohol (Cabanillas y Rojas, 2021)., lo que se evidencia el problema en esta etapa de desarrollo.

En el Perú, el consumo de alcohol en adolescentes se convertido en una alerta silenciosa que crece, según el Instituto Nacional de Salud Mental (INSM), registro que el 29,5% de los escolares del nivel secundario ha consumido alcohol alguna vez y el 17,5% lo ha hecho en los últimos meses, con prevalencias más altas varones 60,9% en cambio mujeres 50,2%. Asimismo, el Ministerio de Salud (MINSA, 2020) informó que el 59,7% de los adolescentes de 12 a 18 años ha consumido alcohol. Esta cifra aumenta

al 87,3% en adultos jóvenes de 19 a 24 años, estas cifras revelan el consumo de alcohol a una edad temprana (Boudesseul Jordane, 2022).

El consumo de alcohol supone una conducta de riesgo. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2020), el 88.3% de adolescentes mujeres mayores a 14 años consumieron alcohol más de una vez y el 94.8% de adolescentes varones refieren haber consumido alcohol. En los últimos años, se ha visto el incremento en la frecuencia de consumo, así como una edad de inicio cada vez menor (Moreno, 2022).

Aunque en esta etapa, los adolescentes buscan independencia. El contexto familiar es el pilar que influye en su bienestar tal es que los hábitos y conflictos dentro del núcleo familiar percibidos pueden influir en el inicio de su ingesta; de esta manera, la disfunción familiar genera un entorno inestable que puede afectar el bienestar psicológico y aumentar la probabilidad de desarrollar conductas de riesgo, como el consumo de alcohol (Karapas et al., 2023). La disfunción familiar se caracteriza por conflictos, falta de comunicación efectiva y ausencia de apoyo emocional, lo que dificulta la construcción de un ambiente seguro para el desarrollo de los adolescentes, lo que puede llevar a los jóvenes a buscar aceptación en otros contextos (Berrios et al., 2022).

Diversos estudios han señalado que la presencia de estos factores dentro del núcleo familiar puede incrementar la vulnerabilidad de los jóvenes, favoreciendo la normalización del consumo de alcohol como una conducta aceptada en el entorno familiar (Natera-Rey et al., 2021). En hogares donde el consumo es habitual, pues los adolescentes lo perciben como una práctica aceptable, reduciendo su percepción de riesgo (López, 2022).

Por lo tanto, la influencia de los padres es clave en la formación de las conductas de sus hijos, ya que el núcleo familiar no solo modela los comportamientos individuales, sino que también amplifica o atenúa el impacto de factores externos, como la presión social de los pares y la percepción cultural del consumo de alcohol (Mejía & Trujillo, 2021).

La literatura científica vinculada al consumo del alcohol demuestra que las edades de inicio son cada vez más tempranas, y los adolescentes constituyen el grupo etéreo que mayor preocupación suscita. Por lo tanto, es crucial implementar un monitoreo y llevar a cabo intervenciones específicas en estas áreas para abordar los posibles problemas asociados al consumo y garantizar una mejor salud pública (Telumbre y López, 2020).

El consumo de alcohol está influenciado por diversas variables, como factores socioambientales, tradición y cultura, entre otros. Tal es así, la familia juega un rol determinante en la formación de hábitos en los que han identificado factores de riesgo y protección en relación al consumo de alcohol en los adolescentes, dado que la mayoría de conductas saludables, no saludables se adquieren y fortalecen en este ámbito (Lema & Varela, 2021). La adolescencia representa una etapa de vulnerabilidad en la que se definen aspectos biopsicosociales de la adultez (Cabrera, 2020). Es relevante fomentar, prevenir y promocionar estilos de vida saludables dentro del núcleo familiar que repercutirán en la salud integral de los adolescentes (Florenzano et al., 2019).

Teniendo en cuenta la información expuesta, la presente investigación tiene como objetivo describir desde la perspectiva narrativa bibliográfica; a la familia disfuncional como factor de riesgo en el consumo de alcohol en adolescentes. Al

conocer la relación, facilitara el diseño de estrategias preventivas, centradas en fortalecer el núcleo familiar.

Metodología

El presente estudio es de revisión narrativa bibliográfica (Sukhera, 2022), con el propósito de explorar el estado de avance en producción científica sobre disfunción familiar como factor de riesgo en el consumo de alcohol en adolescentes.

Por ello, se realizaron búsquedas de literatura científica en noviembre del 2024, a través de las bases de datos: Web of Science, Scopus, Pubmed y Scielo se consideró los estudios en inglés y español, publicados en las bases de datos, utilizando términos y descriptores claves como: adolescentes, factor de riesgo, influencia familiar, disfunción familiar, conflicto familiar y consumo de alcohol Anexo 1, se usaron buscadores de campo en los títulos, resúmenes y palabras clave, cuya estrategia fue revisada por tres expertos en investigación de revisión.

Para ello, se realizó un control de calidad en la selección de los artículos, utilizando una base de datos en Microsoft Excel 2021. Se incluyeron estudios que abordaron la disfunción familiar y el consumo de alcohol como variables principales. Cabe mencionar, dichos estudios fueron realizados con adolescentes latinoamericanos y presentan un formato de artículo original según su estructura. Excluyendo estudios publicados como notas, erratas, tesis, editoriales, entre otros.

Para determinar la inclusión de un estudio, realice la recolección de datos de manera individual, cuya información recopilada incluyo datos sobre el primer autor, año de publicación, objetivo, muestra y resultados obtenidos. Al concluir este proceso, verifique y valide la información recopilada que asegura su coherencia. Finalmente, la

búsqueda siguió los criterios de inclusión y exclusión, es por ello se determina aprobar la tabla de resultados. Información que puede visualizarse en la Figura 1.




Figura 1

Diagrama de flujo del proceso de selección de estudios.

Resultados

Hasta diciembre del 2024, se realizó el proceso de búsqueda científica, identificando estudios publicados entre 1990 al 2022. Como criterio de inclusión, se consideraron términos y herramientas descriptivas para las variables de estudio, permitiendo un análisis individualizado. Se encontró n=48 estudios en Scopus, Web of science, PubMed y Scielo. Posteriormente, se realizó una revisión en la que se suprimió aquellos artículos que no cumplían con los criterios de inclusión y exclusión, obteniendo un total de 5 artículos. Los resultados se observan en la Tabla 1.

Tabla 1

Características de los estudios seleccionados

Autor y año	Diseño/ tipo de artículo	Instrumento	Objetivo	Participantes	Resultados
Kadis, et.al. (1990)	Original/ Transversal	Escala de Entorno Familiar (FES) validado en español	Examinar el entorno familiar en hogares con problemas significativos de alcoholismo.	218 estudiantes de secundaria de edades entre 13 y 18 años, participaron tanto de sexo femenino como masculino en la investigación en Lima, Perú.	El 91,7% de los adolescentes en hogares con alcoholismo percibieron su entorno como disfuncional y presentaron altos niveles de estrés ($r = 0.65$; $p < 0.01$), evidenciando un impacto negativo en su bienestar emocional.
Mathews & Pillion (2004)	Original/ Transversal	"Drug Use Screening Inventory" (DUSI) versión en español	Examinar los antecedentes del consumo de alcohol por parte de los padres asociados al consumo de alcohol en adolescentes.	21 adolescentes, sus edades oscilan entre 12 a 18 años de sexo femenino y masculino, quienes acudieron a consulta	Hallazgos revelan que los estudiantes cuyos padres consumían alcohol presentaban un mayor riesgo de consumo y posible dependencia del alcohol ($r = 0.65$; $p < 0.01$). En cambio,

Molina, et.al. (2022)	Original/ Transversal	No describe	Conocer e identificar los factores asociados al consumo de alcohol en adolescentes.	194 estudiantes del nivel secundario, seleccionados de 1ro a 5to con edades de 13 a 18 años de sexo femenino y masculino 58.2% y 41.8% en Lima, Perú.	externa de un Hospital de Lima, Perú. aquellos cuyo único progenitor (madre) consumía alcohol tenían un menor riesgo de consumo de alcohol. ($r = 0,54$; $p < 0.001$). Los escolares con familiares enfermos en casa tenían una probabilidad 11,84 veces mayor ($p < 0.01$) de consumir alcohol, un riesgo que aumenta con las características familiares y personales. En contraste, el factor social (7,2%) no mostró una relación significativa con el consumo
Pizarro, et.al. (2017)	Original/ Transversal	Encuesta realizada UPCH, no se muestra datos de instrumento	Analizar los factores familiares relacionados al consumo de alcohol en adolescentes.	180 estudiantes del nivel secundario de una escuela pública con edades de 14 a 18 años fueron mujeres y varones en Lima, Perú.	Los bajos niveles de monitoreo parental y las relaciones familiares débiles se asociaron con una mayor probabilidad de consumo de alcohol en adolescentes (OR = 4.2; IC 95%: 1.3–13.5 y OR = 4.4; IC 95%: 1.5–13.0). Aunque el conflicto familiar mostró una relación con el consumo problemático, esta asociación no fue estadísticamente significativa (OR = 2.01; IC 95%: 0.8–5.1).

(Cusihamán et al., 2018)	Original/ Transversal	Escala familiar (APGAR) versión en español	<p>148 adolescentes, con distribución de 35,2% hombres y 64,8% mujeres, edad promedio de 14 años. Todos los participantes residentes de Mariano Roque Alonso, Paraguay.</p> <p>Describir la frecuencia y características de disfunción familiar en los adolescentes, como un grupo vulnerable dentro del entorno familiar.</p>	<p>El 59% de los adolescentes vivían en hogares disfuncionales, caracterizados por falta de apoyo emocional y presencia de conflictos familiares aumentó la probabilidad de consumo de alcohol. La relación entre los factores desencadenantes y la salud de los adolescentes fue significativa ($r = 0.68$; $p < 0.01$). El estudio subraya el papel fundamental de la familia, especialmente de los padres, en la vida de sus hijos.</p>
--------------------------	--------------------------	--	--	---

Los resultados obtenidos revelan la complejidad de un entorno familiar disfuncional en relación con el consumo de alcohol en los adolescentes (León, 2022) de acuerdo a la tabla 1 de resultados 2 de 5 estudios contaban con instrumentos psicométricos conocidos para evaluar los factores asociados a la disfunción familiar, los instrumentos empleados fueron: a) Escala de Entorno Familiar (FES) versión en español (Kadis et al., 1990) y b) Escala familiar (APGAR) versión en español (Cusihuamán et al., 2018). Los resultados evidenciaron que el 59% los participantes vivían en hogares disfuncionales; además, demostraron que los adolescentes de estos hogares presentaban una mayor probabilidad de consumir alcohol cuando surgían problemas dentro del núcleo familiar, con una confiabilidad de ($r = 0.68$; $p < 0.01$).

El análisis cualitativo y cuantitativo, evidencia que la disfunción familiar representa un factor de riesgo significativo en los adolescentes, disminuyendo su bienestar emocional (Kadis et al., 1990) problemas como el estrés, ansiedad y depresión se relacionan con la inestabilidad emocional, este hallazgo revela que el 91.7% de los adolescentes provienen de entornos familiares disfuncionales ($r = 0.72$; $p < 0.01$). Por otro lado, los niveles bajos de monitoreo parental y relaciones familiares débiles se asociaron con probabilidades de consumo de alcohol en adolescentes según variables sociodemográficas (OR) = 4,2; (IC) es 95%: 1,3–13,5; OR = 4,4; IC 95%: 1,5-13,0. (Pizarro et al., 2017).

Estos hallazgos han demostrado el papel fundamental que la familia desempeña frente al consumo de alcohol en los adolescentes. La disfuncionalidad familiar caracterizado por la falta de comunicación, la ausencia de supervisión o la presencia de conflictos familiares, puede generar un ambiente propenso para que los adolescentes busquen maneras de escapar de esos problemas mediante el consumo de alcohol.

Además, factores como el modelo parental, donde los padres pueden ser bebedores frecuentes o mostrar comportamientos que minimizan los riesgos del alcohol, también influyen en la conducta de los adolescentes, llegando incluso a normalizar dichas actitudes hacia el consumo de alcohol (Rodríguez et al., 2021).

Discusión

Diversas investigaciones coinciden en describir que la disfunción familiar constituye un factor de riesgo en el consumo de alcohol en adolescentes, enfatizando que la desorganización familiar, caracterizadas por la ausencia de normas claras, límites consistentes y supervisión parental, puede facilitar el inicio de consumo de alcohol. Esta debilidad, en el núcleo familiar, puede dejar a los adolescentes sin una estructura que regule su comportamiento, lo que aumenta la vulnerabilidad al consumo. En este sentido, un estudio realizado en Guayaquil y Ecuador, identificaron que más del 50% de las familias presentaban condiciones socioeconómicas precarias, bajo nivel educativo y prácticas permisivas hacia el consumo de alcohol, lo cual incide a una prevalencia de consumo en adolescentes (Ramírez Ruiz & de Andrade, 2003). Este hallazgo da a conocer que el primer núcleo social de la familia cumple un rol fundamental en la estructura de esquemas mentales y percepciones en los adolescentes derivando en la ingesta de alcohol de los casos observados. Según Pons (2022), los padres son las figuras significativas que no solo brindan afecto emocional, sino también enseñan a sus hijos como integrarse a la sociedad mediante la administración de premios y sanciones, que refuerzan o inhiben determinadas conductas según los valores familiares. La American Academy of Child e Adolescent Psychiatry (2025), sostiene que uno de cada cinco adolescentes en América vivió con

un familiar con problemas de alcohol, fueron más propensos de consumir que aquellos que no crecieron en este entorno.

Por otro lado, la relevancia del entorno familiar también se refleja en estudios encontrados de México y Argentina, donde se identificó una correlación entre el consumo de alcohol en familiares, amistades y la aparición de conductas experimentales en los adolescentes (Villarreal et al., 2020). Sin embargo, dicha experimentación no siempre se transforma en un hábito, lo cual puede explicarse por la presencia de factores protectores como la supervisión parental, percepción de riesgo y la estabilidad emocional. Según Buelga y Musitu (2019), tales vínculos pueden fomentar la autorregulación emocional y reducir la necesidad de validación externa, actuando como un escudo frente a influencias del entorno de esta forma, el consumo no puede evolucionar hacia conductas problemáticas o adictivas que repercuten a su salud mental, siempre que el adolescente cuente con redes de contención significativas en su entorno familiar y social. También da a conocer Rosabal et al. (2021) que un estudio realizado en Cuba, encontraron que el 93% de los adolescentes habían consumido alcohol, y un 36 % presentaban un consumo de mayor riesgo, tales factores asociados se encuentran: la amplia disponibilidad de alcohol, el uso del tiempo libre, la escasa comunicación con los padres y la influencia de los pares. Si bien el entorno familiar puede actuar como un factor protector, también revela que su debilitamiento puede ampliar la exposición de los adolescentes a entornos peligrosos (Castillo, 2017). Esto refuerza la comprensión del hogar como un entorno clave en la formación de habilidades socioemocionales protectoras o, por lo contrario, en la vulnerabilidad frente a conductas de riesgo.

Asimismo, es importante tener presente que la disfunción familiar dentro de varios contextos latinoamericanos no solo tiene que ver con el aspecto afectivo o relacional, dado que está marcado por condiciones estructurales como la pobreza, precariedad laboral y migración. En los hogares donde los padres deben trabajar largas jornadas o emigrar a otros países; es cuando los adolescentes asumen roles parentales de manera anticipada, lo que se conoce como parentalización. Esta inversión de roles provoca sobrecarga emocional, incremento en las carencias afectivas y una mayor tendencia a buscar reconocimiento o fuga en actividades externas al hogar, incluyendo el alcohol. Del caso mencionado, el académico Muño (2019) manifiesta que el deterioro funcional familiar se ve incrementado por esta percepción de soledad y sobre exigencia emocional en la adolescencia lo cual complejiza las etapas del desarrollo responsable y sus decisiones vitales.

En síntesis, el desarrollo de conductas de riesgo, aunque sus efectos pueden ser mitigados por la presencia de vínculos protectores, la adolescencia es la etapa por una construcción identitaria, se ve influenciada tanto por la calidad de los vínculos familiares como también por las representaciones culturales del consumo, la presión del grupo de pares y las condiciones de vida.

Limitaciones y fortalezas

Una de las principales limitaciones del presente estudio fue la imposibilidad de acceder a la totalidad de artículos científicos, debido a restricciones económicas asociadas al pago por acceso, lo cual limitó la ampliación del criterio de búsqueda y la inclusión de un mayor número de fuentes. Asimismo, el análisis se restringió al uso de solo cuatro bases de datos (Scopus, Web of science, PubMed y Scielo), lo que pudo haber reducido la diversidad geográfica de los hallazgos. En cuanto a las fortalezas las integran los estudios revisados y en la consistencia de sus hallazgos, los cuales

abordaron la influencia del entorno familiar en el consumo de alcohol en adolescentes, dichos artículos que fueron herramientas para profundizar el tema y así aportar a la literatura científica.

Conclusión

Los hallazgos de los estudios analizados revelaron que el entorno familiar constituye un factor determinante en el inicio y mantenimiento del consumo de alcohol en adolescentes latinoamericanos, evidencian que los hogares con dinámicas disfuncionales y con antecedentes de alcoholismo en el núcleo familiar elevan considerablemente el riesgo de consumo temprano. Esta relación evidencia que el consumo de alcohol puede entenderse no como conducta aislada, sino como un hecho real del resultado de una red compleja de factores relacionales, sociales y socioculturales que interactúan en contextos diversos y que requieren ser comprendidos desde una mirada integral, identificar el entorno familiar permite entender dichos comportamientos en esta población de investigación, por lo que a futuras intervenciones se considere el contexto familiar en la prevención del consumo en adolescentes.

Recomendaciones

Se recomienda recabar información de padres, madres y/o tutores sobre sus percepciones respecto al consumo de alcohol en adolescentes, desde una perspectiva sociocultural y de salud pública, con el fin de diseñar intervenciones psicológicas integrales que brinden apoyo emocional y social desde las instituciones gubernamentales, dichas intervenciones deben estar adaptadas al contexto sociocultural, considerando tanto la estructura como la dinámica familiar. Además, se sugiere gestionar una inversión pública destinadas a futuras investigaciones que

incorporen análisis longitudinales, a fin de determinar si las diferencias identificadas persisten durante la adolescencia y la adultez temprana. Esto permitirá desarrollar planes de acción oportunos, basados en evidencia científica, que respondan de manera temprana a las necesidades emergentes de esta población.

Referencias

- American Academy of Child e Adolescent Psychiatry [AACAP]. (2025). *Los Hijos de Alcohólicos*. https://www.aacap.org/aacap/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Spanish/Los-Hijos-de-Alcoholicos-017.aspx
- Boudesseul J. (2022). *Frecuencia e intensidad del consumo excesivo de alcohol en el mundo: Análisis de series temporales a través de la teoría de la historia de la vida y del consumo riesgoso de alcohol*. Sistema de Gestión de la Información sobre la Investigación (CRIS Ulima). <https://cris.ulima.edu.pe/es/projects/frecuencia-e-intensidad-del-consumo-excesivo-de-alcohol-en-el-mundo>
- Cabanillas, R. y Rojas, W. (2021). Consumo de alcohol y género en la población adolescente escolarizada del Perú: Evolución y retos de intervención. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 37(1), 148-154. <https://doi.org/10.17843/rpmesp.2020.371.5151>
- Cusihuamán, M., Vert-Gossen, V., Medina, J., Ávalos, D., Ferreira, M., & Díaz, C. (2018). La disfunción familiar y su repercusión en el adolescente. Barrio Rosa Mística—Paraguay, 2012. *Memorias del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud*, 16(3), 22-29. [https://doi.org/10.18004/mem.iics/1812-9528/2018.016\(03\)22-029](https://doi.org/10.18004/mem.iics/1812-9528/2018.016(03)22-029)

- Florenzano, R., Echeverría, Á., Sieverson, C., Barr, M., & Fernández, M. (2019). Daño a niños y sus familias por el consumo de alcohol: Resultados de una encuesta poblacional. *Revista chilena de pediatría*, 87(3), 162-168. <https://doi.org/10.1016/j.rchipe.2015.06.020>
- Kadis, L., Malca-villa, M., Mcniel, D., & McClendon, R. (1990). Alcoholism and the family in peru: The impact of an alcoholic on teenagers' perceptions of the family. *The American Journal of Family Therapy*, 18(4), 345-354. <https://doi.org/10.1080/01926189008250983>
- Karapas, K., Comino, P., & Yárnoz-Yaben, S. (2023). Divorcio parental, apego a los padres y satisfacción con la vida en adolescentes chilenos: Un estudio comparativo. *Terapia Psicológica*, 41(3), Article 3.
- Lema, S., & Varela, M. (2021). Influencia familiar y social en el consumo de alcohol en jóvenes universitarios. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, 29(3), 264-271.
- Mejía, J., & Trujillo, S. (2021). Distintas familias, distintos consumos: Relación de las dinámicas familiares con el consumo de alcohol en adolescentes en Colombia. *Hallazgos*, 14(28), 63-82. <https://doi.org/10.15332/s1794-3841.2017.0028.03>
- Molina, S., y Helfer J. (2022). Factores asociados al consumo de alcohol en adolescentes residentes en Lima, Perú. *Revista Habanera de Ciencias Médicas*, 21(3), Article 3.
- Natera, G., Borges, G., Medina. E., Solís, L., & Tiburcio, M. (2021). La influencia de la historia familiar de consumo de alcohol en hombres y mujeres. *Salud Pública de México*, 43(1), 17-26. <https://doi.org/10.1590/S0036-36342001000100003>
- Obradors, N., Ariza, C., & Muntaner, C. (2014). Consumo de riesgo de alcohol y factores asociados en adolescentes de 15 a 16 años de la Cataluña Central:

Diferencias entre ámbito rural y urbano. *Gaceta Sanitaria*, 28(5), 381-385.

<https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2014.04.004>

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2024).

<https://www.paho.org/es/temas/alcohol>

Pizarro, K., Bustamante, I., & Surkan, P. (2017). Family Factors and Adolescent Problem Drinking in a High-Risk Urban Peruvian Neighborhood. *Substance Use & Misuse*, 52(2), 194-202. <https://doi.org/10.1080/10826084.2016.1223137>

Pons, J. (2022). El modelado familiar y el papel educativo de los padres en la etiología del consumo de alcohol en los adolescentes. *Revista Española de Salud Pública*, 72(3), 251-266.

Rodríguez, M., Danet, A., Ruiz, A., García, N., & Ruiz, P. (2021). Posicionamiento de padres y madres ante el consumo de alcohol en población de 12 a 17 años en el ámbito urbano de seis Comunidades Autónomas. *Gaceta Sanitaria*, 24(1), 53-58.

Rosabal, E., Sánchez, Y., Rosabal, R., & Osorio, G. (2021). Factores de riesgo y consumo de alcohol en adolescentes. *MULTIMED*, 20(2), Article 2.

Ruiz, M., & Andrade, D. (2019). La familia y los factores de riesgo relacionados con el consumo de alcohol y tabaco en los niños y adolescentes (Guayaquil-Ecuador). *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 13, 813-818. <https://doi.org/10.1590/S0104-11692005000700008>

Sorabilla, G., & Goñi, J. (2020). Comportamientos de riesgo y dimensiones personalidad en adolescencia. *Terapia Psicológica*, 38(3), Article 3. <https://doi.org/10.4067/S0718-48082020000300383>

Sukhera, J. (2022). Narrative Reviews: Flexible, Rigorous, and Practical. *Journal of Graduate Medical Education*, 14(4), 414-417. <https://doi.org/10.4300/JGME-D-22-00480.1>

Telumbre, A., & López, R. (2020). Historia familiar y consumo de alcohol en adolescentes. *Revista Salud Uninorte*, 35(1), 72-83.

Villarreal, M., Sánchez, J., Musitu, G., & Varela, R. (2020). El Consumo de Alcohol en Adolescentes Escolarizados: Propuesta de un Modelo Sociocomunitario. *Psychosocial Intervention*, 19(3), 253-264.

ANEXOS

Se plantea la estrategia de búsqueda

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA AJUSTADA POR CAMPOS Y USO DEL OPERADOR BOOLEANO "OR"		
		Descriptor
P= Población	ADOLESCENTES	"adolescents" OR "teenagers" OR "teens" OR "youth" OR "youngsters" OR "adolescent population" OR "young people" OR "adolescent generation" OR "young generation" OR "high school students" OR "high school student"
O= Outcome	V1. DISFUNCIÓN FAMILIAR	"Family influence" OR "Family abandonment" OR "Parental separation" OR "family dysfunction" OR "dysfunctional family" OR family OR parents OR father OR mother OR relatives OR "dysfunctional household" OR "family conflict" OR "family dysfunctionality" OR "dysfunctional family behaviors" OR "chaotic family environment" OR "toxic family relationships"
	V2. CONSUMO DE ALCOHOL	"problematic alcohol use" OR "alcohol misuse" OR "alcohol abuse" OR "alcohol dependence" OR "alcohol addiction" OR "alcoholism" OR "Alcohol use" OR "binge drinking" OR "heavy drinking" OR "excessive alcohol consumption" OR "alcohol use disorder" OR "alcohol-related problems"
E= Espacial	E= ESPACIAL	"Peruvian" OR "Peruvians" OR "latin america"

TITLE-ABS-KEY(adolescents OR teenagers OR teenager OR teens OR youth OR youngsters OR "adolescent population" OR "young people" OR "adolescent generation" OR "young generation" OR "high school students" OR "high school student") **AND TITLE-ABS-KEY**("Family influence" OR "Family abandonment" OR "Parental separation" OR "family dysfunction" OR "dysfunctional family" OR family OR parents OR father OR mother OR relatives OR "dysfunctional household" OR "family conflict" OR "family dysfunctionality" OR "dysfunctional family behaviors" OR "chaotic family environment" OR "toxic family relationships") **AND TITLE-ABS-KEY**("problematic alcohol use" OR "alcohol misuse" OR "alcohol abuse" OR "alcohol dependence" OR "alcohol addiction" OR "alcoholism" OR "Alcohol use" OR "binge drinking" OR "heavy drinking" OR "excessive alcohol consumption" OR "alcohol use disorder" OR "alcohol-related problems" OR "alcohol-related harm" OR "hazardous alcohol use" OR "risky alcohol use" OR "unhealthy alcohol use" OR "alcohol use problems" OR "alcohol misuse behaviors" OR "alcohol addiction behaviors" OR "alcohol abuse behaviors" OR "alcohol dependency behaviors" OR "alcoholism behaviors" OR "alcohol-related disorders" OR "adolescent alcohol consumption" OR "adolescent alcohol abuse" OR "youth alcohol dependency" OR "teenage alcohol use disorder" OR "youth alcohol use disorder" OR "underage drinking" OR "underage alcoholism" OR "underage alcohol abuse") **AND TITLE-ABS-KEY**(peru OR peruvian "Peruvian" OR "Peruvians" OR "Latin America")


1. Uso de base de datos en Scopus

(TI=("adolescents" OR "teenagers" OR "teens" OR "youth" OR "youngsters" OR "adolescent population" OR "young people" OR "adolescent generation" OR AB=("adolescents" OR "teenagers" OR "teens" OR "youth" OR "youngsters" OR "adolescent population" OR "young people" OR "adolescent generation" OR AK=("adolescents" OR "teenagers" OR "teens" OR "youth" OR "youngsters" OR "adolescent population" OR "young people" OR "adolescent generation"))

(TI=("Family influence" OR "Family abandonment" OR "Parental separation" OR "family dysfunction" OR "dysfunctional family" OR family OR parents OR father OR mother OR relatives OR "dysfunctional household") OR AB=("Family influence" OR "Family abandonment" OR "Parental separation" OR "family dysfunction" OR "dysfunctional family" OR family OR parents OR father OR mother OR relatives OR "dysfunctional household") OR AK=("Family influence" OR "Family abandonment" OR "Parental separation" OR "family dysfunction" OR "dysfunctional family" OR family OR parents OR father OR mother OR relatives OR "dysfunctional household"))

(TI=("problematic alcohol use" OR "alcohol misuse" OR "alcohol abuse" OR "alcohol dependence" OR "alcohol addiction" OR "alcoholism" OR "Alcohol use" OR "binge drinking" OR "heavy drinking" OR "excessive alcohol consumption" OR "alcohol use disorder" OR AB=("problematic alcohol use" OR "alcohol misuse" OR "alcohol abuse" OR "alcohol dependence" OR "alcohol addiction" OR "alcoholism" OR "Alcohol use" OR "binge drinking" OR "heavy drinking" OR "excessive alcohol consumption" OR "alcohol use disorder" OR AK=("problematic alcohol use" OR "alcohol misuse" OR "alcohol abuse" OR "alcohol dependence" OR "alcohol addiction" OR "alcoholism" OR "Alcohol use" OR "binge drinking" OR "heavy drinking" OR "excessive alcohol consumption" OR "alcohol use disorder"))

(TI=(peru OR peruvian) OR AB=(peru OR peruvian) OR AK=(peru OR peruvian)



"alcoholism"[Mesh] OR "binge drinking"[Mesh] OR "alcohol-related disorders"[Mesh] OR "underage drinking"[Mesh] OR "alcohol misuse"[Mesh] OR "alcohol abuse"[Mesh] OR "alcohol dependence"[Mesh] OR "alcohol addiction"[Mesh] OR "alcohol use disorder"[Mesh] OR "alcohol-related problems"[Mesh] OR "hazardous alcohol use"[Mesh] OR "risky alcohol use"[Mesh] OR "unhealthy alcohol use"[Mesh] OR "adolescent alcohol consumption"[Mesh] OR "adolescent alcohol abuse"[Mesh] OR "youth alcohol dependency"[tiab] OR "alcohol misuse"[tiab] OR "alcohol abuse"[tiab] OR "alcohol dependence"[tiab] OR "alcohol addiction"[tiab] OR "alcohol dependency behaviors"[tiab] OR "alcoholism behaviors"[tiab] OR "alcohol-related disorders"[tiab] OR "adolescent alcohol consumption"[tiab] OR "adolescent alcohol abuse"[tiab] OR "youth alcohol dependency"[tiab]

"Family"[Mesh] OR "Parents"[Mesh] OR "Relatives"[Mesh] OR "Family influence"[tiab] OR "Parental separation"[tiab] OR "family dysfunction"[tiab] OR "dysfunctional family"[tiab] OR family[tiab] OR parents[tiab] OR relatives[tiab] OR "family conflict"[tiab] OR "family dysfunctionality"[tiab]


"adolescents"[tiab] OR "teenagers"[tiab] OR "teens"[tiab] OR "youth"[tiab] OR "youngsters"[tiab] OR "adolescent population"[tiab] OR "young people"[tiab] OR "adolescent generation"[tiab] OR "young generation"[tiab] OR "high school students"[tiab] OR "high school student"[tiab]

"Peru"[tiab] OR "Peruvian"[tiab] OR "Peruvians"[tiab]

3. Uso de base de datos en Pubmed

History and Search Details						Download	Delete
Search	Actions	Details	Query	Results	Time		
#5	...	>	Search: "Peru"[tiab] OR "Peruvian"[tiab] OR "Peruvians"[tiab] OR "Republic of Peru"[tiab] OR "Latin America"[tiab]	40,526	19:28:53		
#4	...	>	Search: "adolescents"[tiab] OR "teenagers"[tiab] OR "teens"[tiab] OR "youth"[tiab] OR "youngsters"[tiab] OR "adolescent population"[tiab] OR "young people"[tiab] OR "adolescent generation"[tiab] OR "young generation"[tiab] OR "high school students"[tiab] OR "high school student"[tiab].	365,708	19:28:17		
#3	...	>	Search: "Family"[Mesh] OR "Parents"[Mesh] OR "Father"[Mesh] OR "Mother"[Mesh] OR "Relatives"[Mesh] OR "Family influence"[tiab] OR "Family abandonment"[tiab] OR "Parental separation"[tiab] OR "family dysfunction"[tiab] OR "dysfunctional family"[tiab] OR family[tiab] OR parents[tiab] OR father[tiab] OR mother[tiab] OR relatives[tiab] OR "dysfunctional household"[tiab] OR "family conflict"[tiab] OR "family dysfunctionality"[tiab] OR "dysfunctional family behaviors"[tiab] OR "chaotic family environment"[tiab] OR "acute family relationships"[tiab]	1,513,281	19:27:09		

RESULTS BY YEAR



TEXT AVAILABILITY

- Abstract
- Free full text
- Full text

ARTICLE ATTRIBUTE



Quoted phrases not found in phrase index: "alcohol misuse", "alcohol abuse", "alcohol dependence", "alcohol addiction", "alcohol use disorder", "alcohol-related problems", "alcohol addiction behaviors", "alcohol dependency behaviors", "alcoholism behaviors", "youth alcohol dependency", "teenage alcohol use disorder", "youth alcohol use disorder", "underage alcoholism", "underage alcohol abuse", "Father", "Mother", "Relatives", "dysfunctional household", "dysfunctional family behaviors", "toxic family relationships", "Republic of Peru"

- Adolescents' Alcohol Use: Does the Type of Leisure Activity Matter? A Cross-National Study.**
 Cite: Albertos A, Koning I, Benítez E, De Irala J.
 Int J Environ Res Public Health. 2021 Oct 31;18(21):11477. doi: 10.3390/ijerph182111477.
 Share: PMID: 34769992 [Free PMC article.](#)
 Structured leisure activities, in general, did not have a significant predictive effect on alcohol consumption in any of the countries. **Family** leisure activities reduced the risk of engaging in yearly **alcohol use** and yearly **binge drinking** among ...

4. Uso de base de datos en Scielo



Todos los índices

Buscar

Añadir un campo +
Historico de búsqueda

Resultados: 51

#3 (adolescentes) Y (disfunción familiar)

Filtros

Filtrar

▼ Colección + OPCIONES

- Todos
- Colombia 14
- Cuba 9
- México 7

Ordenar por Publicacion - Más nuevos primero

Página 1 de 4

Seleccionar esta página | [Imprimir](#) | [Enviar por correo-e](#) | [Exportar](#) | [Compartir](#)

1. Factores de riesgo y protección para la ideación e intento suicida en adolescentes y jóvenes latinoamericanos: revisión sistemática. 🔒 📄 📱 📧 📊

Bello, Ladini Sunanda Hernández ; de la Hoz Restrepo, Fernando ; Paternina, Andrés Mauricio Ríos . 📄 📄

Psicología del Caribe Abr 2024, Volumen 41 N° 1 Páginas 1 -

Resumen: > ES > EN | Texto: ES EN | PDF: ES | PDF: ES

2. Relación entre trastornos alimentarios y familia e ideación suicida en adolescentes escolarizados de Bogotá 🔒 📄 📱 📧 📊

González-Quifones, Juan C. Morales-Méndez, Sandra P. Calderón-Gutiérrez, Sandra P. Espinosa-Tafur, Yudy M. Arias-Torres, Santiago J. Ortégón, Diana F. Cely Pinilla-Fonseca, Vanessa E. Pinzón, Jenny A.

Revista de Salud Pública Agosto de 2023, Volumen 25 N.º 4, elocation 97129

