

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

ESCUELA DE POSGRADO

Unidad de Posgrado de Psicología



**Producción científica sobre trastornos psicoafectivos en
mujeres víctimas de violencia sexual**

Trabajo Académico para obtener el Título de Segunda Especialidad Profesional
en Psicología Clínica y de la Salud

Autoras:

Katy Carolina Curo Campos

Nury Mango Rodriguez

Asesora:

Mg. Esther Edelmira Méndez Zavaleta de Añamuro

Lima, mayo 2026

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD DEL TRABAJO ACADÉMICO

Yo Esther Edelmira Méndez Zavaleta de Añamuro, docente de la Unidad de Posgrado de Psicología, Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Unión.

DECLARO:

Que la presente investigación titulada: “**Producción científica sobre trastornos psicoafectivos en mujeres víctimas de violencia sexual**” de los autores Katy Carolina Curo Campos y Nury Mango Rodriguez tiene un índice de similitud de 10% verificable en el informe del programa Turnitin, y fue realizada en la Universidad Peruana Unión bajo mi dirección.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponde ante cualquier falsedad u omisión de los documentos como de la información aportada, firmo la presente declaración en la ciudad de Lima, a los 25 días del mes de mayo del año 2026.



Mg. Esther Edelmira Méndez Zavaleta de Añamuro

Asesora

**Producción científica sobre trastornos psicoafectivos en mujeres
víctimas de violencia sexual**

TRABAJO ACADÉMICO

Presentado para optar el Título de Segunda Especialidad
Profesional en Psicología Clínica y de la Salud



Mtra. Sandra Vanessa Revelo Aulestia
Dictaminadora

Lima, 25 de mayo del 2026

Resumen

La alta prevalencia de violencia sexual y las consecuencias devastadoras que enfrentan las víctimas conllevan a la manifestación de diversos trastornos psicoafectivos y, en algunos casos, al desarrollo de enfermedades mentales que afectan su bienestar emocional. La presente investigación tuvo como objetivo identificar la producción científica sobre los trastornos psicoafectivos en mujeres víctimas de violencia sexual. Se trata de una revisión narrativa cuya búsqueda se realizó en tres bases de datos: SCOPUS, WEB OF SCIENCE y PUBMED, considerando estudios en inglés y español, utilizando los operadores booleanos OR, AND y AND NOT, con un periodo de búsqueda limitado a los últimos cinco años. Para ello, se empleó una estrategia de búsqueda desarrollada a partir de términos y descriptores relacionados con mujeres, violencia sexual y trastornos psicoafectivos; asimismo, los ajustadores de campo utilizados fueron título, resumen y palabras clave. Hasta septiembre de 2025, se identificaron 119 estudios; tras el proceso de revisión, se incluyeron 7 investigaciones, correspondientes a 2 estudios correlacionales, 3 descriptivos, 1 estudio de caso y 1 cualitativo. En conclusión, los estudios señalan que las mujeres víctimas de abuso sexual tienden a desarrollar trastornos psicoafectivos como depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático (TEPT); asimismo, pueden presentar trastornos psicóticos. Además, este problema se asocia positivamente con el abuso de sustancias psicoactivas y los trastornos de personalidad, afectando significativamente la calidad de vida y el bienestar de las víctimas.

Palabras claves: violencia sexual, trastornos psicoafectivos, mujeres víctimas

Abstract

The high prevalence of sexual violence and the devastating consequences for victims often lead to the development of various psycho-affective disorders, sometimes compounded by mental illness, thus impacting their emotional well-being. This research aimed to identify the scientific literature on psycho-affective disorders in women victims of sexual violence. It is a narrative review conducted in three databases: Scopus, Web of Science, and PubMed, considering studies in English and Spanish. The Boolean operators OR, AND, and AND NOT were used, limiting the search period to the last five years. A search strategy was developed using terms and descriptors for women, sexual violence, and psycho-affective disorders; the search criteria included title, abstract, and keywords. Up to September 2025, 119 studies were identified. After review, 7 studies were included in the study: 2 correlational, 3 descriptive, 1 case study, and 1 qualitative. In conclusion, studies indicate that women who are victims of sexual abuse tend to develop psycho-affective disorders such as depression, anxiety, and PTSD; they also develop psychotic disorders. Furthermore, this problem is positively associated with substance abuse and personality disorders, which significantly impacts the victims' quality of life and well-being.

Keywords: sexual violence, psycho-affective disorders, women victims

Introducción

De acuerdo a las estimaciones sobre la prevalencia de la violencia sexual a nivel mundial el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2024) señala que más de 370 millones de niñas y mujeres han sufrido abuso sexual durante su infancia. Esta cifra no contempla las formas de violencia sexual sin contacto físico, como el abuso verbal o el ejercido a través de medios de comunicación. Asimismo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) reportó cifras crecientes sobre la prevalencia de este fenómeno, indicando que más de 11 198 niños y adolescentes sufrieron violencia sexual, siendo las mujeres las principales víctimas; no obstante, este problema también afecta al sexo masculino, aunque en menor proporción (Guardamino, 2024).

La violencia sexual se define como cualquier conducta de carácter sexual ejercida mediante el uso de la fuerza o del poder, ya sea físico o psicológico, en contra de la voluntad de la víctima, independientemente de la relación existente entre el agresor y la víctima. Este tipo de violencia comprende desde la penetración, ya sea con partes del cuerpo u objetos, hasta tocamientos indebidos, insinuaciones sexuales o cualquier otra acción que vulnere la integridad y dignidad sexual de la persona (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2021).

La violencia sexual representa un problema de gran impacto social debido a las profundas secuelas que deja en las víctimas y a sus repercusiones en la salud pública. Al abordar este tema, es necesario otorgarle la debida importancia, puesto que constituye una experiencia traumática que implica consecuencias adversas en el bienestar emocional y en la calidad de vida de quienes la padecen (Caballero et al., 2022; Barrimi & Chlihane, 2023).

Además, diversos estudios han demostrado que el abuso sexual genera efectos devastadores en las víctimas, independientemente de la edad en la que ocurre el evento traumático, y que dichas consecuencias pueden prolongarse durante largos periodos de tiempo. Estas se relacionan con una serie de problemas psicosociales y trastornos mentales, tales como el trastorno de estrés postraumático (TEPT), baja autoestima, inseguridad, sentimientos de culpa, ideación suicida, distrés y conductas antisociales, entre otros (Real-Lopez, 2023; Caballero et al., 2022).

Por otro lado, los trastornos psicoafectivos son alteraciones cognitivas, emocionales y conductuales que interfieren en el bienestar de las personas. Entre ellos se incluyen la ansiedad, la depresión, la angustia, diversos trastornos mentales y las discapacidades sociales y funcionales (OMS, 2025).

Se evidencia que las consecuencias ocasionadas por este fenómeno son múltiples y afectan diversas áreas de la vida de las víctimas, independientemente de si el evento traumático ocurrió durante la infancia, la adolescencia o la adultez. Sin embargo, en el caso de las niñas y los adolescentes, los traumas suelen ser más persistentes, ya que en muchas ocasiones se prolongan hasta la edad adulta, etapa en la que comienzan a manifestarse problemas como ansiedad, depresión, abuso de sustancias, aislamiento social y dificultades para establecer relaciones saludables (UNICEF, 2024).

Rai et al. (2020) realizaron un estudio exploratorio sobre la salud mental y la violencia sexual en mujeres, obteniendo como resultado que casi la totalidad de las víctimas de violencia sexual evidenciaron graves alteraciones mentales, tales como ansiedad, trastorno de estrés agudo, obsesiones, trastornos del sueño, hostilidad, sentimientos de culpa, miedo y trastorno de estrés postraumático, entre otros.

Asimismo, Ferrel et al. (2020) desarrollaron una investigación con el propósito de identificar la relación entre los estilos de vida y el estrés postraumático en un grupo de mujeres desplazadas víctimas de abuso sexual. Los resultados mostraron que el 80 % de las mujeres bajo esta condición presentaron un nivel crónico de estrés postraumático.

Por otro lado, Hauw et al. (2020) realizaron una investigación con el objetivo de analizar la relación entre la violencia sexual y no sexual, la presencia de trastornos psiquiátricos y el uso de servicios de atención sanitaria. Los autores identificaron que la exposición a la violencia sexual se relaciona significativamente con trastornos psiquiátricos, como la depresión mayor, entre otros. Además, el 39,9 % de los participantes víctimas de violencia sexual presentaron una mayor probabilidad de recurrir a servicios sanitarios debido a problemas de salud mental.

Estos hallazgos ponen de relieve la necesidad de visibilizar esta problemática, con el fin de establecer y desarrollar estrategias y políticas orientadas a la protección de menores y al fortalecimiento de programas de prevención y atención integral en salud, priorizando la salud mental. Esto se debe a que las secuelas derivadas de la violencia sexual pueden interferir significativamente en la vida de las víctimas a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la finalidad de la presente investigación es identificar la producción científica sobre los trastornos psicoafectivos en mujeres víctimas de violencia sexual.

Metodología

El presente estudio corresponde a una revisión narrativa cuya finalidad es sintetizar e integrar los hallazgos científicos relacionados con los trastornos psicoafectivos en mujeres víctimas de violencia sexual, con el propósito de extraer conclusiones teóricas relevantes sobre la problemática abordada, considerando la diversidad de diseños metodológicos de las investigaciones incluidas (Siddaway et al., 2019).

La búsqueda de literatura científica se realizó en marzo de 2025 en tres bases de datos: PubMed, Scopus y Web of Science. Se consideraron estudios publicados en español e inglés durante los últimos cinco años. Para la estrategia de búsqueda se utilizaron operadores booleanos OR, AND y AND NOT, así como términos y descriptores relacionados con mujeres, violencia sexual y trastornos psicoafectivos. Asimismo, los ajustadores de campo empleados fueron título, resumen y palabras clave.

En total, se identificaron 21 estudios en Scopus, 46 en Web of Science y 52 en PubMed. Posteriormente, los registros fueron exportados a Microsoft Excel para su organización y revisión. Se incluyeron investigaciones publicadas en inglés o español, correspondientes a los últimos cinco años, que abordaran las variables de estudio como tema principal o secundario y cuya población estuviera conformada por mujeres. Del mismo modo, se consideraron únicamente artículos de acceso abierto.

Se excluyeron investigaciones fuera del periodo establecido, estudios que no abordaban directamente las variables de interés y artículos con acceso restringido mediante pago. Asimismo, se descartaron documentos duplicados y aquellos que no presentaban relación significativa con el objetivo de la investigación.

La selección de los estudios fue realizada de manera independiente por ambas investigadoras. Durante el proceso de revisión se empleó la estrategia del “semáforo”,

considerando criterios de inclusión y exclusión relacionados con la población de estudio, el periodo de publicación, la calidad metodológica y la pertinencia temática. Como resultado final, se seleccionaron siete artículos científicos para el análisis. Todo el proceso de selección se resume en el diagrama de flujo correspondiente.




Figura 1. *Diagrama de flujo del proceso de selección de estudio*

Resultados

Hasta septiembre de 2025 se identificaron 119 estudios relacionados con la temática investigada. Tras el proceso de revisión y aplicación de los criterios de selección, se incluyeron siete investigaciones en el análisis final: dos estudios correlacionales, tres descriptivos, un estudio de caso y un estudio cualitativo.

Los resultados fueron organizados en una tabla que considera el autor y año de publicación, diseño metodológico, objetivo de la investigación, instrumentos utilizados, población estudiada y principales hallazgos. Los estudios seleccionados tuvieron como objetivo central analizar la prevalencia de trastornos psicoafectivos en mujeres víctimas de violencia sexual.

Los hallazgos evidencian que las experiencias traumáticas, especialmente aquellas relacionadas con violencia o abuso sexual, se asocian significativamente con el desarrollo de trastornos psicoafectivos como depresión, ansiedad, trastorno de pánico, trastorno de estrés postraumático (TEPT) y trastorno disfórico premenstrual. Estas alteraciones afectan negativamente la calidad de vida y el bienestar emocional de las víctimas. Asimismo, algunos estudios reportaron una mayor prevalencia de trastorno bipolar en mujeres con antecedentes de abuso sexual (Chu et al., 2025; Younes et al., 2022; Mannell et al., 2022; Amorim et al., 2023; Casanovas et al., 2020; Poreddi et al., 2021).

De igual forma, los resultados muestran que las experiencias de abuso sexual influyen directamente en la aparición de trastornos psicóticos, como esquizofrenia y psicosis (Poreddi et al., 2021).

Por otro lado, se identificó una relación significativa entre violencia sexual y consumo de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, tabaco y cannabis, utilizadas frecuentemente como mecanismos para afrontar el malestar emocional derivado del trauma (Barrimi y Chlihane, 2023; Mannell et al., 2022).

Asimismo, la evidencia indica que el abuso sexual no solo genera consecuencias emocionales y psiquiátricas, sino que también afecta el desarrollo de la personalidad, pudiendo desencadenar trastorno límite de la personalidad (Barrimi y Chlihane, 2023).

Tabla 1

Tabla de resultados

Autor y año	Objetivo	Diseño	Instrumentos	Población	Resultados
Chu et al (2025)	identificar la posible relación causal entre los EVE	Correlacional	Regresión logística para evaluar el impacto	5561 pacientes mujeres con	El estudio demuestra que los eventos traumáticos con la violación afectaron indirectamente el número de episodios

	(experiencias vitales estresantes), el neuroticismo y la recurrencia de la depresión.		de los LES en la aparición de depresión. Muestreo Bootstrap y el número de episodios depresivos.	trastorno depresivo mayor TDM recurrente (de 30 a 60 años)	depresivos. las mismas que fueron significativas en el desarrollo de la depresión.
Barrimi y Chlihane (2023)	Evaluar el impacto del abuso sexual infantil en la conducta suicida en una población de mujeres marroquíes con trastornos psiquiátricos graves.	Descriptivo	Entrevista clínica con los pacientes y los familiares disponibles, y del historial médico del paciente. La entrevista clínica fue realizada por un residente de psiquiatría.	Se incluyeron 400 mujeres con trastornos psiquiátricos.	El número de intentos de suicidio a lo largo de la vida fue significativamente mayor en pacientes abusadas sexualmente. El abuso sexual infantil (ASI) influye significativamente en la conducta suicida en mujeres con trastornos psiquiátricos graves; trastorno límite de la personalidad ($p = 0,0034$) y entre aquellos que consumen tabaco (28% vs. 8,5%, $p = 0,00007$), cannabis (38,5% vs. 4%, $p = 0,00018$) y alcohol (45,5% vs. 4%, $p = 0,00007$).
Younes et al (2022)	Examinar los efectos del maltrato infantil y los acontecimientos estresantes de la vida actual en el trastorno disfórico premenstrual (TDPM),	Descriptivo	Encuesta en línea autoadministrada mediante un método de bola de nieve. La herramienta de detección de síntomas premenstruales (PSST).	Estudiantes libaneses de todas las universidades nacionales del Líbano mayores de 18 años.	Los eventos de mayor estrés de la vida, el abuso físico, sexual y psicológico se asociaron significativamente con mayor depresión. Además, un mayor abuso sexual y psicológico y una mayor depresión se asociaron significativamente con un mayor TDPM. Las relaciones indirectas entre el abuso psicológico/abuso sexual, la depresión y el TDPM mostraron que la depresión mediaba la asociación entre el abuso psicológico y sexual y el TDPM.
Mannell et al (2022)	Investigar las asociaciones y las posibles vías entre la exposición de las mujeres a eventos traumáticos a lo largo de su vida y sus experiencias recientes de violencia de pareja (IPV).	Correlacional	IPV se evaluó mediante encuesta multipaís de la OMS. para las experiencias traumáticas se generó. Escala de Depresión (CES-D). Consumo de Alcohol (AUDIT)	677 mujeres, residentes en asentamientos informales, de entre 18 y 30 años de edad.	El modelo sugiere que experimentar eventos traumáticos, y en particular la violación fuera de la pareja, tiene efectos negativos en la salud mental de las mujeres como el (trastorno de estrés postraumático) TEPT, la depresión y el consumo nocivo del alcohol, lo cual puede aumentar su vulnerabilidad a la violencia de pareja.
Amorim et al (2023)	Evaluar las repercusiones de cada forma de abuso en la vida de una mujer de 60 años, dándole voz a la víctima de abuso infantil mediante la investigación y el análisis complejo de su historia de vida y relaciones familiares.	Estudio de caso	Entrevistas, observación, historia de vida, pruebas psicológicas	Mujer de 60 años que, durante su infancia y adolescencia, fue víctima de una serie de abusos (negligencia, castigo físico, abuso emocional y sexual, y abandono).	Los resultados demuestran que María presenta, cambios de humor y la prevalencia de un estado depresivo, característico de un trastorno bipolar, expresado como estado de ánimo deprimido, disminución del interés por la vida y las actividades placenteras, fatiga, insomnio, sentimientos de culpa e inutilidad, ideación suicida y gran angustia, asociada a la hipomanía, expresada como una preocupación excesiva por su salud y en las diferentes áreas de su actividad profesional. Sumado a esto, presenta antecedentes de relaciones abusivas, que evidencian violencia física, psicológica y sexual.

Casanova et al (2020)	Evaluar los síntomas somáticos en jóvenes tras una agresión sexual y documentar su relación con las características de la agresión, la psicopatología y el deterioro funcional asociado	Descriptivo	Información demográfica, entrevistas	94 mujeres adolescentes	Los sujetos con síntomas somáticos en el seguimiento presentaron tasas significativamente más altas de trastornos psiquiátricos, especialmente trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico y trastornos depresivos mayores, así como un funcionamiento psicosocial más bajo, que aquellos sin síntomas somáticos.
Poreddi et al (2021)	Explorar las experiencias de violencia de las mujeres y su opinión sobre la detección sistemática de la violencia doméstica por parte de profesionales de enfermería	Cualitativo	Este estudio utilizó una guía de entrevista modificada (11 preguntas semiestructuradas) desarrollada inicialmente por Rose et al. (2011)	20 mujeres asintomáticas con enfermedades mentales en un centro de atención terciaria en Bangalore, India.	Los hallazgos muestran claramente que la violencia física, psicológica y sexual está relacionada con las enfermedades mentales como depresión, esquizofrenia y psicosis. Asimismo, se refleja como los hombres se aprovechan de la desprotección de la mujer.

Discusión

El presente estudio tuvo como objetivo identificar en la producción científica relacionada con los trastornos psicoafectivos en mujeres víctimas de violencia sexual. Los resultados evidencian que las experiencias de violencia y abuso sexual se asocian con múltiples alteraciones psicológicas y emocionales, entre las que destacan la depresión, ansiedad, trastorno de pánico, trastorno de estrés postraumático (TEPT), trastorno disfórico premenstrual y trastorno bipolar.

En ese sentido, Real-López et al. (2023) encontraron que el TEPT constituye una de las consecuencias más frecuentes del abuso sexual infantil, con una prevalencia del 73,2 % entre las sobrevivientes. De manera similar, Yigzaw et al. (2023) reportaron que el 84,4 % de las víctimas de violencia presentaban TEPT, seguido de trastorno depresivo mayor y trastorno de adaptación. Asimismo, Bailey et al. (2025) identificaron asociaciones significativas entre la acumulación de experiencias traumáticas y el desarrollo de trastornos de ansiedad, señalando que el trauma infantil incrementa el riesgo de alteraciones conductuales y emocionales.

Estos hallazgos coinciden con Caballero et al. (2022), quienes sostienen que el abuso sexual suele desencadenar estrés postraumático, depresión y riesgo suicida. Además, Yang et al. (2022) determinaron que las experiencias adversas en la infancia se relacionan positivamente con el trastorno disfórico premenstrual, especialmente cuando existe antecedente de abuso sexual, abandono emocional o violencia familiar.

Por otra parte, los resultados muestran que las experiencias de abuso sexual influyen directamente en la aparición de trastornos psicóticos, como esquizofrenia y psicosis. En concordancia, Álvarez et al. (2023) reportaron una alta prevalencia de antecedentes de abuso sexual infantil en pacientes diagnosticadas con trastornos del espectro esquizofrénico. De manera similar, Charry et al. (2022) evidenciaron que la historia de abuso sexual genera deterioro neuronal asociado con trastornos del espectro esquizofrénico y bipolar.

Asimismo, Stanton et al (2020) y Herrero et al (2025) identificaron una relación significativa entre trauma infantil y síntomas psicóticos, señalando que el número de eventos traumáticos influye en la gravedad de los síntomas afectivos y funcionales.

En relación, con el consumo de sustancias psicoactivas, los estudios revisados evidencian que las víctimas de violencia sexual presentan mayor probabilidad de consumir alcohol, tabaco y cannabis como mecanismos de afrontamiento emocional. Martínez-Mota et al. (2020) señalaron que las personas con antecedentes de violencia sexual infantil presentan mayor riesgo de consumo problemático de cannabis durante la adolescencia. Del mismo modo, Franco-Jaén et al. (2020) identificaron una relación significativa entre violencia sexual infantil y conductas adictivas en la adultez.

Finalmente, los resultados muestran que el abuso sexual impacta negativamente en el desarrollo de la personalidad, pudiendo favorecer la aparición del trastorno límite de la personalidad. Pérez-Rivera et al. (2021) identificaron el abuso sexual como un importante factor de riesgo para el desarrollo de este trastorno, especialmente cuando las experiencias traumáticas son persistentes.

Limitaciones

La presente revisión narrativa presenta algunas limitaciones que deben considerarse al interpretar los hallazgos. En primer lugar, la búsqueda se restringió a estudios publicados en inglés y español, lo cual pudo limitar la inclusión de investigaciones relevantes en otros idiomas. Asimismo, la falta de acceso libre a determinados artículos científicos dificultó profundizar algunos aspectos relacionados con la temática.

Por otro lado, la diversidad metodológica de los estudios incluidos y la heterogeneidad de los instrumentos empleados dificultan la comparación directa entre resultados. Estas limitaciones pueden afectar la generalización de los hallazgos obtenidos.

Conclusiones

La revisión de la literatura científica actual evidencia una relación significativa entre la violencia sexual y el desarrollo de trastornos psicoafectivos en mujeres. Los estudios analizados coinciden en que las alteraciones más frecuentes son la depresión, ansiedad y el trastorno de estrés postraumático (TEPT), los cuales pueden persistir a largo plazo y afectar considerablemente la calidad de vida de las víctimas.

Asimismo, se identificó la presencia de trastornos psicóticos, como esquizofrenia y psicosis, especialmente en mujeres que experimentaron violencia sexual desde etapas tempranas y de forma recurrente. Del mismo modo, la violencia sexual se relaciona con el consumo de sustancias psicoactivas y con trastornos de personalidad, particularmente el trastorno límite de la personalidad.

En síntesis, la evidencia científica demuestra que la violencia sexual constituye un problema de salud pública y de salud mental de alto impacto, debido a las graves secuelas emocionales, psicológicas y sociales que genera en las víctimas.

Recomendaciones

Se recomienda desarrollar e implementar estrategias integrales orientadas a la prevención de la violencia sexual y a la atención oportuna de las víctimas, con el fin de evitar procesos de revictimización y reducir las secuelas psicológicas asociadas al trauma.

Asimismo, resulta fundamental incorporar evaluaciones rutinarias y tamizajes relacionados con antecedentes de violencia sexual y trauma infantil en pacientes que presenten síntomas de depresión, ansiedad o trastorno de estrés postraumático, independientemente de la edad.

Finalmente, se recomienda fortalecer el acceso a servicios de salud mental y terapias psicológicas especializadas, garantizando una atención integral, humanizada y centrada en el trauma para las mujeres víctimas de violencia sexual.

Referencias

- Alekhin, A. & Isagulova E. (2022). El maltrato en la infancia como condición previa para el desarrollo del trastorno límite de la personalidad en la adolescencia. *Interacción y Perspectiva. Revista de trabajo social*. 12(2). [DOI:10.5281/zenodo.7114636](https://doi.org/10.5281/zenodo.7114636)
- Álvarez, M. J., Masramón, H., Foguet-Boreu, Q., Roura-Poch, P., & Vázquez, A. (2023). Trauma infantil en esquizofrenia. Implicaciones en los síntomas psicóticos positivos y negativos. *Psicosomàtica y Psiquiatria*, (24) <https://doi.org/10.34810/PsicosomPsiquiatnum240401>
- Amorim-Gaudêncio, C., Mendes, G., & Silveira, L. (2023). Psychosocial Traumatic Environments: A Clinical Case of Childhood Abuse. *Sexes*, 4(3), 402–410. <https://doi.org/10.3390/sexes4030026>
- Bailey, M., Fairchild, G., Hammerton, G., Bauer, A., Carpena, M., Murray, J., Santos, I. S., Barros, A., Tovo-Rodrigues, L., Danese, A., Halligan, S., & Matijasevich, A. (2025). Associations between childhood trauma and adolescent psychiatric disorders in Brazil: a longitudinal, population-based birth cohort study. *The Lancet. Global health*, 13(2), e309–e318. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(24\)00452-2](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(24)00452-2)
- Barrimi, M., & Chlihane, R. (2023). Impact of child sexual abuse on suicidal behavior in a population of Moroccan women with severe psychiatric disorders: Impact des abus sexuels à l'enfance sur les comportements suicidaires chez une population de femmes marocaines atteintes de troubles psy. *European Journal of Trauma and Dissociation*, 7(4), 100346. <https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2023.100346>
- Caballero-Domínguez, Carmen Cecilia, Espitia-Correa, Joseph Luciano, & Campo-Arias, Adalberto. (2022). Asociación entre abuso sexual y distrés psicológico en adolescentes escolarizados de Santa Marta, Colombia. *Psicología desde el Caribe*, 39(2), 116-137. Epub November 23, 2022. <https://doi.org/10.14482/psdc.39.2.371.786>
- Casanovas, M., Kramer, T., Clarke, V., Goddard, A., Elena, G., & Khadr, S. (2022). Somatic symptoms following sexual assault in adolescents: a prospective

longitudinal study. *Psychology, Health and Medicine*, 27(3), 546–558.
<https://doi.org/10.1080/13548506.2021.1874437>

Charry-Lozano, Liliana, Pinzón-Fernández, Maria Virginia, Muñoz-Otero, Daniel Felipe, Becerra-González, Nathalia, Montero-Molina, Diana Sofia, & Luna-Samboni, Daniel Steven. (2022). Consecuencias neurobiológicas del abuso sexual en la infancia: revisión de literatura. *Entramado*, 18(2), e219. Epub October 16, 2022. <https://doi.org/10.18041/1900-3803/entramado.2.7808>

Chu, F., Wang, C., Tao, S., Gao, J., Zhu, X., Tao, D., Chen, B., & Tao, M. (2025). Stressful Life Events and Neuroticism among Chinese Women with Recurrent Major Depressive Disorder. *Actas Españolas de Psiquiatría*, 53(2), 348. <https://doi.org/10.62641/AEP.V53I2.1730>

Franco-Jaen, S., Rodríguez G., José M., & del Río, F. (2020). El abuso sexual infantil y la relación con el desarrollo de comportamientos adictivos. Una revisión sistemática. *Terapia psicológica*, 38(3), 317-338. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-48082020000300317>

Ferrel, F., Ferrel, B., Cañas-Herazo, C., Barros, H., Yañez, C. (2020). Estilo de vida y estrés postraumático en mujeres desplazadas víctimas de abuso sexual en Santa Marta, Colombia. *Revista Cubana Salud Pública* 46 (1) 29 Jun 2020 Jan-Mar 2020. <https://www.scielosp.org/article/rcsp/2020.v46n1/e1363/es/?fbclid=IwAR3xnydP3OZVX0sr#>

Guardamino, L. (24 de agosto de 2024) Violencia sexual en el Perú: más de 11 mil niñas y adolescentes han sido víctimas de abuso a lo largo del 2024. *Infobae*. <https://www.infobae.com/peru/2024/08/24/violencia-sexual-en-el-peru-mas-de-11-mil-ninas-y-adolescentes-han-sido-victimas-de-abuso-a-lo-largo-del-2024/>

Herrero, M., Imaz, C., Avellón, M., & Molina, L. (2025). Las alucinosis entre la neurosis y la psicosis, a propósito de un caso. *Revista De Psiquiatría Infanto-Juvenil*, 42(3), 24–39. <https://doi.org/10.31766/revpsij.v42n3a4>

Hauw, E., Revranche, M., Kovess-Masfety, V., Husky, M. (2020). Sexual and Nonsexual Interpersonal Violence, Psychiatric Disorders, and Mental Health Service Use.

published by the international society for traumatic stress studies pag. 271-471.
<https://doi.org/10.1002/jts.22638>

- Mannell, J., Minckas, N., Burgess, R., Chirwa, E., Jewkes, R., & Gibbs, A. (2022). Does experiencing a traumatic life event increase the risk of intimate partner violence for young women? A cross-sectional analysis and structural equation model of data from the Stepping Stones and Creating Futures intervention in South Africa. *BMJ Open*, 12(4), e051969. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-051969>
- Martínez-Mota, L., Jiménez-Rubio, G., Hernández-Hernández O & Páez-Martínez, N. (2020) Tipos de violencia en la infancia que inciden en el abuso y dependencia de cannabis entre adolescentes: una revisión sistemática y metaanálisis. *Adicciones*, vol. 32(1) 63-76. <https://doi.org/10.20882/adicciones.1050>
- Organización Mundial de la Salud (OMS) 08 de marzo de 2021. *Violencia contra la mujer*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>
- Organización Mundial de la Salud (OMS) 25 de septiembre de 2025. trastornos mentales. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders>
- Pérez-Rivera, J., Pimentel-García, A., Hernández Díaz, L., Martínez-Arce, M., Guzmán-Díaz, G., & Cisneros - Herrera, J. (2021). Trastorno límite de la personalidad y el abuso sexual infantil. *Boletín Científico De La Escuela Superior Atotonilco De Tula*, 8(15), 37–40. <https://doi.org/10.29057/esat.v8i15.6674>
- Poreddi, V., Sai, S., Gandhi, S., Marimuthu, P., & BadaMath, S. (2021). “Unheard voices”: Perceptions of women with mental illness on nurses screening routinely for domestic violence: A qualitative analysis. *Investigacion y Educacion En Enfermeria*, 39(3), e03. <https://doi.org/10.17533/udea.iee.v39n3e03>
- Real-López, M., Peraire, M., Ramos-Vidal, C., Llorca, G., Julián, M., & Pereda, N. (2023). Abuso sexual infantil y consecuencias psicopatológicas en la vida adulta. *Revista De Psiquiatría Infanto-Juvenil*, 40(1), 13–30. <https://doi.org/10.31766/revpsij.v40n1a3>
- Rashmi, R. & Ambarish, R. (2020) Sexual violence and poor mental health of women: An exploratory study of Uttar Pradesh, India. *Clinical Epidemiology and Global*

Health Volume 8, Issue 1, March 2020, Pages 194-198
<https://doi.org/10.1016/j.cegh.2019.06.013>

- Santillán, M., Tatamués, J., & Quiroz del Pozo, N. (2024). El Impacto del consumo del alcohol en la vulnerabilidad al abuso sexual en adolescentes, una revisión sistemática.: The Impact of alcohol consumption on vulnerability to sexual Abuse in Adolescents: a systematic review. *Revista Científica Multidisciplinar G-Nerando*, 5(1), 1181–1204. <https://doi.org/10.60100/rcmq.v5i1.251>
- Siddaway, A., Wood, A., & Hedges, L. (2019). How to Do a Systematic Review: A Best Practice Guide for Conducting and Reporting Narrative Reviews, Meta-Analyses, and Meta-Syntheses. *Annual Review of Psychology* (Vol. 70, pp. 747–770). *Annu Rev Psychol*. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010418-102803>
- Stanton, K., Denietolis, B., Goodwin, B., Dvir, G. (2020). Childhood Trauma and Psychosis: An Updated Review, *Child and Adolescent Psychiatric Clinics*, Volume 29, Issue 1, 2020, Pages 115-129, ISSN 1056-4993, ISBN 9780323711197, <https://doi.org/10.1016/j.chc.2019.08.004>
- Tuya, G. (2023). Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes en Lima, Perú: una aproximación general a los patrones de personalidad, características sociodemográficas y el riesgo de violencia de los perpetradores. *Revista Criminalidad*, 65(1), 151-169. Epub June 19, 2023. <https://doi.org/10.47741/17943108.407>
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (10 de octubre 2024) *Más de 370 millones de niñas y mujeres en todo el mundo se ven sometidas a violaciones y abusos sexuales en la infancia*. <https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/mas-370-millones-ninas-mujeres-mundo-sometidas-violaciones-abusos-sexuales-infancia>
- Yang, Q., Þórðardóttir, E., Hauksdóttir, A., Aspelund, T., Jakobsdóttir, J., Halldorsdottir T., Tomasson, T., Rúnarsdótti, H., Björk, H., Bertone, E., Sjolander A., Colmillo, C., Lu., D & Anna, U. (2022) Association between adverse childhood experiences and premenstrual disorders: a cross-sectional analysis of 11,973 women. *BMC Med* 20, 60. <https://doi.org/10.1186/s12916-022-02275-7>

- Yigzaw, N., Hailu, T., Melesse, M., Desalegn, A., Ezezew, H., Chanie, T., Nenko, G., Tesfahun, M., Sendek, S., & Tinsae, S. (2023). Comprehensive mental health and psychosocial support for war survivors at Chenna Kebele, Dabat woreda, North Gondar, Ethiopia. *BMC psychiatry*, 23(1), 172. <https://doi.org/10.1186/s12888-023-04653-8>
- Younes, Y., Hallit, S., & Obeid, S. (2021). Premenstrual dysphoric disorder and childhood maltreatment, adulthood stressful life events and depression among Lebanese university students: a structural equation modeling approach. *BMC Psychiatry*, 21(1). <https://doi.org/10.1186/s12888-021-03567-7>

Anexo A

Tabla de descriptores

P	I	O
Mujeres	“Violencia sexual”	“Trastornos psicoafectivos”
mujeres chicas fémimas	“Violencia Sexual” Violación “Abuso Sexual” “Agresión Sexual” “Atentado contra el Pudor” “Crímenes Sexuales” “Ofensas Sexuales” “Explotación sexual” “Maltrato sexual”	“Trastornos psicoafectivos” “Enfermedad Mental” “Trastorno del Comportamiento” “Trastornos Psiquiátricos” “Trastornos de ansiedad” “Trastornos del estado de ánimo” “Trastorno depresivo mayor” “Trastorno bipolar” “Trastorno depresivo persistente” Distimia “Trastorno afectivo estacional” “Trastorno disfórico” “Trastornos emocionales”
women girls females	“Sexual Violence” Rape “Sexual Abuse” “Sexual Assault” “Indecency assault” “Sexual Crimes” “Sexual Offenses” “Sexual Exploitation” “Sexual Abuse”	“Psychoaffective disorders” “Mental Illness” “Behavioral Disorders” “Psychiatric Disorders” “Anxiety Disorders” “Mood Disorders” “Major Depressive Disorder” “Bipolar Disorder” “Persistent Depressive Disorder” Dysthymia “Seasonal Affective Disorder” “Dysphoric Disorder” “Depressive Disorder” “Emotional disorder”

Anexo B

Estrategias de búsqueda de las tres bases de datos

Base de datos	Estrategia de Búsqueda
Pubmed	<p>(((women[Title/Abstract] OR females[Title/Abstract] OR lady[Title/Abstract] OR "mature adult"[Title/Abstract]) AND ("Sexual Violence"[Title/Abstract] OR Rape[Title/Abstract] OR "Sexual Abuse"[Title/Abstract] OR "Sexual Assault"[Title/Abstract] OR "Indecency"[Title/Abstract] OR "Sexual Crimes"[Title/Abstract] OR "Sexual Offenses"[Title/Abstract] OR "Sexual Exploitation"[Title/Abstract] OR "Sexual Abuse"[Title/Abstract])) AND ("Psychoaffective disorders"[Title/Abstract] OR "Mental Illness"[Title/Abstract] OR "Behavioral Disorders"[Title/Abstract] OR "Psychiatric Disorders"[Title/Abstract] OR "Anxiety Disorders"[Title/Abstract] OR "Mood Disorders"[Title/Abstract] OR "Major Depressive Disorder"[Title/Abstract] OR "Bipolar Disorder"[Title/Abstract] OR "Persistent Depressive Disorder"[Title/Abstract] OR dysthymia[Title/Abstract] OR "Seasonal Affective Disorder"[Title/Abstract] OR "Dysphoric Disorder"[Title/Abstract] OR "Depressive Disorder"[Title/Abstract] OR "Emotional disorder"[Title/Abstract])) NOT ("child abuse"[Title/Abstract] OR HIV[Title/Abstract] OR "polycystic ovary"[Title/Abstract])</p>
Scopus	<p>TITLE-ABS (women OR girls OR females) AND TITLE-ABS ("Sexual Violence" OR rape OR "Sexual Abuse" OR "Sexual Assault" OR "Indecency" OR "Sexual Crimes" OR "Sexual Offenses" OR "Sexual Exploitation" OR "Sexual Abuse") AND TITLE-ABS ("Psychoaffective disorders" OR "Mental Illness" OR "Behavioral Disorders" OR "Psychiatric Disorders" OR "Anxiety Disorders" OR "Mood Disorders" OR "Major Depressive Disorder" OR "Bipolar Disorder" OR "Persistent Depressive Disorder" OR dysthymia OR "Seasonal Affective Disorder" OR "Dysphoric Disorder" OR "Depressive Disorder" OR "Emotional disorder") AND PUBYEAR > 2019 AND PUBYEAR < 2024 AND PUBYEAR > 2021 AND PUBYEAR < 2024 AND PUBYEAR > 2021 AND PUBYEAR < 2024 AND (LIMIT-TO (SUBJAREA , "PSYC")) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE , "English")) AND (LIMIT-TO (EXACTKEYWORD , "Female"))</p>

Web of science

1 (TI=(women OR females OR lady OR "mature adult")) OR (AB=(women OR females OR lady OR "mature adult")) OR (AK=(women OR females OR lady OR "mature adult"))

2 (TI=("Sexual Violence" OR Rape OR "Sexual Abuse" OR "Sexual Assault" OR "Indecency" OR "Sexual Crimes" OR "Sexual Offenses" OR "Sexual Exploitation" OR "Sexual Abuse")) OR (AB=("Sexual Violence" OR Rape OR "Sexual Abuse" OR "Sexual Assault" OR "Indecency" OR "Sexual Crimes" OR "Sexual Offenses" OR "Sexual Exploitation" OR "Sexual Abuse")) OR (AK=("Sexual Violence" OR Rape OR "Sexual Abuse" OR "Sexual Assault" OR "Indecency" OR "Sexual Crimes" OR "Sexual Offenses" OR "Sexual Exploitation" OR "Sexual Abuse"))

3 (TI=("Psychoaffective disorders" OR "Mental Illness" OR "Behavioral Disorders" OR "Psychiatric Disorders" OR "Anxiety Disorders" OR "Mood Disorders" OR "Major Depressive Disorder" OR "Bipolar Disorder" OR "Persistent Depressive Disorder" OR dysthymia OR "Seasonal Affective Disorder" OR "Dysphoric Disorder" OR "Depressive Disorder" OR "Emotional disorder")) OR (AB=("Psychoaffective disorders" OR "Mental Illness" OR "Behavioral Disorders" OR "Psychiatric Disorders" OR "Anxiety Disorders" OR "Mood Disorders" OR "Major Depressive Disorder" OR "Bipolar Disorder" OR "Persistent Depressive Disorder" OR dysthymia OR "Seasonal Affective Disorder" OR "Dysphoric Disorder" OR "Depressive Disorder" OR "Emotional disorder")) OR (AK=("Psychoaffective disorders" OR "Mental Illness" OR "Behavioral Disorders" OR "Psychiatric Disorders" OR "Anxiety Disorders" OR "Mood Disorders" OR "Major Depressive Disorder" OR "Bipolar Disorder" OR "Persistent Depressive Disorder" OR dysthymia OR "Seasonal Affective Disorder" OR "Dysphoric Disorder" OR "Depressive Disorder" OR "Emotional disorder"))

#1 AND #2 AND #3 and 2025 or 2024 or 2023 or 2022 or 2021 or 2020 (Publication Years) and Article (Document Types) and Article (Document Types) and English or Spanish (Languages) and Psychology (Research Areas)

22/03/2025

Web of Science® Search

46 results from Web of Science Core Collection for:
K1 AND K2 AND K3

Advanced Search | Refine results for K1 AND K2 AND K3 | Refine results for K1 AND K2 AND K3 and 2020 or 2021 or 2024 or 2025

Refined By: Publication Years: 2020 or 2021 or 2023 or 2024 or 2025 or 2022 X | Document Types: Article X | Languages: English or Spanish X | Languages: English or Spanish X | Research Areas: Psychology X | Clear all

46 Documents | You may also like... | Analyze Results | Create Report | Create Alert

Refine results | Export Refine | Add to Marked List | Export | Balance | 1 of 1

Quick filters: Early Access, Open Access, Included Child References

Publication Years

1 Long-term mental health consequences of female- versus male-perpetrated child sexual abuse | 4 Citations | 74 References

Smith, J. J., & Resnick, H. S. (2014). *Child Abuse & Neglect*, 38(1), 1-14.

Background: Research on child sexual abuse increasingly focuses on sexually offending females. However, there is a lack of research that focuses on the individuals being affected. Studies have suggested that the consequences for those affected by...